

راهنمای

بیماریهای شایع پوست و مو

ضرورترین اطلاعات مربوط به بیماریهای شایع

تهیه شده در پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی

WWW.MYSKIN.IR

دکتر محسن فیاض

متخصص پوست، مو و زیبایی دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

۱	آکنه
۳	اگزما
۵	ریژش آندروژنیک مو
۷	زونا
۹	لکه‌های پررنگ صورت
۱۳	آلپیسی آره‌آتا
۱۵	آبله مرغان
۱۷	تب خال
۱۹	گال
۲۲	زرد زخم
۲۴	کهیر
۲۷	شپش
۳۱	پیسی یا ویتیلیگو
۳۳	خال‌ها
۳۵	پرمولی یا هیرسوتیسم
۴۰	مولوسکوم کنتاژیوزوم
۴۲	زگیل
۴۵	پسوریازیس
۴۷	بیماریهای قارچی پوست
۵۳	درماتیت سبورئیک
۵۵	سرطان‌های پوستی
۶۳	لیکن پلان
۶۶	زوائد گوشی
۶۸	اریتم مولتی فرم
۷۰	تظاهرات عفونت HIV در پوست
۸۰	پیتیریازیس روزه‌آ

آکنه

WWW.MYSKIN.IR

کرده و در ایجاد التهاب نقش ایفا می کند همه وهمه دست به دست هم داده تا بیماری آکنه ایجاد شود و تداوم یابد . البته برخی موارد آکنه علت مشخص خارج از بدن دارند مثلاً "آکنه دارویی" بعلت داروهای استروییدی یا آکنه بعلت فشارروی پوست ، صابونها ، گرما و رطوبت ، مواد آرایشی چرب که می توان با رفع آن علت دربهبودی بیماری موثر بود . اما اکثر موارد بیماری علت خارجی نداشته و تنها می توان با پرهیز از عوامل تشدید کننده تا حدی از شعله ور شدن بیماری جلوگیری کرد . در مورد تغذیه نیز باید گفت که برخلاف نظر اکثر افراد آکنه بعلت برخی غذاها ایجاد نمی شود بلکه تنها در عده ای از افراد برخی غذاها که خود فرد به تجربه دریافته است می توانند بیماری را تشدید کنند . پس پرهیز غذایی شدید در آکنه بی مورد بوده و تنها باید از خوردن غذاهایی خودداری نمود که خود احتمال می دهیم بیماری را تشدید می کند .

بیماری آکنه در حقیقت التهاب مزمن غدد چربی می باشد که از سنین نوجوانی آغاز می شود شروع آن به شکل ضایعات همنگ پوست ، برجسته و سرسیاه یا سرسفید می باشد که این ها می توانند تبدیل به ضایعات التهابی برجسته قرمز یا چرکی شود و حتی کیستهای بزرگ چرکی هم ایجاد گردد . مهمترین نکته این بیماری شایع به جا گذاشتن فرورفتگیها و برجستگیهایی بر روی پوست فرد مبتلا پس از بهبودی ضایعات می باشد . به همین علت درمان این بیماری لازم و ضروری است تا از بدشکلیهای بعدی جلوگیری بعمل آید . محل ضایعات آکنه ای بیشتر در صورت و گاهی درتنه می باشد . شدت بیماری از انواع بسیار خفیف که نیازی به درمان ندارد تا انواع بسیار شدید متفاوت است . در موارد شدید بیماری می توان شدت بیماری را با درمان به موقع کم نمود و از جا گذاشتن ضایعات نیز پیشگیری نمود . در ایجاد این بیماری چندین عامل نقش دارند . غدد چربی فعال که در زمان بلوغ فعال می شوند ، انسداد مجرای خروجی چربی ، وجود باکتری خاصی که بر روی چربی عمل

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

آکنه

WWW.MYSKIN.IR

۲

درمان بیماری آکنه بسته به شدت آن باید متفاوت باشد . درموارد خفیف از داروهای موضعی مثل آنتی بیوتیکهای موضعی و یا ترینوین و یا بنزویل پراکساید می توان استفاده نمود و درموارد متوسط از آنتی بیوتیکهای خوراکی مختلف مثل تتراسیکلین ، داکسی سیکلین ، اریترومایسین می توان بهره برد و در موارد شدید بهتراست از داروی ایزوترینوین استفاده شود . درمان آکنه باید تحت نظر متخصص پوست انجام شود و همکاری بیمار و پزشک در درمان این بیماری مانند بسیاری از بیماریهای مزمن دیگر کلید حل مشکل بیمار است .



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۳۵۰۱

اگزما

WWW.MYSKIN.IR

۳

رخ داده و درنوع مزمن پوست خشک بوده وضخامت آن افزایش یافته و ترکهای پوستی ایجاد شده و خارش نیز بشدت وجود دارد. اصل اساسی در بیماری اگزما پرهیز از تماس با مواد محرک در اگزمال تحریکی و پرهیز از تماس با ماده آلرژن در اگزمال تماسی آلرژیک است. تستهای خاصی می تواند به ما کمک کند تا ماده آلرژن را بشناسیم واز آن پرهیز کنیم. در مورد درمان نیز استفاده از مواد خشک کننده پوست در انواع مترشحه و داروهای نرم کننده در نوع خشک بیماری همراه با استرویید های موضعی می تواند کمک کننده باشد. در مورد اگزمال دست خانمهای خانه دار استفاده از دستکش نخی مناسب در کارهای خشک منزل و استفاده از دستکش نایلینی بر روی دستکش نخی در کارهای مرطوب مثل ظرفشویی و رختشویی لازم و ضروری است. مواد شوینده دست نیز باید به گونه ای انتخاب شود که کمترین تحریک را داشته باشند. البته گاهی حتی تماس با آب می تواند بیماری اگزمال تحریکی دست را تشدید کند که در این گونه موارد باید شستشوی دست به حداقل ممکن

بیماری اگزما یا درماتیت یکی از بیماریهای شایع پوست می باشد بطوری که درصد بالایی از بیماران کلینیکهای تخصصی پوست را بیماران مبتلا به این بیماری تشکیل می دهند. اگزمال دست خانمهای خانه دار یکی از انواع اگزمال تحریکی می باشد که بسیار شایع است. بطور کلی اگزما را به دو دسته می توان تقسیم کرد یکی نوع تحریکی و دیگری نوع آلرژیک. درنوع تحریکی هر ماده محرکی می تواند باعث تشدید بیماری شود اما درنوع آلرژیک ماده خاصی باعث ایجاد و تشدید بیماری می باشد و سیستم ایمنی بدن نیز در ایجاد بیماری دخالت دارد. مثال نوع الرژیک حساسیت به نیکل است که در دختران نوجوان و جوان شایعتر بوده و در ناحیه مچ دست و نرمه گوش بیشتر رخ می دهد. اگزماها ای تحریکی حتی به مواد غیرمحرك هم می تواند حساس بوده و تماس با یک شوینده معمولی نیز می تواند باعث تشدید بیماری شود. شکل ظاهری ضایعات اگزمالی بسته به حاد و مزمن بودن بیماری متفاوت است. درنوع حاد بیماری ضایعات تاولی ریز خارش دار و مترشحه رخ

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

اگزما

WWW.MYSKIN.IR

۴



بر سد و هر بار پس از شستشو از نرم کننده های قوی پوست مثل واژلین واوسرین استفاده شود . البته اگزما انواع دیگری نیز دارد مثل اگزمای سکه ای ، اگزمای بعلت تجمع خون در ساق پا ، اگزمای کراکل و..... که کمتر از انواع گفته شده شایع بوده و درمان آنها نیز از همان اصول کلی درمان اگزماها پیروی می کند .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۶

ریزش آندروژنیک مو

WWW.MYSKIN.IR

۵

سود برد و یا درموارد شدیدتر از داروهای ضد هورمون مردانه تحت نظر پزشک متخصص استفاده کرد . البته روند پاسخ به درمانها کند بوده و درمانها تنها شدت ریزش را کاهش داده و می توانند سرعت پیشرفت به سمت طاسی آقایان را کند کنند . درخانمها پاسخ به درمانها کمتر بوده و وضعیت هورمونی آنها نیز می تواند در پاسخدهی به درمانها موثر باشد . لذا بررسی هورمونی درخانمها بیشتر توصیه شده و گاهی لازم است از همکاری متخصص غدد نیز بهره برد . امروزه بسیاری از درمانها جهت ریزش مو توصیه می شود و گاهی این توصیه ها از طرف افراد غیر متخصص می باشد برای مثال انواع شامپوها جهت ریزش مو توصیه می شود در صورتی که کمترین اثری در این زمینه نداشته و یا محلولها و آمپولهای موضعی بسیاری تبلیغ می شود که شاید درصد کمی از آنها موثر باشد و باید توجه نمود که حتماً دراستفاده از این نوع درمانها باید با متخصص پوست مورد اعتماد خود مشورت نماییم و در صورت تایید از آنها استفاده کنیم و به تبلیغات بسیاری که در مورد این نوع داروها می شود

ریزش موی آندروژنیک در مردان وزنان بطور شایعی وجود دارد . در مردان از حدود سن ۱۸ سالگی شروع شده و بتدریج موهای ناحیه دو طرف جلوی سر کاهش می یابد و گاهی به سمت طاسی پیش می رود در زنان در سنین بالاتر رخ داده و ناحیه فرق سر را گرفتار کرده و موها نازک شده و کاهش می یابد . علت این نوع ریزش مو توارث و هورمونهای مردانه می باشد . در حقیقت هورمونهای مردانه گیرنده هایی در روی موها دارند که با اثر بر روی آنها باعث کاهش ضخامت مو می شوند و پاسخدهی این گیرنده ها را توارث تعیین می کند . این نوع ریزش مو آنقدر شایع است که دیگر نمی توان مگر درموارد شدید آن را بیماری محسوب نمود . و در حقیقت یک نوع پروسه طبیعی در موها می باشد . البته این نوع ریزش مو را باید از انواع دیگر ریزش مو که علت خاصی دارند مثل ریزش موی بعلت کم کاری تیروئید ، کمخونی ها و مشکلات تغذیه ای افراق داد چرا که درمان آنها متفاوت می باشد . در درمان ریزش موی آندروژنیک می توان از داروهای موضعی محرك رویش مو مانند ماینوكسیدیل

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

ریزش آندروژنیک مو

WWW.MYSKIN.IR

توجه نکنیم.



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو

پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۳۵۰۱

زونا

WWW.MYSKIN.IR

۷

تنه می باشد اما در نواحی صورت ، گردن ، کمر ، اندام تحتانی و اندام فوقانی نیز می تواند رخدید . ضایعات پوستی مختص بیماری به شکل دانه های آبدار و چرکی یا خونی در زمینه پوست قرمز است که معمولاً این ضایعات به شکل گروهی در کنار هم قرار گرفته اند . ضایعات پوستی و درد بیماری در یک سمت بدن رخ می دهد و ضایعات از خط وسط بدن عبور نمی کند . در حقیقت توزیع ضایعات به شکل درماتومال است یعنی در محل عصب دهی یک یا دو عصب مجاور هم رخ می دهد . گاهی ضایعات خیلی وسیع و گاهی خیلی محدود است ولی کلاً هر چه سن بیمار بالاتر باشد شدت بیماری و وسعت آن بیشتر است . واگیری ضایعات از طریق راه تنفسی است و فرد در تماس اگر قبلاً با ویروس آبله مرغان در تماس نبوده ؟ دچار آبله مرغان می شود پس لازم است فرد مبتلا با کودکانی که آبله مرغان نگرفته اند کمتر تماس داشته باشد . مدت وجود بیماری معمولاً حدود ۳-۴ هفته است که در صورت وجود درد شدید تحمل این مدت بسیار دشوار است . گاهی حتی این درد پس از

بیماری زونا یک بیماری ویروسی است و ویروس آن همان ویروس آبله مرغان است که می تواند مدت ها بصورت نهفته در بدن انسان بماند و زمانی بیماری زونا را سبب شود . البته هر کسی که آبله مرغان گرفته باشد دچار بیماری زونا نمی شود اما برای ابتلا به زونا حتماً فرد باید قبلًا با ویروس آبله مرغان تماس داشته باشد که این تماس می تواند منجر به بیماری آبله مرغان شود و یا بدون علائم بالینی باشد . بیماری زونا معمولاً در سنین میانسالی و کهولت رخ می دهد و در کودکان شایع نیست . شروع بیماری با درد ناحیه مبتلا است . درد زونا می تواند خفیف و یا شدید باشد . هر چه سن بیمار بالاتر باشد ؛ این درد شدیدتر است و در سنین پاییتیر می تواند فقط به شکل یک سوزش و گزگز رخ دهد . این درد از حدود ۴ روز قبل از بروز ضایعات پوستی شروع می شود و به همین علت در این زمان احتمال اشتباه در تشخیص بیماری زیاد است و بسته به محل بروز بیماری می تواند با درد قلبی ، آپاندیسیت ، ورم کیسه صفراء ، سنگ کلیه و یا درد دیسک کمر اشتباه شود . محل شایع بیماری در ناحیه سینه و پشت

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۳۵۶۴۴۶۴۴

زونا

WWW.MYSKIN.IR

۸

آبله مرغان دراینجا بیشتر کاربرد دارد و در صورتی که شروع استفاده از این داروها در ۴۸ ساعت اول بیماری باشد؛ می‌توان تا حدی از شدت بیماری کاست. درد زونا را می‌توان با مسکنها تا حدی کنترل نمود اما در صورت ادامه درد به پس از بهبودی ضایعات پوستی می‌توان از داروهایی چون داروهای ضد افسردگی و داروهای دیگری که در بیماریهای اعصاب کاربرد دارند استفاده نمود. در صورت مزمن شدن درد پس از زونا، آرامش بیمار و کاهش اضطراب او می‌تواند در درمان بهتر نقش بسزائی بازی کند.



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۶

بهبودی ضایعات پوستی به مدت شش ماه تا یکسال با شدت وضعف متفاوت ادامه می‌یابد. این درد می‌تواند به شکل سوزشی باشد و یا گاه حالت خنجری دارد یعنی مانند آن است که خنجری در آن قسمت فروکرده‌اند. حتی گاه تماس لباس فرد با پوست او باعث ایجاد حالت ناخوشایندی می‌شود که همه اینها بعلت التهاب عصب ناحیه مبتلا می‌باشد. چون در بیماری زونا درگیری پوست و عصب همراه هم وجود دارد و به همین علت در درمان این بیماران از مشاوره با متخصصین محترم نورولوژی سود می‌بریم. درمان داروئی زونا به دو شکل موضعی و خوراکی می‌باشد. در درمانهای موضعی از داروهای خشک کننده مثل ائوزین، ویوله دوژانسین، محلولهای حاوی سولفات روی و.... جهت خشک کردن ضایعات آبدار و تاولی استفاده می‌شود. در صورت وجود خارش می‌توان از داروهای ضد خارش موضعی مانند کالامین استفاده کرد. شستشوی ضایعات با آب و صابون بدون کندن آنها ایرادی ندارد. داروهای خوراکی ضد ویروسی مثل آسیکلولویر بعلت شدت بیشتر بیماری زونا نسبت به آبله

لکه های پررنگ صورت

Melasma, Junctional Nevus, Letingo & Freckle

WWW.MYSKIN.IR

۹

از جمله داروهای دیگری که باعث این حالت پررنگی می شود می توان به فنی تویین خوراکی اشاره نمود که در بیماری صرع مصرف می شود . عامل ثانیک و نژاد نیز در بروز این نوع لکها دخالت دارد . ملاسما فقط بعلت زیبایی برای فرد آزاردهنده بوده و هیچگونه خارش و ناراحتی مشابه ایجاد نمی کند . نورآفتاب باعث تشدید این نوع لکها شده و گاهی شروع این نوع لکها بدنبال سفر به مناطق آفتاب خیز و یا در معرض طولانی آفتاب بودن رخ می دهد . جهت درمان این نوع لکها استفاده از ضدآفتاب مناسب اولین قدم درمان می باشد در غیر این صورت اثر ضدلکها نیز کم خواهد شد . داروهای زیادی برای ملاسما پیشنهاد می شود ولی باید در نظر داشت که ملاسما چند نوع دارد که درمان در برخی انواع آن موثر در برخی بطور نسبی موثر و دریک نوع نیز اصلاً موثر نمی باشد . ملاسما را می توان بر اساس عمق رنگدانه به سه دسته تقسیم نمود : نوع اول اپیدرمال یا سطحی می باشد که به درمانهای ضدلک پاسخ مناسبی می دهد . نوع دوم اپیدرمودرمال می باشد که از لحاظ عمق رنگدانه متوسط محسوب

لکه های پررنگ شایعتر شامل بیماری ملاسما ، لنتیگو، کک مک و خالهای هم سطح پوست می باشد .

ملاسما

از جمله شایعترین لکه های پررنگ پوست صورت می توان به ملاسما اشاره نمود که بیشتر در خانمها رخ داده اما بروزان در آقایان نیز غیر معمول نیست . ملاسما در افراد با پوست سبزه و تیره بیشتر رخ می دهد . این لکه ها بیشتر در مرکز صورت بر روی بینی و گونه ها ، وسط پیشانی و بالای لب به شکل قرینه رخ داده و علت واقعی آن مشخص نیست و به نظر می رسد یک بیماری مولتی فاکتوریال (چند عاملی) باشد . چون این لکها بیشتر در حاملگی و مصرف قرصهای ضد بارداری رخ می دهد لذا تصور میگردد که با عدم تعادل هورمونی ارتباط داشته باشد . البته این به آن معنا نیست که افراد دارای ملاسما دچار کمبود یا افزایش هورمونهای خاصی در خون خود هستند بلکه این عدم تعادل در پوست فرد وجود دارد و با آزمایش های هورمونی کشف نمی شود .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۰۶۳۵۰۱

لکه های پرنگ صورت

Melasma, Junctional Nevus, Letingo & Freckle

WWW.MYSKIN.IR

۱۰

هیدروکینون با غلطهای بالا را نمی توان بیش از شش ماه استفاده نمود زیرا احتمال عوارض آن که خود به شکل لکه های خاصی می باشد را افزایش می دهد .



کک مک (Freckle)

این نوع لکها بیشتر در کودکی و در روی گونه ها و بینی و در افراد با پوست روشن و به ویژه در کسانی که موی قرمزدارند؛ رخ می دهد . اندازه این نوع لکها کوچک بوده و تنها از لحاظ زیبایی برای فرد و والدین او اهمیت دارد . کک مک جنبه ثانیکی داشته و سابقه خانوادگی آن معمولاً در فرد مبتلا وجود دارد . در برخی کشورها مانند کشورهای شمال اروپا بعلت شیوع بالا، این حالت پوست کاملاً طبیعی

شده و به درمانهای ضد لک پاسخ نسبی می دهد و نوع سوم که در مال بوده و عمق بیشتری از دو نوع قبلی داشته و پاسخی به درمانهای ضد لک نمی دهد . درمانهای ضد لک شامل هیدروکینون، آزلاییک اسید ، ویتامین C ، لایه بردارهای حاوی AHA و همچنین داروهای جدیدتری که هنوز اثر آنها با مطالعات دقیق ثابت نشده مانند آربوتین ، glabridin ، آلوورا و ... می باشد . گاه از ترکیب چند دارو نیز استفاده می شود تا اثرات آنها تشديد گردد . از پلینگ شیمیایی نیز جهت درمان استفاده می شود که با لایه برداری عمقی می تواند باعث بهبودی ضایعات شود اما در کنار این اثر مفید می تواند گاهی با تحریک پوستی باعث تشديد ضایعات نیز بشود . میکرو درمان بریزن نیز همین خاصیت را دارد . این نکته را باید به خاطر داشت که درمانهای ضد لک از هر نوع که باشد ؛ باید بطور طولانی مصرف شده و گاه با قطع درمان عود لکها را شاهد هستیم . البته برخی داروها را می توان فقط برای دوره محدودی استفاده نمود لذا درمان باید تحت نظر متخصص پوست انجام گیرد تا از عوارض آن کاسته گردد . برای مثال داروی

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

لکه های پرنگ صورت

Melasma, Junctional Nevus, Lentigo & Freckle

WWW.MYSKIN.IR

۱۱

کک مک یک حالت ژنتیکی پوست بوده و با درمانهای گفته شده تنها می توان مدتی این ضایعات پوستی را کاهش داد اما احتمال عود مجدد آنها وجود دارد ولذا به افراد دچار این حالت پوستی توصیه می شود با پوست خود کمی مدارا کنند و آن را بیماری ندانسته بلکه یک حالت از پوست طبیعی به شمار آورند.

LENTIGO

لنتیگو لکه های قهوه ای رنگی است که معمولاً در سنین میانی به بالا در مناطقی مانند صورت و پشت دستها که بیشتر در معرض آفتاب هستند ایجاد می شود. تعداد این ضایعات معمولاً زیاد بوده و می تواند از لحاظ زیبایی برای فرد مشکل ساز شود. این ضایعات نتیجه افزایش سلولهای رنگدانه ای (ملانوسیت) در لایه قاعده ای اپیدرم پوست می باشد. لنتیگوها دونوع می باشند یک نوع که در اثر تابش آفتاب شدید ایجاد می شود و در سنین جوانی نیز بروز کرده و ایجاد آن به شکل حاد می باشد و نوع دوم که به آن لنتیگوی پیری می گویند و فقط در سنین کهولت رخ داده و بعلت تابش نور خورشید در سالیان طولانی عمر فرد بوده و

وباعث مراجعه فرد به پزشک نمی گردد اما در مناطق دیگر که شیوع آن بالا نیست می تواند باعث ناراحتی فرد گردد. این نوع لکهای در تابستان بیشتر شده و در زمستان کاهش می یابد. کک مک معمولاً در ابتدا کودکی افزایش یافته و در دوران پس از بلوغ ثابت مانده و یا حتی کمی بهبودی نشان می دهد. داشتن پوست سفید و کک مکی یک نشانه حساس بودن به نور خورشید بوده و باعث افزایش خطرابلا به سرطان پوست می باشد. افراد دارای این نوع پوست در معرض آفتاب دچار آفتاب سوختگی شده و باید بطور مرتب از ضدآفتابهای مناسب استفاده نمایند.

جهت درمان کک مک می توان علاوه بر ضد آفتاب از کرمهای لایه بردار یا کرمهای حاوی ترتیبوئین استفاده نمود اما بعلت تحریک پوستی ایجاد شده توسط این نوع کرمها حتماً استفاده از آنها باید تحت نظر متخصص پوست باشد. درمانهای دیگر شامل پیلینگ شیمیایی، میکروردما بریزن و لیزر می باشد. از کرمهای پوشاننده نیز می توان جهت کمتر نمایان شدن کک مک استفاده نمود. اما باید توجه داشت که

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران - م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶

لکه های پرنگ صورت

Melasma, Junctional Nevus, Lentigo & Freckle

WWW.MYSKIN.IR

۱۲

پس توصیه می گردد به جز درمواردی که خال باعث مشکل زیبایی زیادی شده باشد، بهتر است اقدام به ازبین بردن خالها نشود . باید توجه داشت که برداشتن خال تنها باستی توسط پزشک متخصص پوست، مو و زیبایی صورت پذیرد و دستکاری کردن خال توسط افراد غیر متخصص، زیانهای جبران ناپذیری را برای بیمار در پی خواهد داشت.

حالهای سطحی (junctional nevus)

حالهای جانکشنال نوعی از حالهای پوستی هستند که بیشتر در کودکی و نوجوانی واکث را در پوست صورت و پشت دستها ایجاد می شود . این خالها مسطح و کوچک بوده ورنگ آنها نیز معمولاً قهوه ای می باشد . بروز این نوع خالها نیز مانند خالهای ملانوسیتیک دیگر با توارث در ارتباط است . بعلت خطرپایین تبدیل شدن این خالها به بدخیمی های پوستی ، معمولاً نیازی به درمان اینگونه خالها نیست . اما در صورتی که این نوع خالها باعث مشکل زیبایی برای فرد شده باشد می توان با روشهای جراحی ، استفاده از کوتروپیا دستگاههای RF و یا لیزر اقدام به ازبین بردن این خالها نمود . اما باید توجه داشت که با هر روشی که خالها برداشته شوند احتمال عود خال و یا بجا گذاشتن اسکار وجود دارد و البته عود خال قابل درمان تراز بجا گذاشتن اسکار می باشد . عود خال نشانه کم برداشتن بافت می باشد و اسکار نشانه زیاد برداشتن بافت خال می باشد . درین روشهای درمانی جهت برداشتن خالها استفاده از

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

آلوبسی آره‌آتا

WWW.MYSKIN.IR

۱۳

محدود اکثراً در عرض چند ماه موها مجدداً رویش می‌کند. درابتدا موهای رویش کرده به رنگ سفید می‌تواند باشد که کم کم به رنگ عادی باز می‌گردد. برخی افراد بطور مکرر دچار این نوع ریزش موی شوند که گاه ممکن است بطور وسیع تمام سر یا کل بدن رانیز مبتلا کند. والبته گاه نیز فردی فقط یکبار دچار این بیماری می‌شود و درعرض چند ماه نیز بهبودی یافته و هیچگاه نیز دوباره دچار این بیماری نمی‌شود. دراین بیماری موها به یکباره ریزش می‌کند و فرد درعرض یکی دو روز متوجه ریزش موی خود می‌شود. خیلی از افراد نیز توسط آرایشگر خود از ریزش موی منطقه ای خود آگاه می‌شوند. یکی از عواملی که در ایجاد بیماری گفته می‌شود که نقش دارد اضطراب می‌باشد که البته بطور کاملاً علمی این مطلب ثابت نشده است. اما چون خیلی از بیماریهای پوستی می‌تواند با استرس تشدید شود احتمال تشدید این بیماری نیز با استرس وجود دارد و آرامش بیمار و واکنش غیراحساسی او نسبت به بیماری خود می‌تواند در درمان نیز موثر باشد. درمان بیماری در احوال شروع ریزش مو خیلی موثر نیست و

www.myskin

دریماری آلوبسی آره‌آتا یا طاسی منطقه ای یا طاسی سکه ای موهای منطقه ای از مناطق مودار بدن بطورناگهانی کاملاً می‌ریزد. این منطقه می‌تواند در ناحیه سر، ریش، ابرو، مژه و یا هرجای دیگر بدن باشد. در موارد شدید بیماری تمام موهای سر می‌ریزد که به آن آلوبسی توتالیس می‌گویند و یا حتی موهای تمام بدن می‌ریزد که آن را آلوبسی یونیورسالیس می‌نامند. علت این بیماری به نظرمی‌رسد که فعالیت سیستم ایمنی بر علیه موهای فرد مبتلا باشد. گاهی همراه با ریزش موی منطقه ای، تغییرات ناخنی خاصی نیز رخ می‌دهد که در تشخیص بیماری کمک کننده است. بیماری در هر سنی می‌تواند شروع گردد. شدت بیماری نیز می‌تواند کاملاً متفاوت باشد. البته برخی عوامل در تعیین شدت بیماری موثرند، مثلاً اگر شروع بیماری در کودکی باشد و یا تمام سر را دربرگیرد و یا همراه با حساسیت پوستی سرشته باشد و یا منطقه حاشیه ای پشت سر و بالای گوش را درگیر کند شدت بیماری بیشتر و مدت ابتلا طولانی تر می‌شود. مدت طول کشیدن این بیماری متفاوت است در موارد

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۴۴

آلوبسی آرها

WWW.MYSKIN.IR

۱۴

و سیر بیماری باید به طرف ثبات برود و قطر مناطق ریزش مو ثابت بماند تا درمان نیز موثر واقع شود . درمانهای موضعی رایج شامل استفاده از استروپیدها و محرکهای ریزش مو مانند ماینوكسیدیل می باشد . داروهایی نیز وجود دارد که می توانند با ایجاد حساسیت جلدی باعث بهبودی بیماری شوند که این داروها توسط متخصص پوست می توانند تجویز و استفاده شود . درمانهای خوراکی مانند استروپید خوراکی با مقادیر بالا و داروهایی مانند متوترکسات نیز در درمان استفاده می شود اما بعلت ازمان بیماری و عوارض دارویی بهتر است جز در موارد خاص از این داروها استفاده نشود .



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۶

آبله مرغان

WWW.MYSKIN.IR

۱۵

کرده و دانه های آبدار ریز، چرکی شده و سپس خشک شده و دلمه سیاه رنگی ایجاد می کند. واين دلمه نیز می افتد و معمولاً جوشگاه یا اسکار بجا نمی گذارد اما در مواردی که عفونت باکتریایی اضافه شود و یا ضایعه بزرگ باشد می تواند ضایعه فرورفته ای بجا بگذارد. ضایعات آبله مرغان می تواند خارش دار باشد که گاه این خارش بسیار آزار دهنده است. مدت بیماری معمولاً "یکی دوهفته" می باشد. احتمال بروز مشکلات داخلی مثل عفونت ریوی و کبدی و مغزی نیز در آبله مرغان وجود دارد که این احتمال در افرادی که از لحاظ سیستم ایمنی ضعیف هستند و بزرگسالان بیشتر است. در موارد خفیف بیماری می توان برای کاهش خارش از داروهایی مانند کالامین استفاده نمود. و یا اگر خارش شدید باشد و باعث کند شدن ضایعات گردد می توان از داروهای آنتی هیستامین خوراکی نیز استفاده نمود. در صورتی که عفونت باکتریایی پوستی ایجاد شده باشد و یا احتمال ایجاد آن با توجه به شرایط زندگی فرد زیاد باشد می توان از آنتی بیوتیکهای موضعی و یا خوراکی نیز استفاده کرد. محیط زندگی فرد

پلاک
لک
ریز
تیز
نمی
بین

بیماری آبله مرغان یک بیماری ویروسی شایع در میان کودکان می باشد. در مناطق معتدل٪ ۹۰ موارد این بیماری در کودکان زیر ۱۰ سال رخ می دهد ولی در مناطق حاره ای آبله مرغان بیماری سنین نوجوانی است. گاه شدت بیماری آنقدر خیف است که کسی متوجه آن نشده و فرد در برابر بیماری ایمنی پیدا کرده و با تماس مجلد نیز دچار آن نمی شود. دوره نهفته بیماری حدود دوهفته است. انتقال بیماری از طریق تماس مستقیم با ضایعات واژراه تنفسی می باشد. از حداقل ۴ روز قبل از شروع ضایعات پوستی تا ۵ روز پس از شروع ضایعات واگیری وجود دارد. شروع بیماری می تواند با تب خفیف و سر درد و بیحالی باشد که معمولاً این علائم خفیف هستند. شدت بیماری بستگی به سن بروز داشته بطوری که در بزرگسالان شدت بیماری بیش از کودکان است. پس از علائم عمومی، ضایعات پوستی مشخص بیماری ایجاد می شود که بصورت ضایعات قرمز رنگی است که بر روی آنها دانه های آبدار ریزی بروز می کند. محل اینها در تنفسی و صورت و سرمهی تواند باشد. گروه گروه از این ضایعات بروز

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۰۶۳۵۰۱

آبله مرغان

WWW.MYSKIN.IR

۱۶

وبیماری خودبخود بهبود می یابد . در مورد محل بجا مانده از ضایعات آبله مرغان می توان از روشهایی مانند میکرودرمابریژن، جراحی، تزریق مواد پرکننده ولیزر درمانی استفاده نمود .



www.myskin.ir

نباید خیلی گرم باشد زیرا دیده شده در محیط گرم تعداد ضایعات بیمار بیشتر شده است . درمورد حمام رفتن توصیه می شود که در حمام از کیسه و لیف زبر استفاده نشود تا حتی المقدور ضایعات کنده نشده تا اسکار بیشتری بجا نگذارند . اما شستشوی بدن با آب و لرم هیچگونه عوارضی برای بیمار دربرندارد . درمورد دادن مسکن ها به بیمار باید دقت نمود که از آسپیرین نباید استفاده نمود زیرا خطر ایجاد یک عارضه کبدی مغزی را افزایش می دهد . این عارضه با استفراغ های مکرر و شدید همراه است که در صورت بروز چنین حالاتی حتماً باید با پزشک معالج تماس گرفت و او را در جریان وضعیت بیمار قرارداد . داروهای ضد ویروس مثل آسیکلورویر در صورتی که در اوایل شروع بیماری استفاده شود می تواند در کاهش شدت بیماری مؤثر باشد . و چون بیماری بسیار واگیرداربوده و در خانواده احتمال بروز بیماری در کودکان زیاد است می توان به محض شروع بیماری دارو را نیز شروع نمود اما باید به خاطر داشت که آبله مرغان در کودک سالم نیاز زیادی به دارو ندارد

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۴۶۴۴۶۳

تب خال (هرپس سیمپلکس)

WWW.MYSKIN.IR

۱۷

بروز کند که همان تب خال معمولی است که خیلی از مردم دچار آن هستند . این حالت ممکن است بارها تکرار شود بطوری که حتی گاه ماهی یکبار فرد دچار این حالت می شود اما معمولاً سالی دو بار رخ می دهد . عود تب خال با حالت سوزش و گزگزناحیه اطراف دهان شروع می شود و سپس ضایعات دانه ای آبدارگروهی ایجاد می شود و در عرض حدود یک هفته تا ۱۰ روز نیز بهبود می یابد و اسکار نیز بجا نمی گذارد . البته در صورتی که عفونت باکتریال ایجاد شود احتمال آن هست که اسکار یا پررنگی پوست نیز بجا بگذارد . باید توجه داشت که در عود تب خال برخلاف تب خال اولیه ضایعات مخاطی رخ نمی دهد . محل بروز عود تب خال می تواند در اطراف چشم ، گونه ، بینی و یا حتی در مناطقی غیر از صورت مانند ناحیه کمر نیز باشد . یک نوع تب خال هم بطور مکرر در ناحیه گوش کشته گیران رخ می دهد . عود تب خال در سنین جوانی بیشتر روی می دهد و با بالا رفتن سن از تعداد عود بیماری کاسته می شود . عواملی که باعث عود تب خال می شوند شامل اضطراب ، ترس ، تب ، کابوس

بیماری تب خال یک بیماری ویروسی است که اکثرآ اولین تماس با این ویروس در کودکی رخ می دهد که در این زمان معمولاً به شکل بدون علامت بوده اما گاه می تواند به شکل یک بیماری حاد رخ دهد . در این صورت کودک دچار تب ، بد حالی ، ضایعات پوستی و مخاطی در اطراف و داخل دهان می شود . ضایعات پوستی به شکل دانه های آبدار کوچک در زمینه قرمزی زخمی شده مخاط همراه سوزش و درد می باشد . ضایعات پوستی معمولاً بصورت گروهی می باشند . کودک مبتلا بعلت درد موقع غذا خوردن ممکن است از این کار امتناع کند و یا حتی بعلت درد موقع فروبردن آب دهان ، دچار ریزش آب دهان از کناره دهان خود بخصوص در شبها گردد . گره های لنفاوی زیر فکی نیز متورم و بزرگ می شوند . این بیماری حاد خود بخود در عرض حدود یک هفته بهبود می یابد و بجز درمانهای معمولی به اقدام خاصی نیاز ندارد . ویروس تب خال در گره های عصبی ناحیه بصورت غیرفعال باقی مانده و ممکن است بعد از آن به شکل عود تب خال

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

تب خال (هرپس سیمپلکس)

WWW.MYSKIN.IR

۱۸

خطرات این درمان در ناحیه اطراف چشم در این ناحیه باید از به کار بردن این داروها خودداری نمود.



شباهه، آفتاب شدید، سوز و سرما می شدید، دوره های هورمونی خانمها و اعمال درمانی زخمی کننده پوست می باشد. که جهت پیشگیری در چنین مواردی می توان قبل از واقعه عامل عود، از درمانهای خوراکی ضد ویروس استفاده نمود. درمان در موارد اولیه تب خال دهانی شامل مسکن ها، دهان شویه ها و درمانهای ضد ویروسی خوراکی مانند آسیکلورویر می باشد. در عود تب خال معمولاً نیازی به درمان خاصی نیست و ضایعه خود بخود بهبود می یابد اما در صورت نیاز به درمان می توان از پماد های ضد ویروسی مانند آسیکلورویر و در صورت بروز عفونت باکتریایی از پماد موپیروسین استفاده نمود. در مورد داروهای موضعی ضد ویروسی باید خاطر نشان ساخت که در صورت استفاده زودرس یعنی به محض شروع سوزش ناحیه می توانند تا حدی اثر داشته باشند در غیر این صورت اثر آنها بسیار کم می شود. استفاده از کمپرس سرد تا حدی از التهاب و ورم ناحیه کم می کند. در صورت صلاح دید پزشک معالج گاهی از استروییدهای موضعی قوی در کاهش التهاب تب خال استفاده می شود که با توجه به

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۰۱

گال

WWW.MYSKIN.IR

۱۹

می تواند باعث سرایت شود . در خوابگاه ها، سر بازخانه ها ، مراکز بهزیستی نگهداری معلومین و سالمندان احتمال سرایت از فردی به فرد دیگر و ابتلای تعداد زیادی از افراد هست . حتی در بیمارستان گاهی این بیماری می تواند شیوع یابد.

علائم بیماری گال شامل سه دسته علائم است :

۱- علائم بعلت خود مایت : کانالهایی که مایت عامل بیماری در پوست ایجاد می کند توسط فرد آشنا با بیماری قابل شناسایی است این کانالها بیشتر درین انگشتان دست ، مچ دست ، ساعد و نواحی تناسلی قابل مشاهده است .

۲- علائم بعلت واکنش بدن به مایت : این ها شامل بر جستگیهای قرمز شدیداً خارش دار در نواحی تناسلی ، کمر ، رانها و زیر بغل است که این بر جستگیها می تواند بزرگ و یا کوچک باشد .

۳- علائم بعلت خاراندن پوست توسط فرد بیمار : در اثر خاراندن پوست خراشیدگی هایی ایجاد می شود که

بیماری گال یک بیماری پوستی بعلت آلدگی انگلی با یک نوع حشره میکروسکوپی از جنس مایت می باشد . این نوع مایت جنس نر و ماده دارد که نوع ماده برای انسان بیماریزا است . این حشره با نقب زدن در لایه های سطحی پوست سعی می کند تا در اعماق این کانالها تخمگذاری کند و با این کار نسل خود را بقا بخشد . واکنش بدن انسان به این حشره به شکل خارش شدید می باشد که همین خارش باعث می شود تا تعداد این مایت در نوع معمولی بیماری گال بیش از ۱۲ تا ۱۴ عدد نشود . و این بعلت خاراندن و کندن پوست توسط بیمار می باشد که نقبهای ایجادی را نیز تخریب می کند . از زمانی که مایت روی پوست قرار می گیرد تا زمانی که خارش شروع می شود حدوداً ۳ تا ۴ هفته طول می کشد . بنابراین برای آنکه بدانیم فرد چگونه دچار بیماری شده باید از حدود یک ماه قبل از بروز خارش به بررسی بپردازیم . بیماری گال توسط تماس مستقیم با فرد مبتلا (مثل تماس جنسی) و یا تماس با حوله ، پتو و لباس بیمار سرایت می کند . دست دادن معمولاً باعث سرایت نیست اما دست به دست دادن طولانی

پوست گال
و تیز
نمک
و زنگنه

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۰۶۴۴۶۳۵۰۱

گال

WWW.MYSKIN.IR

۲۰

زیر میکروسکوپ خود مایت یا اجزای آن و یا تخم و یا مدفوع آن قابل رویت بوده و بدین وسیله تشخیص قطعی می شود . البته این آزمایش باید توسط فردی گرفته شود که با این بیماری آشنایی کافی دارد و در نمونه گیری نیز از تبحر لازم برخوردار باشد .

درمان بیماری گال توسط داروهای موضعی می باشد که معمولاً تمام بدن از گردن به پایین با دارو آغشته شده و یک شب تا صبح روی پوست می ماند و صبح شسته می شود این کار دوبار به فاصله یک هفته انجام می شود و معمولاً پس از سه تا چهار هفته پس از درمان نیز خارش رفع می شود . داروها شامل گاما بنزن هگزرا کلراید ، پرمترین ، ملاتیون ، کروتامیتون ، بنزیل بنزووات و سولفورمی باشد که در مرور نحوه درمان با آنها باید با پزشک معالج مشورت نمود . زیرا روش‌های درمانی با آنها گاهی متفاوت است . در زنان حامله و یا مادران شیرده و کودکان زیر ۲ سال باید از گاما بنزن استفاده نمود . این دارو خطر مسمومیت عصبی داشته لذا در مبتلایان به بیماریهای عصبی فعل مانند صرع نیز باید

معمولًا خطی است و گاهی اینها دچار عفونت و یا حساسیت پوستی نیز می شود که همه اینها در اثر خارش شدید بیماری ایجاد شده است و با آنکه علامتی اختصاصی نیست اما در تشخیص بیماری کمک کننده می باشد .

خارش بیماری گال بسیار شدید است بطوری که اجازه خواب راحت به بیمار نمی دهد .

خارش شبها و با گرم شدن پوست بیشتر می شود و حمام گرم نیز خارش را تشدید می کند .

خارش بیماری گال با کندن پوست توسط بیمار مبتلا همراه است و معمولاً مالیدن پوست خارش را التیام نمی بخشد . در چنین خارشهایی حتماً باید پزشک معالج به فکر بیماری گال باشد تا هم فرد بیمار را از بیماری نجات دهد و هم افراد خانواده او را از ابتلای به این بیماری محافظت کند .

تشخیص بیماری گال اکثراً به صورت بالینی و با شرح حال دقیق و دیدن علائم ذکر شده است اما گاهی نیاز است تا با آزمایش از پوست بیمار به تشخیص بیماری برسیم . آزمایش بیماری گال یک آزمایش مستقیم میکروسکوپی با استفاده از خراشیدن کانالهای پوستی است که در

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۳۵۴۶۴۴۶

گال

WWW.MYSKIN.IR

۲۱

از داروهای موضعی کم کننده ضخامت لایه شاخی (کراتولیتیک) است.



فعال مانند صرع نیز باید استفاده شود. در این موارد می‌توان از داروهای کم عارضه تر مانند کروماتیتون استفاده نمود.

گال در شیرخواران کمی با بزرگسالان متفاوت است. در این سنین زیربغل و کف دست و پا دچار ضایعات قرمز برجسته شده و گاهی سروصورت نیز مبتلا می‌شود در صورتی که در بزرگسالان سروصورت "معمول" مبتلا نمی‌گردد.

یک نوع گال هم به نام گال دلمه دار وجود دارد که در افرادی رخ می‌دهد که به علتی خارش را درک نمی‌کنند و یا قادر به خاراندن نیستند (مثلًاً در افراد ناتوان، سندروم داون و فلچ اندامها) در این موارد تعداد مایت در پوست فرد مبتلا به میلیونها عدد می‌رسد و ضایعات پوستی نیز به شکل برجستگیهای پوسته دار در روی قوزک پا، آرنج، زانو و مچ دست می‌باشد. تشخیص این نوع گال مشکلتر بوده و گاه با بیماریهای دیگر مانند اگزما و پسوریازیس اشتباه می‌شود. درمان این نوع گال علاوه بر گاما بنزن، استفاده

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۴۶۴۴۶۳

زرد زخم

WWW.MYSKIN.IR

۲۲

ضایعات نوع تاولی که تقریباً مختص کودکان است به شکل تاولهای ریزودرشتی است که با کنده شدن سقف تاولها ، سطح قرمزی بجا می- ماند که با پیوستن این سطوح به هم احتمال دارد مناطق وسیعی را نیز درگیر کند . یک نوع این بیماری به شکل خیلی وسیع بروز کرده که عامل آن یک نوع استافیلوکوک است که سم (توكسین) ترشح می کند . این سم با ازبین بردن لایه های سطحی پوست باعث می شود که همانند سوختگی تمام بدن بدون پوست و در مقابل عفونتها بی حفاظ گردد . البته خوشبختانه این نوع بیماری خیلی ناشایع است و تنها در شیرخواران و افراد با سطح ایمنی پایین یا دچار بیماری کلیوی پیشرفتہ رخ می دهد . درمان زردزخم معمولی و غیرتاولی تنها شستشو با صابونهای ضد باکتری واستفاده از پمادهای موضعی آنتی بیوتیکی است . البته در موارد شدید و وسیع از آنتی بیوتیکهای خوراکی نیز می توان استفاده نمود . در مورد بیماری زرد زخم تاولی استفاده از آنتی بیوتیکهای خوراکی در موارد شدید حتی تزریقی ضروری است . چون بیماری از طریق

بیماری زرد زخم یک بیماری به علت باکتری استرپتوکوک یا استافیلوکوک و یا هر دو می- باشد . این بیماری بیشتر در کودکان و نوجوانان شایع است و فصل شیوع آن تابستان می باشد . ضایعات به شکل دلمه های زرد عسلی رنگ می باشد که بر روی پوست قرمز و زخمی شده قرار دارد که این دلمه ها به راحتی کنده می شوند . اکثرآ این ضایعات بر روی صورت و بخصوص اطراف دهان و بینی قرار دارند . گاهی این بیماری بر روی یک بیماری دیگر مثل اگزما یا تب خال یا آبله مرغان اضافه می شود . انتقال بیماری از طریق تماس مستقیم و یا تماس با حوله و وسایل شخصی فرد بیمار است . معمولاً در خانواده این بیماری می تواند از کودکی به کودک دیگر انتقال یابد . این بیماری دو نوع دارد که یکی تاولی و دیگری غیر تاولی است . در نوع غیر تاولی عامل بیماری بیشتر یک نوع باکتری به نام استرپتوکوک است و در نوع تاولی نیز اکثرآ عامل استافیلوکوک است . البته گاهی نیز بخصوص در موارد طول کشیده احتمال وجود هر دو عامل در ضایعات وجود دارد .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۳۵۰ ۶۴۴

زرد زخم

WWW.MYSKIN.IR

۲۲

به شرطی که فرد نسبت به این ماده واکنش حساسیتی نداشته باشد و غلظت بتادین نیز کاملاً حساب شده باشد .



وسایل شخصی فرد نیز انتقال می یابد پس جدا نمودن این وسایل نیز درپیشگیری از بیماری کمک کننده است . یک نوع بیماری شبیه زرد زخم نیز هست که نامش اکتیما (echtyma) است و در این حالت در زیر دلمه های مشخصه بیماری زخمی نسبتاً عمیق وجود دارد که همین زخم باعث ایجاد اسکار یا جوشگاه پس از بهبودی بیماری می شود؛ در صورتی که بیماری زرد زخم معمولاً ۷ تا ۱۰ روزه بدون اسکار بهبود می یابد . در اکتیما تب و بیحالی و بزرگی غدد لنفاوی ناحیه مبتلا نیز می تواند رخ دهد که در بیماری زرد زخم چنین مواردی معمولاً وجود ندارد . درمان اکتیما نیز استفاده از آنتی بیوتیکهای خوراکی است. چون عامل ایجاد زرد زخم معمولاً به پنی سیلین مقاوم است لذا لازم است در درمان از آنتی بیوتیکهای دیگر مانند کلوکزاسیلین و دی کلوکزاسیلین و سفالکسین به تشخیص پزشک معالج استفاده نمود . برداشتن دلمه های مشخصه بیماری نیز در درمان موثر است که این کار را می توان با خیساندن دلمه ها توسط کمپرس گرم انجام داد . استفاده از حمام بتادین نیز می تواند کمک کننده باشد البته

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۴۶۴۴۶۳

کهیر

WWW.MYSKIN.IR

۲۴

گاهی علت کهیر فیزیکی می باشد مثلاً گرما ، سرما ، آفتاب ، فشاربرروی پوست ، تماس با آب ، ارتعاش پوست ، ورزش و تعریق همه و همه می توانند در برخی افراد مستعد ایجاد ضایعات کهیری نمایند که در صورت تشخیص علت می توان با پرهیز از شرایط ایجاد کهیر ، بروز آن را تا حدی کنترل نمود . بیماری کهیر در هرسنی می تواند رخ دهد و گاه سالها طول می کشد تا بطور کامل بهبود یابد اما اکثرآ در عرض ۲ سال بر طرف می شود که البته احتمال عود بیماری نیز وجود دارد . خارش بیماری کهیر می تواند بسیار شدید بوده و باعث گردد که فرد از فعالیتهای روزمره خود باز بماند . گاه کهیر علامتی از حالت آنافیلاکسی یا حساسیت حاد شدید می باشد که نیاز به درمان اورژانسی دارد . درین بیماری هایی که می توانند باعث کهیر مزمن شوند می توان به عفونتهای مختلف ، بیماری های تیر و وید ، بیماری های کلاژن و اسکولار و بد خیمی ها اشاره نمود . درین عفونتها می توان از هپاتیت ، منونوکلئوز عفونی ، عفونتها باکتریال سینوسها ، دندانها ، کیسه صفراء و دستگاه ادراری نام برد .

کهیر برجستگی شدیداً خارش دار پوست می باشد که ممکن است قسمت کوچکی از پوست بدن و یا تمام بدن را فراگیرد . این برجستگی پوست به رنگ قرمز و یا صورتی می باشد . گاهی چندین قسمت کوچک کهیر به هم متصل شده و قسمتهای بزرگی را ایجاد می کنند . ضایعات کهیر معمولاً چند دقیقه تا چند ساعت بیشتر دوام ندارد . اگر بیماری کهیر کمتر از ۲ ماه طول کشیده باشد آن را کهیر حاد و اگر بیش از آن طول بکشد آن را کهیر مزمن می نامیم . گاهی کهیر همراه با ورم زیر پوست یا آنتیوادم رخ می دهد که این حالت بیشتر در لبها و پلکها می تواند رخ دهد . کهیر می تواند بر اثریک واکنش آلرژیک به برخی غذاها یا داروها یا گرده گیاهان و یا نیش حشرات رخ دهد . در کهیر حاد پیدا کردن علت معمولاً مشکل بوده و نیازی به آزمایشات پیچیده جهت این کار نیست . اما در کهیر مزمن می توان اقدام به بررسی آزمایشگاهی نمود تا علت پیدا شود که در ۹۰ درصد موارد نیز علتی پیدا نمی شود زیرا کهیر مزمن اکثرآ از نوع ایدیوپاتیک و یا بدون علت واضح است .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست ، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران - م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۳۵۰۶۴۴۶

کهیر

WWW.MYSKIN.IR

۲۵

خارش می توان استفاده نمود . داروهای آنتی هیستامین خوراکی مانند هیدروکسی زین ، ستیریزین ، لوراتادین ، سیپروهپتادین ، داکسپین، سایمتیدین ، رانیتیدین و داروهای مانع آزادسازی هیستامین مانند کتوتیفن از جمله داروهای خوراکی هستند که در درمان کهیر استفاده می شوند و با کنترل وضعیت بیمارمی توان به مقدار مناسب دارو برای هر بیمار پی برد . در موارد خیلی شدید وحد می توان از داروهای استروییدی تزریقی نیز استفاده نمود که هیدروکورتیزون کم عارضه ترین این نوع داروها می باشد . در مورد آنافیلاکسی یا شوک آرژیک درمان باید در مرآکزاوزثرانس انجام گیرد که در این موقع بهترین دارو اپی نفرین می باشد که در این مرآکز جهت درمان شوک استفاده می شود . درمان کهیر مزمن نیاز به صبر و حوصله زیادی از طرف پزشک و بیمار دارد تا بتوان دریک تعامل مثبت و سازنده به بهترین درمان دست یافت و با توجه به اینکه بیماری کهیر در نهایت خود بخود ببهبد یابنده می باشد لذا لازم است در صورتی که پس از بررسیهای آزمایشگاهی علتی برای کهیر پیدا نشد به بیمار اطمینان داد که

از بین داروهای موثر در ایجاد کهیر می توان به آسپیرین و داروهای دیگر ضد التهاب غیراستروییدی و انواع آنتی بیوتیکها از جمله پنی سیلین ها اشاره نمود. البته داروها به دوروش می توانند باعث کهیر شوند یکی از راه ایجاد واکنش آرژیک مانند آرژی به پنی سیلین و دیگری از طریق آزاد سازی مستقیم هیستامین که مدیاتور اصلی کهیر می باشد و آزادسازی این ماده از سلولها باعث ایجاد علائم کهیر می گردد. از جمله داروهایی که با این روش ایجاد کهیر می کنند می توان به کورار، پلی میکسین و مخدّرها اشاره نمود .

درمان

تنها راه قطعی در درمان کهیر، تشخیص و پیشگیری از تماس با علت محرکه ایجاد آن می باشد . از تماس با عوامل باعث شدت بیماری نیز باید پرهیزنmod . از جمله این عوامل می توان به داروهای ضد التهاب غیر استروییدی، غذاهای آماده ، افزودنیهای خوراکی ، گوجه فرنگی ، توت فرنگی، آجیله و شکلات اشاره نمود . ازلو سیونهای ضد خارش مانند کالامین یا داروهای حاوی متول یا فنول جهت کاهش

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

کهیر

WWW.MYSKIN.IR

۲۶

می توان با داروهای مختلف بیماری را تحت کنترل درآورد تا درآینده خودبخود بهبود یابد؛ و با آنکه داروهای مصرفی درمان قطعی بیماری نمی باشند اما قادرند زندگی بدون کهیر را برای بیمار فراهم نمایند.

www.myskin.ir



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۶۳۵۰۱

شپش

WWW.MYSKIN.IR

۲۷

بطوری که گفته می شود تخم شپشی که از حدود ۱/۵ سانتیمتری سر بالاتر باشد نشانه آلودگی قبلی بوده که نیاز به درمان ندارد . یک هفته بعد از ایجاد تخمها ، لارو شپش از آنها خارج شده که در عرض یک هفته نیز این لاروها به شپش بالغ تبدیل می شوند . این چرخه ادامه یافته و آلودگی در انسان گسترش دارد و به افراد دیگر نیز سرایت کرده و گاه اپیدمی بیماری بروز می کند .

کودکان مبتلا ممکن است از خارش سر شاکی باشند ولی گاهی این خارش خیلی آزاردهنده و مشخص نیست و وجود تخم شپش در سرباعث تشخیص بیماری می گردد . تخم شپش به شکل نقطه های سفیدی در طول موها می باشد که به سختی به مو چسبیده اند و به راحتی کنده نمی شوند و همین امر باعث افتراق آنها از شوره معمولی سراست . محل شایع این تخمها در موهای پشت سر و بالای گوش می باشد . گاه تعداد این تخمها آنقدر زیاد است که مانند سفیدی مو بروز می کند که این حالت خیلی نادر اتفاق افتاده و اکثرًا تخمها به تعداد کمتری وجود دارند . گاهی خارش شدید سر

شپش حشره ای است که انگل انسان محسوب شده و با زندگی بر روی پوست و موی فرد آلوده به آن ، از خون فرد تغذیه می کند . این حشره خیلی ریز بوده اما بدون میکروسکوپ می توان آن را دید . سه نوع از این حشره می تواند پوست و مو را آلوده کند که عبارتند از: شپش سر ، شپش بدن ، شپش عانه (پوبیک) شپش سر بیشتر در کودکان بخصوص دخترچه ها شایع است اما در زنان و پسرچه ها نیز دیده می شود و با آنکه با وضعیت بهداشتی فرد ارتباط دارد اما نمی توان بیماری شپش سر را مختص افراد فقیر و با وضعیت بهداشتی نامناسب دانست بطوری که کودکان خانواده های مرفه نیز گاه دچار آن می شوند . در سفید پوستان شایعتر از سیاه پوستان است که این بعلت شکل خاص سطح مقطع مو در سیاهان است . اندازه شپش سر حدود ۳ میلیمتر بوده که تخم آن نیز حدود یک میلیمتر است . تخم شپش به شکل مخروطی ، سفید رنگ و کاملاً چسبیده به مو می باشد . تخم های نزدیک به کف سر بیشتر احتمال دارد که حاوی لارو شپش باشد اما هر چه از سطح سر دورتر باشد احتمال خالی بودن آنها بیشتر است.

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۶۴۴۶۳۵۰۱

شپش

WWW.MYSKIN.IR

۲۸

محلولهای ضد شپش مختلف قابل انجام است اما مهمتر از استفاده از دارو، آبکشی پس از درمان است که بهتر است با مخلوط آب و سرکه انجام شود که این مخلوط بر روی شانه چوبی و یا فلزی ریخته شده و توسط شانه موها شانه می شود که با این کار تخمهای چسبیده به موی سر نیز جدا می شود. در صورتی که خود شپش و تخم آن در سر پیدا نشود و یا اگر تخم وجود داشت در بالاتر از ۱/۵ سانتیمتری سطح سر باشد بیمار درمان شده و نیاز به درمان دیگری ندارد. درمورد دانش آموزان نیز این ملاک قابل استفاده است تا درمورد بازگشت به مدرسه آنها تصمیم گرفته شود. نکته مهم در شپش سر آن است که هیچ خانواده‌ای با هرمیزان ثروت و رفاه نمی‌تواند خود را از این بیماری مصون بداند و رعایت نکات بهداشتی در این بیماری بسیار اهمیت دارد. شپش بدن بیشتر در افراد بیخانمان و یا در زمانهای سیل وزلزله و جنگ شایع است. البته در کسانی که در محلهایی غیر از خانه خود می‌خوابند مانند رانندگان و سرایداران نیز می‌تواند رخ دهد. بیماری با خارش بدن همراه با کنده شدن

باعث کندگی پوست ناحیه شده و با اضافه شدن عفونت، زردزخم سر بروز می‌کند که در چنین مواردی حتماً باید به فکر شپش سر بود و باید سر بیمار از لحاظ وجود شپش یا تخم آن معاینه گردد. غیر از تخم شپش در موارد آلودگی شدیدتر خود شپش نیز در روی موها مشهود است که اندازه آن کوچکتر از مورچه‌های خیلی کوچک بوده ورنگ آن نیز از قهوه‌ای تا سیاه می‌تواند باشد. انتقال شپش سر از طریق تماس مستقیم یا از راه تماس با وسایل آلوده فرد مبتلا است. وسایلی مانند برس و شانه، گیره مو، گل سر، روسربی و چادر، کلاه و حوله حمام بیشتر می‌تواند آلوده کننده باشد. از طریق وسایل آرایش مو نیز بیماری قابل انتقال است. بنابراین به اشتراک بودن تمام اینها می‌تواند باعث شیوع بیماری در افراد شود.

تشخیص بیماری معمولاً توسط مریبیان بهداشت مدارس و یا والدین کودک داده شده و در صورت تایید توسط پزشک، درمان آغاز می‌شود. درمان بیماری با شامپوهای ضد شپش و یا

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۶۴۶۳۵۰۱

شپش

WWW.MYSKIN.IR

۲۹

از بین بردن شپش و تخم آن استفاده می شود . اکثر درمانهای شپش نیاز به تکرار پس از یک هفته تا ۱۰ روز دارند که این کار برای آن است که لاروهای شپش نیز که تازه از تخم خارج شده اند نیز از بین بروند .

شکل ظاهری شپش عانه (پوبیک) با دونوع شپش قبلی کمی متفاوت است . این نوع شپش کوتاهتر و پهن تر بوده و دارای چنگالهای قوی بوده که می تواند توسط آنها به مو بچسبد . این شپش بیشتر در موهای نواحی تناسلی بوده اما می تواند در هر منطقه مودار دیگر بدن نیز مانند رانها ، سینه ، زیر بغل ، ریش و سبیل ، مژه و ابرو و حتی سر نیز پیدا شود . این شپش باعث خارش شدید ناحیه تناسلی شده و در کسانی که بهداشت را رعایت نمی کنند بیشتر بروز می کند . بیماری شپش تناسلی جزء بیماریهای آمیزشی محسوب شده و با تشخیص این بیماری باید به فکر بیماریهای دیگر آمیزشی مانند گال ، سیفلیس ، ایدز ، سوزاک و بود و در صورت نیاز از نظر وجود آن بیماریها نیز فرد را مورد بررسی قرار داد . احتمال ابتلا به این بیماری با یکبار تماس

پوست بعلت خاراندن بروز می کند . گاهی آثار خون خشک شده نیز در روی بدن مشهود است . این نوع شپش از لحاظ شکل ظاهری شبیه به شپش سراست ولی کمی طول آن بیشتر می باشد . این شپش بیشتر در مناطق چینهای لباس زیر فرد زندگی و تخم گذاری کرده و در موقع تغذیه به روی پوست می آید . بنابراین تشخیص بیماری با دیدن شپش یا تخم آن در لباس فرد و یا آثار آن در روی لباس و پوست فرد امکان پذیر است . گاه بیماری شپش بدن باعث اگزما ، زرد ذخم ، کهیر و کلفتی و تیره رنگ شدن پوست (لیکنیفیکاسیون) می شود . شپش بدن ناقل بیماریهایی نظیر تیفوس و تب راجعه نیز می تواند باشد که از این لحاظ نیز حائز اهمیت است . جهت درمان شپش بدن ابتدا بدن با آب و صابون شسته شده و سپس از محلولهای ضد شپش مثل پرمترین و یا مالاتیون و یا گاما بنزن هگزاکلراید استفاده شده و طبق دستور مصرف پس از مدت زمان خاصی شسته و آبکشی می شود . توجه به درمان لباس فرد مهمتر از درمان پوست اوست . لذا از شستشو در آبگرم و اتوکشیدن لباسها جهت از

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۰۶۳۵۰۱

شپش

WWW.MYSKIN.IR

۳۰



www.myskin.ir

جنسی با فرد مبتلا حدود ۹۵٪ می باشد . در معاینه فرد مبتلا به سختی می توان شپش را دید اما تخم شپش را می توان پیدا نمود که به موهای ناحیه چسبیده اند . علاوه بر آنها می توان لکه هایی آبی خاکستری دید که بعلت وجود شپش بر روی پوست ناحیه مبتلا ایجاد می شوند . درمان این نوع شپش نیز استفاده از داروهای موضعی ضدشپش می باشد که پس از استفاده باید پس از یکربع شسته شود و بهتر است درمان پس از یک هفته دوباره تکرار شود .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۶۳۵۰۱

پیسی یا ویتیلیگو

WWW.MYSKIN.IR

۳۱

گاهی نیز این بیماری حالت درماتومال به خود می‌گیرد یعنی قسمتی از پوست را که توسط عصب خاصی عصب دهی می‌شود درگیر می‌کند. سیربیماری خیلی قابل پیش‌بینی نیست اما درمواردی که سالها بیماری در محل ثابتی باقی مانده است و پیشرفت زیادی نداشته معمولاً بعيد است که به ناگهان پیشرفت زیادی داشته و تمام بدن را فرا گیرد. مواردی که از ابتدا پیشرونده هستند می‌توانند تمام بدن را گرفتار کند. دربیماران ویتیلیگویی احتمال بروزبیماریهای دیگرخودایمنی مانند آنمی پرنیسیوز، آلوپسی آره اتا، تیروییدیت اتوایمیون و... بیشتر از افراد عادی است. لکه‌های سفید پوستی می‌توانند همراه با ایجاد سفیدی درموهای همان منطقه باشد که احتمال درمان پذیربودن بیماری در این حالت کمتر می‌شود. لکه‌های سفید پوستی اکثراً بصورت متقارن در بدن بروز می‌کند. این بیماری گاهی می‌تواند با برخی بیماریهای دیگرپوستی اشتباه شود که از جمله این بیماریها می‌توان به پیتریازیس آلباء، پیتریازیس ورسیکالر، خالهای بیرنگ مادرزادی و بیرنگیهای پوستی همراه با برخی

www.myskin.ir

بیماری ویتیلیگو به احتمال زیاد یک بیماری خود ایمنی است که در آن سیستم ایمنی بدن دربرابر سلولهای رنگدانه ای پوست واکنش نشان داده و آنها را تخریب می‌کند. حدود یک درصد مردم دچار این بیماری هستند و این بیماری در هر سنی می‌تواند بروز کند اما نیمی از موارد بیماری در زیر سن ۲۰ سال بروز می‌کند. در ۳۰٪ موارد سابقه خانوادگی این بیماری در فرد مبتلا وجود دارد. ضایعات پوستی به شکل لکه‌های بیرنگ و سفید پوستی است که این لکه‌ها می‌توانند بزرگ و یا کوچک باشد. این لکه‌ها می‌توان با استفاده از وسیله‌ای بنام لامپ وود مشاهده کرد که در زیر نور این لامپ به وضوح حالت مرمری و سفید لکه‌ها مشخص می‌شود. محل بروز این بیماری در هر نقطه ای از بدن می‌تواند باشد. اما پشت دستها، زانوها، آرنجها، کناره لبه‌ها، ناحیه تناسلی و صورت از نقاط نسبتاً شایعتر بروز این بیماری می‌باشد. از لحظه انتشار بیماری ویتیلیگو می‌تواند لوکالیزه یا سگمنتال باشد یعنی فقط منطقه خاصی از پوست را درگیر کند و یا اینکه یونیورسال باشد یعنی تمام یا تقریباً تمام بدن را درگیر سازد.

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۴۴

پیسی یا ویتیلیگو

WWW.MYSKIN.IR

۳۲

روشهای درمانی پیچیده تری نیز در این بیماری استفاده شده که بیشتر شامل کشت سلولهای ملانوسیت (سازنده رنگدانه پوست) واستفاده از آنها در پوست مبتلا می باشد . اما با این روشهای نیز بیماری ویتیلیگو بطور کامل درمان نشده است و هنوز هم این بیماری دارای درمان قطعی نمی باشد .



از سندرمهای اشاره نمود .
بیماری ویتیلیگو درمان قطعی نداشته اما٪ ۳۰ موارد این بیماری خود بخود می تواند بهبود یابد . از جمله درمانهای رایج برای این بیماری می توان به ترکیبات استروییدی موضعی ، پیمکرولیموس موضعی ، استفاده از فتو تراپی همراه با داروی پسورالن و استفاده از لیزر اگزایمر اشاره نمود . گاهی نیز از چند روش درمانی همزمان می توان بهره برد مثلاً استفاده از پیمکرولیموس موضعی ولیزراگزایمر در یک زمان که می تواند در مواردی باعث بهبودی نسبی ضایعات گردد . البته در مواردی نیز می توان تنها از روش پوشاندن ضایعات با کرم‌های رنگی مخصوص استفاده کرد که بدون آنکه اثر درمانی خاصی داشته باشد می تواند بیمار ویتیلیگویی را از عذاب دیده شدن ضایعات پوست خود توسط دیگران نجات دهد . گاهی بیماران بطور شدیدی دچار ویتیلیگومی شوند و تقریباً تمام پوستشان بیرنگ می گردد . در این موارد می توان قسمتهایی که بیرنگ نشده اند را با کرم‌های بیرنگ کننده قوی سفید نمود تا تمام پوست بدن بطور یکنواخت بیرنگ باشد .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزا بابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۶۳۵۰۱

دکتر محسن فیاض

متخصص پوست، مو زیبایی و لیزر

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

W W W . M Y S K I N . I R

خدمات زیر توسط دکتر فیاض در کلینیک مجهرز پوست، مو و زیبایی انجام می‌پذیرد.

- ✓ از بین بردن دائمی موهای زائد با استفاده از لیزر
- ✓ کاهش چین و چروکهای سطحی و عمیق پوستی با استفاده از دستگاه لیزر جدید **Fraxel**
- ✓ تزریق بوتاکس جهت چین و چروکهای عمیق
- ✓ رفع جای جوشهای فرورفته و اسکارهای باقی مانده از محل بریدگی ها
- ✓ رفع ترکهای پوستی (استریا) حاصل از چاقی با استفاده از دستگاههای پیشرفته
- ✓ رفع چین و چروکهای دور لب، اطراف چشم با استفاده دستگاههای پیشرفته
- ✓ رفع افتادگی پوست
- ✓ جوان سازی پوست
- ✓ شفاف سازی پوست
- ✓ و ...

آیا از عوارض جبران ناپذیر استفاده از دستگاههای لیزر زیر نظر افراد غیر متخصص آگاهی دارد ؟

آدرس مطب : م پونک - خ میرزا بابایی - بلوار عدل - بالای داروخانه ایرانا - طبقه چهارم واحد ۲۷

شماره تلفن مطب : ۰۱۳۵۴۶۴۴

حال‌ها

WWW.MYSKIN.IR

۳۳

آنها از قهوه ای روشن تا قهوه ای تیره و سیاه متفاوت می‌باشد. اندازه آنها نیز کمتر از یک سانتی‌متر است. حالها ممکن است صاف یا زبر، موداریا بدون مو باشند. حالهای دوران نوجوانی معمولاً از نوع جانکشنال هستند که این نوع حالها با زنگ قهوه ای روشن و به تعداد زیاد و اندازه کوچک دردست و صورت ایجاد می‌شوند. حالهای کامپاند معمولاً بزرگ‌تر و تیره تروگاهی موداره استند. حالهای ایترادرمال نیز بزرگ و بارنگدانه کم می‌باشد و در سنین بالاتر وجود دارند. حالهای مادرزادی به دونوع تقسیم می‌شوند خالهای با قطر کمتر از ۳ سانتی‌متر و خالهای بزرگ‌تر از آن. که در مرد خالهای کوچک می‌توان پس از بلوغ به برداشتن آنها اقدام نمود اما در موارد بزرگ‌تر توصیه می‌شود در دوران کودکی اقدام به برداشتن آنها نمود. یک نوع خال بنام خال دیس پلاستیک وجود دارد که اینها بزرگ‌تر از معمول بوده و رنگ آنها نیز غیریکنواخت است این نوع خال ممکن است در دوران کودکی و یا بزرگ‌سالی ظاهر شود و ممکن است از یک خال کوچک‌تر ایجاد شود. این خالها گاهی اوقات در برخی خانواده‌ها بصورت ارشی ایجاد می‌شود.

حال‌ها بر اثر افزایش بی‌ازحد سلولهای پوستی دارای رنگدانه که به آنها اصطلاحاً ملانوسیت گفته می‌شود ایجاد می‌گردد. سلولهای خال با ملانوسیتها متفاوت بوده و به آنها سلول خال یا نووس سل می‌گویند. خالها چندین نوع بوده و می‌توانند در هرجایی از پوست بدن تشکیل شوند. خالها ممکن است بعد از تولد در نوزاد ایجاد شوند و یا اینکه در دوران کودکی یا اوایل نوجوانی بوجود آیند که در مرد اول آنها رامادرزادی می‌گوییم و در مرد دوم آنها را اکتسابی می‌نامیم. تقریباً هر فرد بزرگ‌سالی تا سن ۳۰ سالگی حدود ۲۰ تا ۳۰ خال خواهد داشت. اکثر خالها غیر سرطانی هستند اما در موارد نادری ممکن است یک خال دچار تغییراتی شود که آن را سرطانی می‌کند. تغییراتی که در شکل، رنگ، و اندازه خالها ایجاد می‌شوند همیشه علامت سرطان نمی‌باشد و می‌تواند این تغییرات در هنگام بلوغ یا در دوران حاملگی بطور طبیعی ایجاد شود. اما با اینحال این تغییرات باید همیشه توسط یک پزشک متخصص پوست بررسی و ارزیابی گردد. معمولاً خالها صاف یا برجسته هستند و رنگ

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزا بابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

حال‌ها

WWW.MYSKIN.IR


۳۴

هر نوع خالی ممکن است سرطانی شود اما این نوع خال بیشتر از بقیه خالها احتمال سرطانی شدن دارد. خطر سرطانی شدن این خالها در افرادی که دارای سابقه فامیلی ملانوم بدخیم هستند و یا به میزان زیادی در معرض نور خورشید هستند؛ بیشتر است. یک نوع خال هم بنام خال آبی وجود دارد که می‌تواند از عمق زیادی برخورد اربووده و در صورت نیاز به درمان باید بطور کامل و عمقی برداشته شود. در صورتی که خال بیش از حد معمول بزرگ باشد و یا رشد سریع داشته باشد و یا رنگ آن تغییر کرده باشد و یا خارش و التهاب در آن ایجاد شده باشد و یا دچار خونریزی شود باید توسط متخصص پوست بررسی گردد و در صورت نیاز اقدام به جراحی و بررسی آسیب شناسی نمونه کرد. خال غیر مشکوک به سرطان رانیز می‌توان به دلیل زیبایی برداشت اما همیشه احتمال عود خال و بر جای گذاشتن اسکاررا باید در نظر داشت و در صورتی که پزشک صلاح دانست می‌توان به برداشتن خال با روش جراحی اقدام نمود و یا از روشهای لیزر درمانی خال استفاده کرد.

www.myskin.ir



برداشتن هر نوع خال نیاز به
معاینه و سرایط استاندار را دارد.
برای برداشتن خال فقط به
پزشک متخصص مراجعه فرمایید.



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴

پرمویی یا هیرسوتیسم

WWW.MYSKIN.IR

۳۵

دراین مرحله قرار دارند. ۲- کاتاتژن یا مرحله برگشت که چند هفته طول می کشد و در آن رشد موها متوقف می شود اما ریزش نمی کنند. حدود ۴-۳٪ موهای بدن دراین مرحله قراردارند. ۳- تلوژن یا مرحله استراحت که حدود چند ماه طول کشیده و در انواع این مدت موها ریخته شده و موهای جدیدی شروع به تشکیل می کنند. همیشه حدود ۱۰ تا ۱۳٪ از موهای کل بدن دراین مرحله قرار دارند.

اثر هورمونهای بر رشد موها

هورمونهای مختلفی می توانند بر رشد موها اثر داشته باشند. مهمترین هورمونهایی که در کنترل رشد موها دخالت می کنند هورمونهای مردانه (آندروروژنها) هستند و مهمترین هورمون مردانه هم هورمون تستوسترون می باشد. آندروروژنها باعث می گردند که موهای ولوس به موهای ترمینال تبدیل شوند. (البته به غیرازنایی سر) در زمان بلوغ آندروروژنها که هم در پسرها و هم در دخترها (به مقدار کمتر) وجود دارند باعث بوجود آمدن موهایی در زیر بغل و در نایی عانه می شوند. هورمونهای زنانه (مانند استروژن) دارای اثراتی مخالف هورمونهای

تعريف : افزایش بیش از حد موهای خانمها را هیرسوتیسم می نامند . این افزایش مو به ویژه در صورت باعث مشکلات زیبایی زیادی برای خانمها می شود . البته مقدار موهایی که به هیرسوتیسم تعبیر می شود بیشتر در مقایسه فرد با افراد هم نژاد خود مشخص می گردد. مقدمه: موها از فولیکول یا پیاز مو که در پوست قرار دارد رشد می کنند . این فولیکولها به تعداد حدود ۵۰ میلیون در سرتاسر بدن وجود دارند که حدود ۱۰ میلیون آنها در سرقرار دارد و تنها در کف دست و پا فولیکول مویی وجود ندارد . تا زمانی که فولیکول مو وجود دارد موها به رشد خود ادامه می دهند .
انواع موها : ۱- موی ولوس : موهای کرکی و نازک و کوتاه و نرم که اکثراً کمرنگ هستند. مانند موی نایی صورت و پشت و سینه خانمها ۲- موی ترمینال : موهای بلند، زبر و ضخیم در سروزیر بغل و نایی عانه (هم در آقایان و هم در خانمها)

مراحل رشد مو: ۱- آناژن : این مرحله رابه مرحله رشد فعال هم تعبیر می کنند که چندین سال طول می کشد و حدود ۸۵٪ موهای بدن

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

پرمویی یا هیرسوتیسم

WWW.MYSKIN.IR

۳۶

توانند نسبت به حالت طبیعی تیره تر باشند مشخص می شود . این وضعیت در منطقه مدیترانه ای شایعتر بوده و می تواند بطور ارثی در خانواده ها وجود داشته باشد . هیرسوتیسم تقریباً همیشه بعلت افزایش اثر هورمونهای آندرودژن بر روی فولیکولهای مو ایجاد می شود . این افزایش اثر می تواند به علل زیر باشد : ۱- مصرف دارویی ۲- مشکلات تخمدانی ۳- مشکلات غدد فوق کلی ۴- هیرسوتیسم فامیلی

۱- مصرف دارویی : استفاده از هورمونهای مردانه و داروهای با اثر آندرودژنی مانند استروئیدهای آنابولیک که در بعضی از افراد مشغول به ورزش بدنسازی مصرف می گردند و استفاده از داروی دانازول که در بیماری آندومتریوز بکار می رود مثالهایی از مصرف دارویی آندرودژنها میباشد .
۲- مشکلات تخمدانی: تومورهای تخمدانی تولید کننده آندرودژن می تواند باعث پرمویی خانمهای گردد که سریع ایجاد می شود و می تواند همراه نشانه های دیگر مردانه مانند ریزش موهای سر و کلفتی صدا باشد . بیماری

مردانه می باشد . وقتی که یک موی ولوس به یک موی ترمینال تبدیل می شود ؛ حتی اگر آندرودژنها نیز دیگر وجود نداشته باشند ، آنها دوباره به موی ولوس تغییر نخواهند کرد . بنابراین هیرسوتیسم را باید با کم کردن تعداد موهای ترمینالی که بر اثر آندرودژنها ایجاد شده اند درمان نمود .

علل ایجاد پرمویی در خانمهای

تمام خانمهای دارای موهای ترمینال در بعضی از قسمتهای بدن مثل سر، زیر بغل و ناحیه عانه می باشند . وجود چند موی ترمینال در اطراف نوک پستانها و یا بالای رانها ممکن است طبیعی باشد . هیرسوتیسم یا افزایش موی خانمهای هنگامی ایجاد می شود که موهایی ضخیم (معمولاً با رنگ تیره) بر روی صورت ، سینه ، شکم ، بالای رانها و در قسمت بالای بازوها دیده شوند . اگر فقط بر روی ساعد و یا ساق پاهای مو وجود داشته باشد به آن هیرسوتیسم یا پرمویی گفته نمی شود .

هیرسوتیسم را باید از هیپرتريکوزیس جدا نمود . هیپرتريکوزیس با افزایش موهای ولوس که می راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو

پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

پرمویی یا هیرسوتیسم

WWW.MYSKIN.IR

۳۷

کاهش آنдрودرژنها توسط داروها پاسخ می دهد . این افراد کاملاً سالم بوده و تنها به علل زیبایی تحت درمان قرار می گیرند .

اقدامات پاراکلینیکی

اندازه گیری هورمونهای مختلفی چون تستوسترون ، ۱۷-هیدروکسی پروژسترون ، آنдрosten دیون ، پرولاتکن و LH و FSH و استفاده از سونوگرافی تخدمانها جزء اقدامات پاراکلینیکی لازمی است که در مورد بیماران مبتلا به هیرسوتیسم باید انجام گیرد تا به تشخیص علت بیماری کمک نماید و قطعاً تشخیص علت بیماری به انتخاب روش درمانی مناسب منجر خواهد شد .

درمان

برای درمان هیرسوتیسم درخانمهای باید علت آن شناسایی شده و در صورت امکان برطرف گردد . درمان به دو صورت دارویی و غیردارویی انجام می شود . درمان دارویی شامل استفاده از فرجهای ضد بارداری ، اسپیرونولاتون ، کورتیکواستروئیدها ، سیپروترون کامپاند ،

تخمدان پلی کیستیک نیز همراه با عدم تخمک گذاری مزمن ، چاقی و هیرسوتیسم می باشد .

در این بیماری افزایش هورمون هیپوفیزی LH و کاهش FSH باعث عدم تخمک گذاری شده و افزایش استروژنها و آندرودرژنها را سبب می شود .

-۳- مشکلات غدد فوق کلیوی : بیماریهای نظیر کوشینگ و هیپرپلازی غدد فوق کلیوی (به علت نقصان آنزیمی) می تواند موجب هیرسوتیسم گردد .

-۴- هیرسوتیسم فامیلی : بعضی از بیماران دچار هیرسوتیسم هیچ مشکلی در تخمک گذاری و قاعده‌گی خود نداشته ، میزان هورمونهای آنها طبیعی بوده و علتی برای هیرسوتیسم آنها پیدا نمی شود . این حالت در خانمهای منطقه خاورمیانه و اطراف مدیترانه بیشتر دیده می شود و بنظر می رسد در نژادهای خاصی شایع تر باشد . این نوع هیرسوتیسم را فامیلی و یا ایدیوپاتیک می نامیم . به نظر می رسد در این افراد حساسیت بیش از حد فولیکولهای مو به مقادیر طبیعی آندرودرژنها باعث پرمویی می گردد . البته حتی این نوع هیرسوتیسم نیز به کاهش آندرودرژنها

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

پرمویی یا هیرسو تیسم

WWW.MYSKIN.IR

۳۸

ویا ریش تراش برقی واستفاده از دیپلاستورهای به شکل کرم ویا محلول می باشد . معمولاً موها حدوداً چند روز پس از دیپلاسیون دوباره ظاهر می شوند اما پس از دیپلاسیون معمولاً چند هفته طول می کشد تا موها دوباره پدیدار شوند . دیپلاسیون شامل کندن موها با موچین ، استفاده از موم ، شوگرینگ (استفاده از مواد چسبناک) و بند انداختن می باشد . روش‌های دائمی شامل الکترولیز، لیزروفلش لامپ می باشد . درمورد مزایای لیزر نسبت به روش الکترولیز می توان به مواردی چون راحتی و سرعت استفاده ، درد ناچیز، عدم آسیب رسانی به ساختمانهای پوست و عدم ایجاد اسکار اشاره نمود . درین روش‌های دائمی از بین بردن موها لیزربا توجه به اینمی آن بهترین روش محسوب می شود . از معايب روش الکترولیز آن است که وقت زیادی برای انجام آن لازم است و فقط برای قسمتهای کوچکی از پوست می توان آن را بکاربرد زیرا در این روش موها را باید یکی یکی از بین برداشت . از معايب دیگر این روش می توان به درد در هنگام انجام و احتمال آسیب رساندن به پوست واچاد اسکار اشاره نمود .

پر
لک
ریز
و
بز

سیپروترون استات ، فیناستراید ، فلوتابامید ، کتوکونازول ، آنالوگهای GnRH و سایر داروها می باشد . درمان غیردارویی شامل استفاده از لیزر، الکترولیز، موم ، بندانداختن وغیره می باشد .

درمورد درمانهای خوراکی باید توجه داشت که معمولاً استفاده از داروها باید به مدت طولانی انجام شود تا تأثیر خود را بگذارد وبا توجه به عوارض این داروها حتماً باید تحت نظر متخصص پوست ویا متخصص غدد داخلی مصرف شوند .

درمورد درمانهای غیردارویی باید توجه داشت که درمان مناسب درمانی است که هزینه آن برای فرد مناسب باشد؛ درد کمتری ایجاد کند ، به پوست آسیبی نرساند؛ استفاده از آن راحت باشد و اثر آن مدت زیادی بماند . بطورکلی این روشها را می توان به دودسته موقتی و دائمی تقسیم نمود . روش‌های موقتی شامل دیپلاسیون (از بین بردن قسمتی از موکه در بالای پوست قرار دارد) و دیپلاسیون (از ریشه درآوردن مو) می باشد . دیپلاسیون شامل تراشیدن موها با تیغ

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

پرمویی یا هیرسو تیسم

WWW.MYSKIN.IR

۳۹

استفاده می شوند که درین دستگاهها از تکنولوژی لیزر استفاده نشده و هنوز در مورد اثربخشی آنها در حد لیزرها بحث زیادی وجود دارد و نیاز به زمان بیشتری است تا بتوان در مورد آنها قضاوت صحیح نمود اما می توان گفت که این دستگاهها در بهترین شرایط می توانند در حد لیزرها اقدام به ازیین بردن موهای زائد نمایند.

WWW.Myskin.ir



جهت کسب اطلاعات در مورد لیزر موها زائد و

اطلاعات مرتبط «راهنما ریز درمانی» که

توسط همین پایگاه تهیه شده است؛ را مطالعه

دستگاه لیزر با فرستادن یک دسته اشعه نورانی از طریق پوست به پیازمو (فولیکول) عمل خود را انجام می دهد . این اشعه نورانی توسط موجذب شده و به حرارت تبدیل می شود و این حرارت باعث نابودی فولیکول می گردد . لیزر در افراد با پوست روشن و موی تیره بسیار موثرتر است . هرچه موضع خیمتو تیره تر باشد اثر لیزر بهتر می باشد زیرا این موها ملانین یا همان رنگدانه اصلی پوست و مو را بفراوانی دارند و جذب لیزر نیز توسط ملانین می باشد . تعداد جلسات لیزر معمولاً ۵ تا ۸ جلسه بوده و مدت زمان انجام آن در هر جلسه بسته به وسعت محل انجام آن متفاوت است برای مثال انجام لیزر موها چانه تنها ۲ تا ۳ دقیقه طول می کشد ولیزرهای پیش تنها یک ساعت و نیم تا سه ساعت به طول می انجامد . علت آنکه لیزر درمانی موها زائد به تعداد جلسات زیادی نیاز دارد آن است که بیشترین اثر لیزر بر موها در مرحله آناژن می باشد و با توجه به اینکه همه موها در فاز آناژن نیستند لذا لازم است تا لیزر درمانی در چندین جلسه با فاصله زمانی حدود یک تا دو ماه انجام گیرد .

فلش لامپها و IPL نیز در درمان موها زائد

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۶۳۵۰۱

مولوسکوم کنتاژیوزوم

WWW.MYSKIN.IR

۴۰

تناسلی بروز کند واز طریق تماس جنسی نیز منتقل شود . در کودکان ضایعات به تعداد کم یا زیاد بیشتر در تنه و اندامها می تواند رخ دهد . بخصوص در کودکان دچار اگزماه آتوپیک ، مولوسکوم می تواند بسیار متشر و گستردگردد و گاهی در اطراف ضایعات مولوسکوم هاله ای از قرمزی و پوسته ریزی که از نشانه های اگزما هستند ؛ وجود دارد . انتقال بیماری به خود فرد و دیگران از طریق تماس مستقیم میسر است . ضایعات مولوسکوم معمولاً گروه گروه بروز کرده و خود بخود نیز پس از چند ماه بهبودی می یابند و اسکار نیز بجا نمی گذارند اما سیر کلی بیماری ممکن است حتی چند سال طول بکشد . چون این بیماری باعث بجا گذاشتن اسکار پس از بهبودی نمی شود روش های درمانی نیز باید بدون بجا گذاشتن اسکار باعث بهبودی شوند . در مواردی که نیاز به درمان احساس نمی شود می توان ضایعات را به حال خود گذاشت تا خود بخود خوب شوند . در موارد نیازمند درمان می توان از کرایوتراپی (انجماد درمانی) با نیتروژن مایع و یا کورتاژ ضایعات توسط وسیله ای بنام کورت استفاده نمود و یا می توان از راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو

بیماری مولوسکوم یک بیماری ویروسی است که بصورت ضایعات بر جسته کوچک و یا بزرگ در روی پوست بروز می کند . این ضایعات به رنگ پوست و یا سفید مرواریدی هستند . بر روی نوک ضایعات نقطه ای فرورفته و ناف مانند وجود دارد که از مشخصات ضایعات مولوسکوم است . ضایعات مولوسکوم گنبدهای و گرد بوده و در داخل آنها ماده ای ژله مانند و سفید وجود دارد که تماس این ماده با نقاط دیگر پوست باعث سرایت بیماری به دیگر نقاط بدن است . اندازه ضایعات از نوک سوزن تا به اندازه یک نخود می تواند متفاوت باشد . گاهی این ضایعات قرمز و ملتهب و دارای ظاهری چرکی می شوند که این حالت نشانه روبه بهبودی رفتگی بیماری بوده و نشانه عفونت نیست . در حقیقت در این حالت سیستم ایمنی بدن در حال ازبین بردن ضایعات می باشد که این موجب التهاب ضایعات مولوسکوم است . معمولاً این بیماری باعث خارش و ناراحتی برای بیمار نمی شود . سن شیوع بیماری در کودکی است اما در بزرگسالان نیز می تواند اکثر " در مناطق تحتانی شکم و رانها و مناطق راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۳۴۴۶

مولوسکوم کنتاژیوزوم

WWW.MYSKIN.IR

۴۱



www.myskin.ir

داروهایی نظیر پودوفیلین ، TCA ، 5FU ، محلولهای ید با غلظتهاي بالا و ترتیبیین بهره برد که هرکدام از اینها نحوه مصرف خاصی داشته که باید حتماً تحت نظر متخصص پوست استفاده شوند و گاهی حتی استفاده از برخی از این داروها باید درمطابق پزشک و توسط خود او انجام گیرد .

پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۶

زگیل

WWW.MYSKIN.IR

۴۲

تحریک سیستم ایمنی باعث می شوند ضایعاتی که تخریب نشده اند نیز توسط سیستم ایمنی شناسایی واژ بین برده شوند . انتقال زگیل از طریق تماس مستقیم می باشد و این انتقال در پوست مرطوب بهتر رخ می دهد . البته هر فردی در تماس با ویروس بیماری دچار آن نمی شود و تنها کسانی که نسبت به ویروس بیماری از ایمنی کمتری برخوردارند دچار بیماری زگیل می شوند . بخارط همین هم در کودکان بیماری زگیل شایعتر است زیرا آنان سیستم ایمنی اشان تکامل نیافته تراست .

نوع دیگر زگیل ، زگیل تحت است که در کودکان در پشت دست و ناحیه صورت شایعتر می باشد و گاهی به تعداد خیلی زیاد و چسبیده به هم بروز می کند . گاهی این نوع زگیل در خانمهای جوان نیز در صورت و پشت دست و ناحیه ساعد بروز می کند . این نوع زگیل سطح صافتری دارد و ضخامت آن خیلی زیاد نیست . رنگ آن به رنگ پوست و یا گاهی کمی صورتی رنگ است و مشخصه آن تعداد زیاد این نوع زگیل می باشد . زگیل دیگر نوع

بیماری زگیل بعلت یک نوع ویروس بنام ویروس پاپیلومای انسانی ایجاد می شود . دوره نهفته بیماری متفاوت و گاه خیلی طولانی است بطوری که گاهی از یکماه تا یکسال نیز طول می کشد . نوع شایع زگیل بنام **COMMON WART** همان نوعی است که بیشتر در دست کودکان و نوجوانان شایع است و به شکل ضایعات برجسته و باسطح زبر بر روی دست و کف دست دیده می شود . گاهی این زگیل ها در اطراف ناخن بروز می کند که در این موقع معمولاً " به درمان مقاوم هستند و در این زگیلها بعلت ترکهای ایجاد شده بر روی پوست احتمال ایجاد درد نیز وجود دارد . زگیلها می توانند حتی چند سال بر روی دست بمانند تا آنکه سیستم ایمنی بدن آنها را از بین ببرد . در پرسربچه ها زگیلها معمولاً زودتر بهبود می یابند . درمان این نوع زگیلها شامل استفاده از کراتولیتیکهای موضعی ، منجمد کردن با نیتروژن مایع ، لیزر و می باشد . که هیچکدام از این درمانها اثری بر ویروس بیماری نداشته و آن را از بین نمی برد و تنها ضایعات ایجاد شده توسط ویروس را تخریب می کند . اما همین درمانهای تخریبی یا

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۶۳۵۰۴۴۶

زگیل

WWW.MYSKIN.IR

۴۳

گویند . در افرادی که به استخراهای عمومی می‌روند این نوع زگیل شایعتر است که این بعلت رطوبت پوست و سهولت انتقال ویروس در این شرایط است . البته پوشیدن دمپایی‌های مشترک نیز در این میان بی تاثیر نیست . نوع دیگر زگیل نوع تناسلی است که شیوع آن در همه جای دنیا در حال افزایش است . این نوع زگیل در ناحیه تناسلی زنان و مردان رخ داده و با تماس جنسی منتقل می‌شود . ضایعات بشکل برجستگی‌های نرم و با اندازه‌های مختلف در نواحی تناسلی می‌باشد که رنگ آنها نیز از رنگ پوست تا قهوه‌ای تیره سیاه متغیر است که رنگ پوست فرد نیز تعیین کننده رنگ ضایعات می‌باشد . این ضایعات می‌توانند به هم چسبیده و حالت گل کلمی پیدا کنند و بعلت رطوبت ناحیه نیز انتقال به راحتی می‌توانند صورت بگیرد . به همین علت نیز مردان مبتلا "درهنجام آمیزش" باید از کاندوم استفاده کنند تا از ابتلای شریک جنسی آنان جلوگیری بعمل آید . چون با هر مقدار کشیدن سیگار ریسک ابتلا به زگیل تناسلی افزایش می‌یابد لذا لازم است که افراد سیگاری در معرض ابتلا

زگیل
درهنجام
آمیزش
مردان

پایه دارد که در این نوع، زگیل توسط پایه ای به پوست وصل شده که کمی باریکتر از خود زگیل است . این نوع زگیل بیشتر در صورت بخصوص درآقایان و در ناحیه ریش بروز می‌کند که می‌تواند با تراشیدن ناحیه ریش تعداد آن بیشتر شود . گاهی نیز این نوع زگیل در ناحیه سر بروز می‌کند . نوع دیگر زگیل نوع کف پایی است که این نوع زگیل در کف پا بشکل فرورفته یا همسطح با پوست همراه با زبری مخصوص زگیل بروز می‌کند . این نوع زگیل معمولاً" به درمانها مقاومت دارد و می‌تواند در هنجام راه رفت . باعث درد شود . افتراق این نوع زگیل از میخچه و پینه نیز در فشار دادن به آن است که با فشار از طرفین زگیل دچار درد می‌شود ولی در مورد میخچه فشار مستقیم باعث درد می‌گردد . البته نقطه‌های سیاه و ریز روی زگیلها نیز می‌توانند آنها را از میخچه و پینه افتراق دهد . زگیل کف پایی می‌تواند به تعداد خیلی زیاد و چسبیده به هم در نواحی وسیعی از کف پا بخصوص در پنجه پا و بین انگشتان بروز کند . که نوع چسبیده به هم آن را موzaïek هم می-

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱۳۵۶۴۴۶۰

زگیل

WWW.MYSKIN.IR

۴۴

به ترک سیگار نیز اقدام کنند.

درمان زگیل از درمانهای خیلی ساده مانند داروهای کراتولیتیک تا لیزردرمانی را شامل می شود که بسته به نوع زگیل و محل آن و تعداد ضایعات این درمانها انتخاب می شوند.

www.myskin.ir



راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۴

پسوریازیس

WWW.MYSKIN.IR

۴۵

پوسته های لایه لایه و نقره ای بیشتر در روی زانوها و آرنجها می باشد . البته محل بیماری می تواند درسر، تنہ ، کف دست و پا ، زیر بغلها ، کشاله ران و ناحیه تناسلی هم باشد . گاهی نیز بیماری پسوریازیس در تمام بدن بروز می کند که به آن اریترودرمی یا درماتیت اکسفولیاتیو هم می گویند . در موقعی که بیماری در چینهای بدن مانند کشاله ها وزیر بغلها رخ می دهد به آن نوع معکوس بیماری می گویند که در مردان سنین میانی و پیری بیشتر رخ می دهد . ضایعات پسوریازیس حدود کاملاً مشخص داشته و در صورت کشیدن کشیدن روی پوسته ها با یک آبسلانگ پوسته ها برداشته شده و منظره شبین خونی ایجاد می شود که خونریزی به شکل قطره قطره می باشد و از نشانه های بیماری پسوریازیس می باشد . ضایعات پوستی می تواند خارش داربوده و یا آنکه خارش نداشته باشد و به نظر می رسد خارش بیشتر با استرس بیمار در مورد بیماری خود ارتباط دارد . گاهی نیز درمانهای نادرست بیماری باعث خارش می باشد . نوعی از بیماری پسوریازیس هم وجود دارد که به آن نوع پوستولرمی گویند و با دانه

بیماری پسوریازیس یا داء الصدف بیماری التهابی مزمن پوست می باشد که علت دقیق آن هنوز مشخص نمی باشد اما دخالت عامل ژنتیک در بروز آن قطعی است . در بیماری پسوریازیس تکثیر سلولهای پوستی سریعتر انجام شده و همین امر موجب پوسته ریزی می باشد . اما علت اصلی این تکثیر سریعتر سلولی هنوز مشخص نمی باشد . تقریباً از هرسه نفری که دچار این بیماری هستند یک نفر از آنها دارای خویشاوندی است که او هم دچار این بیماری می باشد . برخی عوامل مانند داروهایی نظیر کلروکین ، داروهای بتا بلوكر و برخی داروهای ضد افسردگی و همین طور برخی بیماریهای عفونی نظیر گلودرد استرپتوكوکی ، صدمات و استرسها در شروع یا تشدید بیماری نقش دارند . سن بروز بیماری در هر سنی می تواند باشد اما اگر شروع بیماری در سنین کودکی باشد احتمال شدیدتر بودن بیماری بیشتر است . در مرد سابقه خانوادگی نیز در صورت وجود سابقه بیماری در افراد خانواده معمولاً بیماری شدید تر و طولانی تراست . ضایعات پوستی بیماری پسوریازیس به شکل برجستگی های نسبتاً وسیع قرمزرنگ همراه

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۶۳۴۴۶

پسوریازیس

WWW.MYSKIN.IR

۴۶

نیز مدت‌های طولانی بیماری بصورت رفت و برگشتی باقی می‌ماند. تغییرات ناخنی هم در بیماری پسوریازیس می‌تواند بروز کند که به شکل تغییرنگ، ضخیم شدن، جداگانه صفحه از بستر ناخن، ایجاد لکه‌های قرمزویا زرد بر روی صفحه ناخن و از همه شایعتر فرورفتگی‌های شبیه جای فرورفتن سوزن در روی صفحه ناخن می‌باشد. گاهی بیماری پسوریازیس همراه تورم والتهاب مفاصل می‌باشد که این حالت بیشتر در موارد شدید تر و طولانی تر پسوریازیس و بیشتر در مفاصل کوچک دست رخ داده و نیاز به بررسی و درمان توسط متخصص روماتولوژی دارد.



WWW.MYSKIN.IR

های کوچک چرکی تظاهر می‌کند که این دانه‌ها هم به یکدیگر وصل شده و مناطق وسیعی چرکی ایجاد می‌کند که این چرک بدون میکروب بوده و فقط به علت التهاب ایجاد شده است. این نوع بیماری خوشبختانه نادر بوده زیرا در این نوع پسوریازیس که بیشتر افراد بزرگسال را درگیر می‌کند احتمال خطر برای حیات فرد نیز وجود دارد. نوع دیگر پسوریازیس نوع قطره ای می‌باشد که بیشتر در کودکان و نوجوانان رخ داده و اغلب به دنبال یک عفونت استرپتوکوکی گلو ایجاد شده و با لکه‌های متعدد شبیه سکه و به رنگ صورتی در تنه خود رانشان می‌دهد. این علائم در عرض ۴ تا ۶ ماه از بین می‌رود و دوباره هم عود نمی‌کند اما در بیش از نیمی از موارد بعدها نوع دیگری از پسوریازیس در این افراد عود می‌کند. اما شایع‌ترین نوع پسوریازیس همان نوع پلاک می‌باشد که نوع معمول بیماری بوده و در آن ضایعات پوستی محل بر جستگی‌های استخوانی آرنج و زانو و قوزک پا وجود دارد. سیراً این نوع بیماری خیلی قابل پیش‌بینی نیست. گاه ممکن است بیماری به یکباره بمبود یافته و تاسال‌ها بروز نکند و گاه

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۴۴۶

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۴۷

توانند در میزبان خود باعث التهاب زیادی شوند که این بعلت پاسخ شدید سیستم ایمنی میزبان به قارچ است . بطورکلی هرچه محیط قارچ بیماری زا از محیط طبیعی زندگی قارچ دورتر باشد التهاب ایجاد شده نیز شدیدتر است بنابراین قارچهای خاک دوست بیش از حیوان دوست واینها بیش از انسان دوست ها باعث التهاب درپوست انسان می شوند .
کچلی سر

بیماری کچلی سر بیماری کودکان است که بیشتر در سنین دبستان رخ می دهد . این بیماری بعلت درماتوفیتاهای حیوان دوست و یا انسان دوست ایجاد می شود . کچلی سر می تواند به شکل التهابی و یا غیر التهابی رخ دهد . در نوع التهابی که بیشتر به علت قارچهای حیوان دوست رخ می دهد و در مناطق روستایی شایعتر است ضایعات شدیداً التهابی به شکل کیستهای چركی و گاه دردناک همراه با ترشح چرك و خون می باشد که پس از مدتی باعث ریختن موها در منطقه مبتلا می گردد و این ریزش مو به صورتی است که دیگر برگشت پذیر نبوده و برای همیشه باعث طاسی آن ناحیه

بیماریهای قارچی شایع پوست به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از بیماری تینئا و بیماری کاندیدیازیس . تینئا را کچلی ترجمه کرده اند که خیلی کلمه رسایی نیست زیرا کچلی بیشتر طاسی سر را به ذهن متبادلرمی سازد در صورتی که بیماری کچلی ، پوست دیگر نقاط مانند کشاله ران ، دست ، پا ، صورت و... را نیز درگیر می کند ولزوماً تنها به معنی از بین رفتن مو نیست . عامل ایجاد تینئا ها قارچی میکروسکوپی بنام درماتوفیت می باشد که سه خانواده بزرگ از این قارچ وجود دارد که عبارتند از تریکوفیتون ها ، میکروسپوروم ها و اپیدرموفیتون ها . براساس محل ایجاد بیماری ، تینئا ها پسوند می گیرند مثلاً کچلی سر را تینئا کاپیتیس می گویند که تینئا همان بیماری قارچی و کاپیتیس به معنی سر می باشد . درماتوفیتها براساس محل زندگی شان به انواع خاک دوست ، حیوان دوست و انسان دوست تقسیم می شوند که این به معنی آن است که هرگروه از این قارچها تمایل به زندگی در آن محیط بخصوص را دارند و در صورتی که در محیطی غیر از محیط خاص مورد علاقه خود رشد کنند می

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۳۵۰ ۶۴۴

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۴۸

آن به شکل تغییر رنگ گرد و همراه با پوسته ریزی و خشکی در حاشیه ضایعات می باشد . این ضایعات از اطراف بزرگ شده و در وسط بھبودی نشان می دهند که به این نوع ضایعات ، آنولر گفته می شود . تعداد این ها می تواند یک و یا چند عدد باشد و اندازه آنها نیز از کوچک تا خیلی بزرگ متفاوت است . این ضایعات معمولاً " خیلی خارش دارنیستند و تنها وجود ضایعات پوستی باعث مراجعت بیمار به پزشک می گردد . گاهی این نوع کچلی در باشگاههای ورزشی بخصوص باشگاههای کشتی شایع می شود که این بعلت تماس پوست به پوست ورزشکاران با هم است . درمان کچلی بدن نیز استفاده از داروهای موضعی ضد قارچ مانند کلوتریمازول و میکونازول است اما بهتر است از داروهای خوراکی ضد قارچ استفاده شود تا پاسخ بهتری بگیریم .

کچلی کشاله ران

این نوع بیماری قارچی در آقایان و در ناحیه کشاله ها رخ می دهد و در ورزشکاران شایعتر است . ضایعات به شکل تغییر رنگ با حدود

می شود به همین علت تشخیص این بیماری باید خیلی سریع داده شود و درمان شروع گردد تا از این عارضه بد شکل کننده همیشگی جلوگیری شود . طاسی بوجود آمده در اثر این بیماری معمولاً" کمتر از آن چیزی است که در ابتدای بیماری انتظار می رود و غالباً از بین ضایعات موہایی بصورت دسته دوباره رویش می کند که این بستگی به شروع سریع درمان دارد . درمان این نوع کچلی با داروی خوراکی گریزئوفولوین می باشد و طول درمان نیز حداقل ۶ هفته است . این دارو را باید همراه غذا مصرف نمود تا جذب آن بهتر شود و می توان دردو نوبت آن را مصرف نمود . پایان درمان را می توان بر اساس بھبودی ضایعات تعیین نمود و بهتر است که آزمایش قارچ شناسی پس از درمان نیز انجام گیرد تا از نبود عوامل قارچی در ضایعات نیز اطمینان حاصل شود .

کچلی بدن

این نوع کچلی قارچی در تن و واندامها رخ می دهد و می تواند بعلت قارچهای حیوان دوست و یا انسان دوست رخ دهد . ضایعات مشخصه

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۳۵۰ ۶۴۴

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۴۹

تاولهای بزرگ و کوچک در کف پاها بروز می کند که می تواند همراه خارش نیز باشد در این شرایط گاه بعلت کلفتی پوست کف پا تاولهای سالم بزرگی ایجاد می شود که سقف این تاولها سفت می باشد . کچلی پا را بیماری پای ورزشکاران نیز می گویند که این شیوع بیشتر درورزشکاران بعلت تعزیق واستفاده از کفشهای بسته لاستیکی می باشد که در مدت طولانی می تواند باعث تسهیل ورود قارچ به پوست می گردد . درمان این نوع کچلی نیز استفاده از داروهای ضد قارچ خوراکی بوده وجهت پیشگیری نیز باید استفاده از کفشهای باز و خشک نمودن پاها پس از شستشو را مورد توجه قرارداد .

کچلی پا

مشخص بصورت دو طرفه در کشاله هاست که می تواند بخصوص در مناطق گرم همراه خارش زیاد و حتی افزایش ضخامت پوست در اثر خارش گردد . این نوع کچلی از انواع شایع در تابستانها بوده و انتقال از طریق پوست به پوست ویا استفاده از لباسها ویا حolle فرد مبتلا می باشد و در استخراها می تواند این انتقال راحتتر انجام شود . در درمان این بیماری نیز از داروهای ضد قارچ خوراکی مانند گریزئوفولوین ، تربینافین ویا ایتراکونازول می توان استفاده نمود . البته گاه این بیماری با درمانهای موضعی نیز قابل درمان است اما درمان خوراکی بهتر و سریعتر باعث بهبودی می گردد .

کچلی پا

این نوع کچلی نیز در تابستانها و در کسانی که از استخراهای عمومی استفاده می کنند ویا مدت زمان زیادی از روز باید از کفشهای بسته استفاده کنند شایعتر است . ضایعات به چند شکل می تواند رخ دهد . گاهی این بیماری تنها با پوسته ریزی مرطوب بین انگشتان پاها بروز می کند و حتی بیمار نیز متوجه آن نمی شود . گاه به شکل

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۰۶۳۵۰۱

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۰

گاهی به شکل غیربیماریزا در دهان ، واژن ، کشاله ران و زیربغل و دیگر مناطق مرتبط پوست وجود دارد . شایعترین کاندیدیازیس همان بیماری برفک شیرخواران و نوزادان می باشد که نوزاد بعلت عبور از کانال زایمانی و بعلت وجود کاندیدا در آنجا دچار این بیماری می شود . برفک به شکل برجستگیهای سفید خاکستری در روی مخاط دهان وزبان بروز کرده که با کندن این ضایعات مناطق خونریزی دهنده ایجاد می شود . درمان این نوع برفک استفاده از داروهای ضد کاندیدا مانند نیستاتین می باشد که به صورت قطره نیز وجود دارد . برفک در در بزرگسالان معمولاً رخ نمی دهد مگر در موارد نقص ایمنی که باید علت این نقص ایمنی حتماً بررسی شود . گاهی کاندیدیازیس دهانی با کاهش پرزهای زبانی بروز می کند که به این نوع ، کاندیدیازیس آتروفیک می گوییم . گاهی نیز بصورت برجستگیهای سفت و چسبنده و شبیه سنگ در مخاط دهان رخ می دهد که به آن لوکوپلاکی کاندیدایی و یا کاندیدیازیس هیپرتروفیک می گوییم . البته علل لوکوپلاکی موارد دیگری نیز هست مانند سیفلیس ، سیگار ،

انواع دیگر کچلی کچلی دست ، کچلی ناخن ، کچلی صورت از انواع دیگر کچلی می باشد که در مورد کچلی صورت و دست تقریباً شبیه همان کچلی بدن بوده با این تفاوت که در صورت احتمال افزایش شدت بیماری با آفتاب وجود دارد و در مورد دست نیز شباهت این بیماری با بیماری اگزما می دست و یا همان حساسیت پوست دست می تواند در تشخیص ایجاد اشکال کند . کچلی ناخن نیز با تغییر رنگ ناخن و جدایی صفحه ناخن از بستر آن خود را نشان می دهد و با آزمایش مستقیم قارچ شناسی می توان به تشخیص این بیماری رسید و به درمان پرداخت که درمان این نوع کچلی نسبت به بقیه موارد طولانی تر است .

کاندیدیازیس

این بیماری توسط یک نوع قارچ مخمر بنام کاندیدا آلبیکانس ایجاد می شود . این قارچ

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱۳۵۶۴۴۶۰

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۱

تینئا ورسیکالر (کچلی رنگارنگ)

این بیماری بعلت یک نوع قارچ بی آزار پوست

رخ می دهد که در بعضی شرایط به نوع بیماریزا تبدیل شده وایجاد لکه های پوستی می کند.

نوع بیماریزای این قارچ را مالاسزیا فورفور می گویند. این بیماری درگردن، بازوها و ساعدها،

زیربغل ها و تنہ به شکل لکه های کوچک یا بزرگ، پررنگتر ویا کمرنگتر از پوست رخ می

دهد که ممکن است روی آنها پوسته ریزی ظریفی بصورت آردی نیز رخ دهد. گاهی این

لکه هاستح وسیعی از پوست تنہ را درگیر می کند به شکلی که نمی توان پوست سالم را از

پوست مبتلا افتراق داد. این لکه ها معمولاً خارش ندارند و با حمام رفتن رنگ آنها

کمتر شده و گاهی به سختی دیده می شود. اگر

پوست آفتاب خورده و برنzech باشد این لکه ها کمرنگتر از پوست بروز می کند و در صورتی که

پوست برنzech و آفتاب خورده نباشد، لکه ها پررنگتر از پوست ایجاد می شود. علت این

بیماری و تبدیل نوع غیر بیماریزای قارچ به نوع بیماریزا خیلی مشخص نیست اما عواملی می

تواند باعث تسهیل آن شود که عبارتند از

سلطان مخاط دهان، استفاده از ادویه جات و...

که باید احتمال آنها رانیز در نظر داشت.

کاندیدیازیس درپوست به شکل های مختلفی بروز می کند که یکی از شایعترین آنها

ایترتریگوی کاندیدایی است که بیشتر در کشاله ها، زیربغل ها، زیر وسط پستانها، باسن،

بین انگشتان دست می تواند رخ دهد. ضایعات

در این موارد به شکل قرمزی براق و همراه پوسته ریزی در حاشیه ضایعات و معمولاً

مرطوب و ترشح دار می باشد. در شیرخواران در ناحیه پوشک کاندیدیازیس می تواند باعث تشدید درماتیت پوشک گردد و تشخیص آن با

ضایعات اقماری قرمز رنگ در اطراف ضایعه اصلی می باشد. در این موارد معمولاً "قرع

شیار کشاله ران نیز دچار قرمزی والتهاب است که در درماتیت پوشک چنین چیزی وجود ندارد

و این ناحیه معمولاً مبتلا نیست. کاندیدیازیس بین انگشتان دست در زنان میانسال و مسن که

به مدت طولانی دستهایشان درآب و در حال شستشو هستند شایعتر است و در افراد دیابتیک

نیز می تواند با وفور بیشتری رخ دهد.

پوشک
پوشک
پوشک
پوشک
پوشک
پوشک

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

بیماریهای قارچی پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۲



رطوبت و تعریق پوست ، چاقی ، استفاده از قرصهای ضد بارداری ، حاملگی ، وراثت ، سوء تغذیه و.... اما گاهی هیچکدام از این زمینه ها نیز وجود ندارد . این بیماری (اگر بتوان نام آن را بیماری نهاد) را می توان با شامپوها و یا لوسيونهای ضد قارچ درمان نمود . اما معمولاً عود کننده بوده و ممکن است هرسال یکی دوبار فرد را مبتلا کند . این حالت در جوانان و افراد میانسال شایعتر از کودکان و افراد مسن می باشد . در کودکان این حالت می تواند کناره های صورت رانیز گرفتار کند و با لکه های کمرنگی که ایجاد می کند والدین را نگران سازد .

بیماریهای
قارچی
پوست

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۳۵۰۱

درماتیت سبورئیک

WWW.MYSKIN.IR

۵۳

درماتیت سبورئیک می تواند با یکسری از بیماریها مانند پارکینسون ، دیابت و ایدز تشدید یافته و یا همراه آنها ایجاد شود . یکسری از داروها مانند هالوپریدول نیز می تواند ضایعات پوستی شبیه به این بیماری را ایجاد نماید و یا گاهی واکنش به بعضی از فلزات مانند آرسنیک و طلا نیز می تواند شبیه به درماتیت سبورئیک شود .



علت این بیماری خیلی مشخص نبوده و کمی پیچیده می باشد اما ممکن است با قارچی ازنوع مخمرها بنام *pityrosporum ovale* ارتباط داشته باشد . البته این مخمر تنها در افراد مستعد به این بیماری باعث ایجاد و یا تشدید آن می شود .

درماتیت سبورئیک یک بیماری التهابی مزمن در سطح پوست می باشد که بیشتر در پوست سر، ابروها ، شیارهای بین دهان و بینی ، سینه ، زیر بغل ، ناف ، کشاله ران و ناحیه شکاف باسن رخ می دهد . در این بیماری پوسته ریزی چرب و وزرد نگ بر روی سطح قرمز پوست ایجاد می شود . خارش در این بیماری می تواند شدید باشد . شوره سر در حقیقت یک نوع خفیف همین بیماری درماتیت سبورئیک است . اگر درماتیت سبورئیک در سر ایجاد شود معمولاً از حاشیه موها فراتر رفته و در مناطق پیشانی و گوشها و پشت گوشها و گردن نیز منتشر می شود . در موارد شدید بیماری تمام پوست سر با پوسته قهوه ای چرك دلمه مانند بدبویی پوشیده می شود . در شیرخواران پوسته ریزی زرد یا قهوه ای رخ می دهد که یک نوع از همین بیماری بوده و به آن **cradle cap** می گویند .

قرمزی و پوسته ریزی اغلب در ابروها نیز دیده می شود . لبه پلکها نیز ممکن است گرفتار بوده و دچار قرمزی والتهاب باشند که به این حالت بلفاریت حاشیه ای می گویند (**blepharitis**)

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

درماتیت سبورئیک

WWW.MYSKIN.IR

۵۴

هفته‌ای یک یا دو بار نیز تجویز کرد. درمورد پلک می‌توان از سولفاستامید بصورت قطره و یا پماد چشمی و یا از تراسیکلین خوراکی استفاده نمود. از استروپیدهای موضعی دراین ناحیه باید با احتیاط استفاده نمود زیرا ممکن است درطولانی مدت درچشم باعث گلوکوم (آب سیاه) و یا کاتاراکت (آب مروارید) گردد. شستشوی روزانه با شامپو بچه روش خوبی جهت کاهش شدت درماتیت سبورئیک پلک می‌باشد. درموارد شدید می‌توان از آنتی بیوتیکهای خوراکی و یا داروهای ضدقارچ خوراکی نیز استفاده نمود که مصرف این داروها حتماً باید تحت نظر متخصص پوست و یا چشم باشد.

بطور خلاصه درماتیت سبورئیک بیماری مزمنی است که بیشتر در سنین جوانی و میانسالی بخصوص درآقایان رخ داده وجهت کنترل و درمان آن، فرد مبتلا باید تحت نظر متخصص پوست بوده تا با تجویز داروهایی متناسب با شدت بیماری، درماتیت سبورئیک تحت کنترل درآمده و فرد مبتلا بتواند مانند یک فرد سالم در جامعه حضور فعال داشته باشد.

پیشگیری از
درماتیت سبورئیک

درمورد درمان درماتیت سبورئیک باید گفت که این بیماری را به کمک استروپیدهای موضعی می‌توان کنترل نمود اما باید مراقب بود تا در طولانی مدت خود این داروها باعث قرمزی پوست بخصوص در صورت نشوند. از داروهای دیگری توان به ضدقارچها اشاره نمود که از آن جمله است کتوکونازول، کلوتریمازول و میکونازول که از این داروها نیز می‌توان بصورت موضعی در درمان بیماری درماتیت سبورئیک بهره برد. از جمله داروهای دیگر می‌توان به پیمکرولیموس و یا تاکرولیموس اشاره نمود که بتازگی در درمان این بیماری استفاده می‌شود. درموارد مقاوم به درمان نیز می‌توان از سولفاستامید سدیم استفاده نمود. برای درمان پوست سرمی توان از شامپوهای سلینیوم سولفاید، کتوکونازول، تار، زینک پیریتیون، فلوروسینولون و رزورسین استفاده کرد. این شامپوهای را می‌توان هفته ای ۲ یا ۳ بار استفاده نمود. خارش پوست سررا می‌توان با استروپیدهای موضعی و یا ضدقارچها کنترل نمود. برخی بیماران به استروپیدهای قوی تری نیازمندند که می‌توان این داروها را بصورت

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱۶۳۵۰۴۴۶

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۵

ضریب اولیه به ناحیه مبتلا مربوط می‌دانند و تا مدت‌ها به آن توجهی نمی‌کنند و مرتباً از درمانهای موضعی جهت این ضایعه پوستی استفاده می‌کنند که مسلمان نتیجه ای نیز دربرندارد. در برخی شغلها که فرد مجبور است مدت زمان زیادی را در زیر نور آفتاب کار کند این نوع سرطان بیشتر رخ می‌دهد که از جمله این مشاغل می‌توان به کشاورزی و ماهیگیری اشاره نمود. گاهی در افرادی که در کودکی بعلت بیماری قارچی سرتحت درمان رادیوتراپی قرار گرفته اند نیز در سنین کهولت تعداد زیادی از این نوع سرطان پوست رخ می‌دهد که معمولاً به شکل رنگدانه دار و نقطه نقطه می‌باشد. خوشبختانه این نوع **BCC** در مقایسه با انواع دیگر از تهاجم کمتری برخوردار است. جهت تشخیص قطعی این نوع سرطان می‌توان اقدام به بیوپسی یا نمونه برداری از پوست نمود که با فرستادن نمونه به آزمایشگاه آسیب شناسی و بررسی توسط پاتولوژیست تشخیص قطعی می‌گردد. اما در خیلی از موارد تشخیص بالینی توسط متخصص پوست کافی بوده و با همان تشخیص بالینی می‌توان اقدام به درمان نمود. البته گاهی

بطورکلی سرطان‌های پوست را می‌توان به سه نوع کلی تقسیم نمود : ۱- سرطان مربوط به سلولهای بازال که به آن **BCC** می‌گویند. ۲- سرطان مربوط به سلولهای اسکواموکه به آن **SCC** می‌گویند. ۳- سرطان مربوط به ملانوسیتها یا همان سلولهای رنگدانه ای پوست که به آن ملانوما می‌گویند.

کارسینوم بازال سل (**BCC**)

این نوع سرطان پوست شایع‌ترین بدخیمی انسان است. وبطور شایع‌تری در سنین میانی به بالا و در پوستهای سفیدی که در معرض آفتاب بیشتری قرار دارند رخ می‌دهد. محل شایع آن در نیمه بالایی صورت می‌باشد. شکل ظاهری این نوع سرطان یا به شکل یک زخم بدون بهبودی و یا به شکل شبیه خال سیاه همراه با خونریزی وزخمی شدن است. اندازه ضایعه به اندازه یک عدس و یا بزرگتر می‌باشد. ضایعه پوستی هیچ‌گونه درد و خارشی نداشته و تنها گاهی در اثر ضربات مختصر خونریزی می‌کند. خیلی از بیماران این نوع ضایعات را با یک

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۶۴۴۶۳۵۰۱

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۶

خارش می‌توان استفاده نمود. داروهای آنتی‌هیستامین خوراکی مانند هیدروکسی زین، ستیریزین، لوراتادین، سیپروهپتادین، داکسپین، سایمتیدین، رانیتیدین و داروهای مانع آزادسازی هیستامین مانند کوتوفن از جمله داروهای خوراکی هستند که در درمان کهیر استفاده می‌شوند و با کترول وضعیت بیمارمی‌توان به مقدار مناسب داروبهای هریبیمارپی برد. در موارد خیلی شدید وحد می‌توان از داروهای استروییدی تزریقی نیز استفاده نمود که هیدروکورتیزون کم عارضه ترین این نوع داروها می‌باشد. در مورد آنافیلاکسی یا شوک آرژیک درمان باید در مرآکزاوزثرانس انجام گیرد که در این موقع بهترین دارو اپی نفرین می‌باشد که در این مرآکز جهت درمان شوک استفاده می‌شود. درمان کهیر مزمن نیاز به صبر و حوصله زیادی از طرف پزشک و بیمار دارد تا بتوان دریک تعامل مثبت و سازنده به بهترین درمان دست یافت و با توجه به اینکه بیماری کهیر در نهایت خود بخود ببهبد یابنده می‌باشد لذا لازم است در صورتی که پس از بررسیهای آزمایشگاهی علتی برای کهیر پیدا نشد به بیمار اطمینان داد که

از بین داروهای موثر در ایجاد کهیر می‌توان به آسپیرین و داروهای دیگر ضد التهاب غیراستروییدی و انواع آنتی بیوتیکها از جمله پنی سیلین ها اشاره نمود. البته داروها به دوروش می‌توانند باعث کهیر شوند یکی از راه ایجاد واکنش آرژیک مانند آرژی به پنی سیلین و دیگری از طریق آزاد سازی مستقیم هیستامین که مدیاتور اصلی کهیر می‌باشد و آزادسازی این ماده از سلولها باعث ایجاد علائم کهیر می‌گردد. از جمله داروهایی که با این روش ایجاد کهیر می‌کنند می‌توان به کورار، پلی میکسین و مخدّرها اشاره نمود.

درمان

تنها راه قطعی در درمان کهیر، تشخیص و پیشگیری از تماس با علت محرکه ایجاد آن می‌باشد. از تماس با عوامل باعث شدت بیماری نیز باید پرهیزنmod. از جمله این عوامل می‌توان به داروهای ضد التهاب غیر استروییدی، غذاهای آماده، افزودنیهای خوراکی، گوجه فرنگی، توت فرنگی، آجیله و شکلات اشاره نمود. ازلو سیونهای ضد خارش مانند کالامین یا داروهای حاوی متول یا فنول جهت کاهش

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۷



درمان BCC معمولاً جراحی است و این درمان در غالب موارد با بهبودی ۹۰٪ به بالا همراه می باشد . درصورتی که به علی نتوان ازروش درمان جراحی استفاده نمود می توان راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو

جهت تعیین عمق ضایعه و یا تعیین نوع BCC نیز اقدام به بیوپسی می شود تا نوع درمان و پیش آگهی بیماری بهتر تعیین گردد . این نوع سرطان پوست فقط تهاجم موضعی داشته و می تواند به استخوان و غضروف زیر خود نیز تهاجم نماید اما متاستاز و دست اندازی به ارگانهای دور دست مانند کبد و کلیه و مغز و ... جزء خصوصیات این نوع سرطان نیست . اگر BCC در اطراف چشم رخ دهد خطرناکتر بوده و می تواند به چشم نیز تهاجم نماید لذا ضایعات اطراف چشم نیاز به درمان سریعتری دارد . در افراد گیرنده پیوند عضو که تحت درمان با داروهای ضعیف کننده سیستم ایمنی هستند گاهی این نوع سرطان در سنین پاییتیر و به تعداد زیاد می تواند رخ دهد . بنابراین افراد باید هرگونه ضایعه جدید پوستی را با دقت بررسی نمود و در صورت اثبات وجود این نوع سرطان به درمان اقدام نمود .

www.myskin.ir



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۸

می باشد . برخی از محققین از سیگار نیز بعنوان یک محرك ایجاد SCC پوست نام بردند . (البته سیگار درایجاد همین نوع سرطان دردهان یک عامل کاملاً شناخته شده است .) اکثراً SCC به شکل یک ضایعه زبرپوستی در مناطق صورت و یا پشت دستها شروع می شود . در صورت BCC خیلی شایعتر از SCC است اما در دست SCC شایعتر می باشد . ضایعات اولیه ممکن است سطحی ، سفت و یا یک پایه قرمز و برجسته باشد . در عرض چند ماه ضایعه بزرگتر شده و سفت تر گشته و زخمی می شود . زخم ابتدا سطحی و دارای دلمه است اما بتدريج عميق تر شده و حالت ثابت و غيرقابل حرکت به خود می گيرد . در لب پايین بعلت تحريك مداوم آفتاب و ایجاد التهاب لب بعلت آفتاب ، SCC می تواند بروی همین ضایعه که به آن کيليت آكتينيک می گويند اضافه گردد . کيليت آكتينيک بخصوص درکشاورزان شایع می باشد و ظاهر آن به صورت خشکی ، ترك خوردن و خشکی می باشد . زمانی که این حالت تبدیل به سرطان می شود یک ضایعه سفت و ضخیم بروی این حالت لب اضافه می

از رادیوتراپی ، ... کوتربالیزیو تراپی نیز استفاده کرد اما هیچکدام از این روشها به اندازه جراحی مطمئن و با عود کم نیستند . نوعی از سرطان BCC وجود دارد که به آن نوع شبیه مورفه می گویند و این نوع با عود بیشتری پس از درمان همراه است لذا این نوع سرطان را با روش خاصی بنام Moh جراحی می کنند که نوعی جراحی دقیقتر می باشد .

كارسينوم اسکواموسل (SCC)

این نوع سرطان پوست از لحاظ شیوع دومین سرطان شایع پوست پس از BCC می باشد . علت اکثر موارد این نوع سرطان در پوست اشعه مضرآفتاب (UV) می باشد و بزرگترین عامل خطر دربروز این نوع سرطان پوست، مواجهه طولانی مدت با آفتاب است که این شرایط در پوست صورت و گردن و پوست سروپشت دستها بیشتر ایجاد می شود . فاكتورهای خطر دیگر در ایجاد این نوع سرطان شامل زخم مزمن ، تايش اشعه ایکس به پوست ، درمان با اشعه ماوراء بنفش ، برخی بیماریها مانند لوپوس پوستی و لیکن پلان زخمی شونده

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۵۹

بطوری که گفته می‌شود تخم شپشی که از حدود ۱/۵ سانتیمتری سر بالاتر باشد نشانه آلوگی قبلی بوده که نیاز به درمان ندارد. یک هفته بعد از ایجاد تخمهای، لارو شپش از آنها خارج شده که در عرض یک هفته نیز این لاروها به شپش بالغ تبدیل می‌شوند. این چرخه ادامه یافته و آلوگی در انسان گسترده‌تر شده و به افراد دیگر نیز سرایت کرده و گاه اپیدمی بیماری بروز می‌کند.

کودکان مبتلا ممکن است از خارش سر شاکی باشند ولی گاهی این خارش خیلی آزاردهنده و مشخص نیست و وجود تخم شپش در سرباعث تشخیص بیماری می‌گردد. تخم شپش به شکل نقطه‌های سفیدی در طول موها می‌باشد که به سختی به مو چسبیده اند و به راحتی کنده نمی‌شوند و همین امر باعث افتراق آنها از شوره معمولی سراست. محل شایع این تخمهای در موهای پشت سر و بالای گوش می‌باشد. گاه تعداد این تخمهای آنقدر زیاد است که مانند سفیدی مو بروز می‌کند که این حالت خیلی نادر اتفاق افتاده و اکثرًا تخمهای به تعداد کمتری وجود دارند. گاهی خارش شدید سر

شود که این ضایعه نیز رخمی شده و شکل خاص SCC را به خود می‌گیرد. برخلاف BCC با متاستاز به گره‌های لنفاوی منطقه مبتلا همراه بوده و هنگام معاينه باید این گره‌ها را نیز بررسی نمود. در این بیماران احتمال متاستاز به نقاط دیگر غیرازپوست مانند ریه واستخوان و... نیز وجود دارد. اما بطورکلی متاستاز در مواردی بیشتر رخ می‌دهد که SCC بر روی رخ و اسکار آن ایجاد شده باشد و در مواردی که بعلت تابش آفتاب ایجاد شده متاستاز کمتر رخ می‌دهد. بیماران دچار این نوع سرطان پوست بیشتر دچار سرطانهای دیگر از جمله سرطان ریه، دهان، حلق، روده، کوچک و لوسی می‌شوند. درمان SCC جراحی بوده که در این عمل باید تومور به طور کامل همراه با حاشیه آن برداشته شود.

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۰۴۶۳۵۰۱

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۶۰

سوختگی همراه با تاول در کودکی دارند و دارای کک مک زیاد در پوست هستند و بطور کلی در مواجهه با آفتاب برنزه نشده و بیشتر دچار سوختگی می‌شوند بیشتر در معرض ابتلا به این بیماری هستند. تعداد زیاد خال، وجود خالهای بزرگ و وجود ضایعاتی که از لحاظ بالینی دیسپلاستیک (با شکل نامتقارن و بدشکل) هستند باعث افزایش ریسک ابتلا به ملانوما می‌باشد. فاکتورهای دیگری که در ایجاد ملانوما می‌توانند نقش داشته باشند عبارتند از درمان با PUVA (استفاده از اشعه ماورا بنفسن همراه داروهای حساس کننده پوست به نور)، استفاده از لامپهای سولاریومها که به قصد ایجاد برنزه شدن پوست استفاده می‌شوند، بیماری گزرو درما پیگمنتوزوم که یک بیماری ارشی همراه با حساسیت شدید به نور است، اسکارهای سوختگی و نقص ایمنی.



ملانوما

ملانوما بدخیم ترین سرطان پوست می‌باشد که از سلولهای ملانوسیت یا رنگدانه ساز پوست منشا می‌گیرد. بروز این نوع سرطان پوست در سالهای اخیر در حال افزایش است که این امر می‌تواند بعلت تماس بیشتر پوست با اشعه آفتاب باشد که بخصوص در سفید پوستان می‌تواند زمینه ساز ایجاد ملانوما گردد. افراد با پوست، مو و چشم روشن که سابقه آفتاب

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۴۴۶

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۶۱

که بشدت از آفتاب صدمه دیده شایعتر بوده و بالطبع در مناطق آفتابی بیشتر دیده می‌شود. سرعت گستردگی شدن ضایعه چنان آرام است که بیمار توجه چندانی به ضایعه نمی‌کند. اما پس از ۵ تا ۲۰ سال که از گسترش افقی ضایعه گذشت گسترش عمودی یعنی به عمق پوست رخ می‌دهد. در این زمان به این نوع ضایعه ملانومای لتیگومالیگنا نام می‌نهند. ایجاد بر جستگی سفت بر روی ضایعه مسطح نشانه همین گستردگی به عمق می‌باشد. البته ممکن است تیرگی و خونریزی هم در ضایعه ایجاد گردد.

www.myskin.ir



أنواع ملانوما : أنواع باليني مهمتر ملانوما شامل نوع لتيگو ماليگنا ، ملانوما با گسترش سطحي ، ملانوما ندولرو ملانوما لتيجينوس انتهايی است.

لتیگومالیگنا با یک ضایعه تغییررنگ یافته مسطح و بر نزه شروع می‌شود که از حاشیه آن گستردگی گردد و بتدریج در طی سالها بطوريکنوختی تیرگی آن افزایش می‌یابد . این نوع ملانوم در افراد مسن‌تر با پوستهایی که

مانومای با گسترش سطحی ، در بزرگسالان در همه سنین می‌تواند رخ دهد و برخلاف لتيگومالیگنا تمایلی به گرفتار کردن مناطق صدمه دیده توسط آفتاب ندارد . قسمتهای بالای پشت تنہ در هر دو جنس و ساق پا در زنان شایع‌ترین محلهای گرفتاری هستند . در این ضایعات رنگ‌های مختلفی همزمان ممکن است در ضایعه ایجاد شود که این رنگ‌ها شامل سیاه ، قهوه‌ای ، قرمز ، آبی و سفید است . این نوع سرطان می-

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۴۶۴۴۶۳۰۱

سرطان‌های پوست

WWW.MYSKIN.IR

۶۲

واین بعلت کم بودن انواع دیگر ملانوما در این نژاد بوده و بعلت زیاد بودن آن در این نژاد نسبت به نژاد سفید نیست . متوسط سن بیماران دچار این بیماری ۵۰ سال بوده و در هر دو جنس به یک نسبت رخ می دهد . شایعترین محل آن در سیاه‌پوستان پا می باشد . این ملانوما می تواند با پررنگی اطراف ناخنها خود را نشان دهد که این علامت یک علامت هشداردهنده می باشد . انگشت شست بیشتر از بقیه انگشت‌ها دچار این بیماری می شود . با گذشت زمان رنگ ضایعه بیشتر شده و متاستاز به گره‌های لنفاوی ناحیه نیز رخ می دهد و این بعلت تاخیر در تشخیص می باشد .

تواند بطور اولیه و یا در یک خال ایجاد شود . مناطق با تغییرات رنگ در خالها بخصوص اگراز حاشیه ضایعه فراتربرود نشانه احتمال ایجاد ملانوما در خالها می باشد . وقتی رشد عمودی آغاز گردد ؛ یک برجستگی کوچک یا بزرگ نیز به ضایعه اضافه می شود . با گسترش ضایعه خطوط مشخصه پوست ناحیه ازبین می رود . گاهی هنگام گسترش ضایعه درستی احتمال دارد که درستی دیگر بهبودی نسبی ضایعه رخ دهد . و همین وضعیت به ناهماهنگی‌های ضایعه می افزاید .

در ملانومای ندول راز ابتدا با یک تومور بر جسته و با رشد عمودی در عمق پوست مواجه هستیم . این نوع ملانوما حدوداً ۱۵٪ از همه ملانوماهای پوست را شامل می شود . در مردان دو برابر زنان رخ داده و بیشتر در مناطق در معرض آفتاب مانند سرو گردند و تنها ایجاد می شود .

مانومای لتیجینوس انتهایی شایعترین نوع ملانوما در سیاه‌پوستان و نژاد آسیایی می باشد .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۴۶۴۴۶۳۵۰۱

لیکن پلان

WWW.MYSKIN.IR

۷۳

که این خطوط را ویکهام استریا می نامند . اندازه ضایعات لیکن پلان معمولاً حدود نیم تا یک سانتیمتر است . محل این ضایعات بیشتر در ساعد ، ساق پا ، پشت دستها و ناحیه تناسلی آفایان می تواند باشد . خارش در بیماری لیکن پلان معمولاً شدید است و بیشتر بیماران جهت خاراندن ضایعات این بیماری آنها را می مالند و کمتر ممکن است که ضایعات را زخمی کنند و بنابراین ضایعات لیکن پلان معمولاً سالم می مانند و این ازلحاظ تشخیصی می تواند به پزشک کمک نماید که بهتر آنها را تشخیص دهد . سیراین بیماری خیلی می تواند متفاوت باشد . و این تفاوت بیشتر به محل درگیری بیماری و همین طور نوع کلینیکی آن بستگی دارد . دو سوم بیماران دچار ضایعات پوستی کمتر از یک سال دچار بیماری هستند و اکثر بیماران در سال دوم ابتلا به بیماری خود بخود بهبود می یابند . ضایعات مخاطی بیماری مزمن تربوده و در بیماران بهبود یافته نیز احتمال عود بیماری وجود دارد . ضایعات مخاطی بیماری به اشکال مختلف می تواند بروز کند ولی اشکال شایع آن بصورت خطوط سفید شبکه ای در مخاط طرفی

www.myskin.ir

بیماری لیکن پلان یکی از بیماریهای شایع پوست است که در آن ضایعات التهابی ، خارش دارد پوست رخ داده و می تواند مخاط و فولیکول مووناخن را نیز گاهی درگیرسازد . علت این بیماری به درستی شناخته نشده است . اما احتمال آن وجود دارد که این بیماری نیز یک بیماری با واسطه فعالیت سیستم ایمنی باشد . این بیماری در تمام جهان و در همه نژادها رخ می دهد . در حدود ۱ تا ۲٪ موقع این بیماری می تواند به شکل فامیلی نیز بروز کند . بیماری لیکن پلان در سنین میانسالی شایعتر بوده اما حتی کودکان را نیز می تواند درگیرسازد (۴٪ موارد) . ضایعات اولیه بیماری به شکل برجستگیهای پوستی به رنگ بنفش با سطح صاف می باشد که معمولاً اندازه آنها نیز کوچک است . رنگ ضایعات ابتدا قرمز بوده اما ضایعات پیش رفتہ تربنفش هستند . ضایعات طول کشیده تروضایعات در حال بهبودی اغلب قهوه ای پر رنگ نیز می توانند باشند . سطح ضایعات براق ، خشک همراه پوسته های چسبیده به ضایعه است . همین طور ممکن است در سطح ضایعات خطوطی سفید یا خاکستری دیده شود

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۴۴

لیکن پلان

WWW.MYSKIN.IR

۶۴

لیکن پلانوپیلازیس نامی است که به بیماری لیکن پلانی داده شده که باعث گرفتاری موها می شود . این حالت بیشتر در خانمها دیده شده که حدود ۲۰٪ آنها دارای ضایعات شبکه ای در دهان بوده و حدود ۳۰٪ آنها دارای ضایعات پوستی لیکن پلان هستند.



درمان : ضایعات محدود وبا تعداد کم را می توان با استروئیدهای موضعی و تزریقی داخل ضایعه درمان نمود . در بیمارانی که ضایعات گسترده تر دارند می توان از استروئید های خوراکی نیز استفاده کرد . وبهتر است این دارو با دوز کاهش یابنده تجویز شود تا باعث عوارضی نگردد . می توان هفته اول ۶۰ میلیگرم در روز ، هفته دوم ۴۰ میلیگرم در روز و هفته سوم نیز ۲۰ میلیگرم در روز از این دارو استفاده نمود و از این زمان هر هفته ۲/۵ میلیگرم از دارو کم نمود تا

دهان و همینطور زخمها دهانی می باشد . ضایعات شبکه ای هیچگونه ناراحتی برای بیمار ایجاد نمی کند اما کشف آنها در معاینه می تواند به تشخیص بیماری کمک کند . ضایعات دهانی زخمی شونده می تواند بسیار طول کشند و مزمن بوده و با ناراحتی بسیاری برای بیمار همراه باشد . گاهی ضایعات دهانی بدون ضایعات پوستی نیز رخ می دهد . ۷۵٪ بیماران دچار لیکن پلان دهانی زن هستند . تغییرات ناخنی در حدود ۱۰٪ موارد لیکن پلان رخ می دهد و این تغییرات در کودکان شایعتر است . شایعترین تغییرات ناخنی بیماری افزایش خطوط ناخنی و شکاف برداشتن صفحه ناخنی می باشد . گرفتاری موها در بیماری لیکن پلان بیشتر بصورت ریزش موی همراه با ایجاد پوست نازک شده می باشد که به این نوع ریزش مو، بدون در نظر گرفتن علت آن ، ریزش موی سیکاتریسیل می گویند . این نوع ریزش مو معمولاً برگشت پذیر نیست و باید در صورت وجود ضایعات پوستی همراه با ریزش مو در سر اقدام به درمان های قویتری نمود تا از صدمه به موها جلوگیری شود . لیکن

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزا بابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶

دکتر محسن فیاض

متخصص پوست، مو زیبایی و لیزر

دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران

W W W . M Y S K I N . I R

خدمات زیر توسط دکتر فیاض در کلینیک مجهر پوست، مو و زیبایی انجام می‌پذیرد.

- ✓ از بین بردن دائمی موهای زائد با استفاده از لیزر
- ✓ کاهش چین و چروکهای سطحی و عمیق پوستی با استفاده از دستگاه لیزر جدید **FRAXEL**
- ✓ تزریق بوتاکس جهت چین و چروکهای عمیق
- ✓ رفع جای جوشهای فرورفته و اسکارهای باقی مانده از محل بریدگی ها
- ✓ رفع ترکهای پوستی (استریا) حاصل از چاقی با استفاده از دستگاههای پیشرفته
- ✓ رفع چین و چروکهای دور لب، اطراف چشم با استفاده دستگاههای پیشرفته
- ✓ رفع افتادگی پوست
- ✓ جوان سازی پوست
- ✓ شفاف سازی پوست
- ✓ و ...

آیا از عوارض جبران ناپذیر استفاده از دستگاههای لیزر زیر نظر افراد غیر متخصص آگاهی دارد ؟

آدرس مطب : م پونک - خ میرزا بابایی - بلوار عدل - بالای داروخانه ایرانا - طبقه چهارم واحد ۲۷

شماره تلفن مطب : ۰۱۳۵۴۶۴۴

لیکن پلان

WWW.MYSKIN.IR

۶۵

بیماری دچار عود نشده و عوارض دارویی باعث ناراحتی بیمار نگردد . فتوترالپی نیز در بیماری لیکن پلان می تواند مفید باشد . از داروهای دیگری که در درمان بیماری لیکن پلان می توان بکاربرد می توان به تاکرولیموس موضعی، رتینوئیدهای خوراکی ، سیکلوسپورین ، هیدروکسی کلروکین و تالیدوماید اشاره نمود که باید مطمئناً تحت نظر متخصص پوست مصرف شوند .



www.myskin.ir

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۳۵۰۱

زوائد گوشتی

WWW.MYSKIN.IR

۶۶

پوستی همراه با ضایعات شبیه این زوائد گوشتی است . بروز زوائد گوشتی می تواند ارثی باشد اما مسری نیست و بروز آن دریک خانواده بیشتر با ارث درارتباط است .



درمان : درصورتی که این زوائد گوشتی فرد را آزارنده می توان آنها را به حال خود رها کرد و به درمان آنها نپرداخت . اما درصورتی که نیاز به درمان باشد می توان از روشهای تخریبی مانند کوتر، امواج رادیوفرکوئنسی ، بریدن ضایعات با تیغ جراحی و کرایوتراپی استفاده نمود . درهمه این روشها باید دقیق نمود که زوائد گوشتی را به اندازه ای ازین برد که نه تکه ای، از آن باقی بماند و نه آنکه ساعث احاد

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو

زوائد گوشتی ، ضایعاتی است که در افراد میانسال و مسن بخصوص درناحیه گردن ، زیر بغل، قسمتهای فوقانی تنہ و پلکها دیده می شود . این ضایعات بشكل یک برجستگی گوشتی و نرم با اندازه های مختلف به رنگ پوست و یا تیره ترمی باشد . از عوامل مستعد کننده به ایجاد این ضایعات می توان به چاقی ، حاملگی ، یائسگی ، بیماریهای هورمونی مانند آکرومگالی اشاره نمود اما گاهی بدون وجود هیچ کدام از این عوامل نیز این ضایعات بروز می کند . زوائد گوشتی هیچ گونه ناراحتی بجز از لحاظ زیبایی برای فرد ایجاد نمی کند تنها گاهی که این ضایعات بروی پایه خود پیچ می خورند و یا اینکه توسط خود فرد با نخ بسته می شوند می توانند سبب پرخونی ضایعه و التهاب و درد شوند . گاه این زوائد گوشتی به تعداد خیلی زیاد بخصوص در افراد چاق و درناحیه تنہ بروز می کند که باعث ناراحتی فرد می شود . بیشتر حجم این زوائد گوشتی را چربی تشکیل می دهد و با آنکه در برخی تحقیقات ویروسهایی در این ضایعات پیدا شده اما نمی توان این زوائد را زگیل محسوب نمود که یک بیماری ویروسی




پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

زوائد گوشتی

WWW.MYSKIN.IR

۶۷



www.myskin.ir

جوشگاه شود . گاهی زوائد گوشتی پایه پهنه داشته و بعلت خونریزی پس از برداشتن ضایعات ناچارمی شویم که ازبخیه زدن پوست استفاده نماییم . البته این مورد کمتر پیش می آید و معمولاً به بریدن ضایعات و سوزاند ن محل خونریزی می توان اکتفا نمود . درازبین بردن زوائد گوشتی لزومی به استفاده از لیزر نیست و به علت هزینه بیشتر استفاده از لیزر ، می توان با همان روش‌های ساده گفته شده به درمان این ضایعات پرداخت و باید به خاطرداشت که در هر درمانی بهتر است از روش‌های ساده تر شروع نمود و در صورت عدم اثربخشی به درمانهای پیچیده تراقدام نمود . در مورد استفاده از نخ و بستن پایه زوائد گوشتی با هدف ازبین بردن ضایعات بهتر است که این کارنجام نشود زیرا گاهی با بستن نخ خون ورودی به زائده گوشتی متوقف نشده اما جلوی خروج خون از ضایعه گرفته می شود و در نتیجه تجمع خون در ضایعه رخ داده و همین امر موجب دردناک شدن والتهاب ضایعه و گاهی حتی عفونی شدن آن می شود لذا توصیه می شود از این عمل خودداری شود .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۳۵۴۶۴۴۶

اریتم مولتی فرم

WWW.MYSKIN.IR

۶۸

نیز به همین علت که اشکال مختلف بالینی دارد اریتم مولتی فرم می باشد که به معنی قرمزی چندشکلی است . محل این ضایعات بیشتر در پشت دست و پا ، آرنج وزانوها ، ساق پا و ساعدها بوده و می توانند همراه خارش و سوزش پوست نیز باشند . فرم شدید این بیماری را استیون جانسون هم می گویند که در این حالت ضایعات دلمه ای شکل تیره لبها به همراه ضایعات زخمی شدید مخاط دهان و گاهی چشم نیز وجود دارد . این فرم بیماری گاه خطرناک بوده و لازم است که بیمار در بیمارستان بستری شده و درمانها بشکل وریدی جهت وی تجویز گردد . در استیون جانسون به سلامت کلیه های بیمار نیز باید بطور ویژه دقت نمود تا در اثر بیماری مشکلی برای این اعضای مهم بدن ایجاد نشود . خوشبختانه موارد شدید اریتم مولتی فرم نسبتاً نادر بوده و بیشتر با موارد خفیف این بیماری مواجه می شویم .

درمان اریتم مولتی فرم خفیف استفاده از درمانهای نگه دارنده مانند ضد خارشهای موضعی و خوراکی (در صورت خارش داشتن

اریتم مولتی فرم یک حالت واکنشی به یکسری از بیماریهای عفونی و یکسری از داروها می باشد که باعث اشکال بالینی مختلفی می شود . از جمله عوامل عفونی باعث این بیماری می توان به تب خال اشاره نمود که شایعترین عامل عفونی ایجاد کننده این بیماری می باشد . البته بیماریهای عفونی دیگری نیز مانند ارف (orf) و پنومونی های باعث مایکوپلاسما نیز می توانند باعث این بیماری شود . در میان داروها شایعترین عامل این بیماری سولفونامیدها می باشد که در میان آنها کوتريموكسازول بیشتر می تواند باعث این بیماری گردد . داروهای دیگر نظیر داروهای پیشگیری کننده از بارداری ، برخی دیگران از آنتی بیوتیکها نظیر تتراسیکلینها نیز می توانند باعث این بیماری گرددند . اریتم مولتی فرم با ضایعات پوستی به شکل هدف مشخص می شود و این ضایعات اصلی ترین و مشخص ترین ضایعات این بیماری می باشد . البته گاهی نیز ضایعات پوستی به اشکال مختلف دیگری مانند بر جستگیهای قرمزرنگ و یا حالت خونمردگی پوستی و یا دانه های آبدار کوچک و بزرگ پوستی نیز بروز می کند . نام این بیماری

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۳۵۰ ۶۴۴

اریتم مولتی فرم

WWW.MYSKIN.IR

۷۹



www.myskin.ir

ضایعات) می باشد و می توان به بیمار اطمینان داد که بیماری بطور خود بخود در عرض حدوداً ۴ هفته بهبود می یابد . اما در مورد اشکال شدید بیماری همانطور که گفته شد گاه نیاز است که بیمار در بیمارستان بستری گردد . در این موارد می توان از کورتونهای خوراکی نیز استفاده نمود تا التهاب ضایعات کمتر گردد اما باید توجه داشت که بعلت استعداد بیمار به ابتلا به بیماریهای عفونی حتماً وجود عفونتها مختلف رد شود و سپس به کورتون درمانی اقدام نمود زیرا کورتونها خود می توانند باعث تشدید بیماری عفونی گردند . اکثرآ در این بیماری پرستاری خوب مهمتر از نوع درمانها می باشد و مانند بیماران دچار سوختگی باید از این بیماران مراقبت بعمل آید .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۱۴۴۶

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۰

حدود ۹۰٪ کسانی که دچار عفونت HIV می‌شوند؛ ممکن است در دوره ای از سیر بیماری خود دچار مشکلات پوستی شوند. با پیشرفت درمانهای ضد ویروسی جهت این بیماری، بسیاری از مشکلات پوستی که قبلاً همراه با این بیماری دیده می‌شد درحال حاضر یا دیده نمی‌شود و یا اینکه بروز آنها کمتر شده و یا در صورت بروز هم راحت‌تر درمان می‌شوند. از جمله مشکلات پوستی در این عفونت عبارتند از عفونتهای ویروسی، باکتریایی و قارچی، بثورات مختلف پوستی، واکنشهای دارویی و تغییراتی که داروها در پوست می‌توانند ایجاد نمایند.

بیماریهای پوستی می‌تواند بیانگر کاهش سلولهای ایمنی فرد باشد زیرا معمولاً این مشکلات زمانی بروز می‌کنند که بیماری شدیدتر شده باشد. اما با توجه به شیوع بیماریهای پوستی، گاهی نیز ارتباطی بین بیماری پوستی و عفونت HIV ممکن است وجود نداشته باشد.

در ادامه مطلب به مشکلات پوستی که در بیماری

آیا من باید از لحاظ ابتلا به عفونت HIV آزمایش بدهم؟

* آیا با فردی که دچار عفونت HIV بوده یا مشکوک به ابتلا به این عفونت بوده تماس جنسی داشته‌اید؟

* آیا تاکنون مقاربت جنسی از راه مقعد داشته‌اید؟

* آیا از سوزن مشترک جهت تزریق استفاده کرده‌اید؟

* آیا به شریک جنسی خود به لحاظ استفاده از سوزن مشترک و یا اعمال جنسی پرخطر مشکوک هستید؟

* آیا تا به حال به بیماری آمیزشی مبتلا بوده‌اید؟

اگر پاسخ شما به هر کدام از این پرسشها مثبت است باید از لحاظ وجود این عفونت در بدن خود آزمایش دهید. این عفونت از طریق تماسهای معمولی مانند بغل کردن منتقل نمی‌شود. باز هم اگر سوالی در این مورد دارید با پزشک متخصص داخلی و یا عفونی مطرح نمایید.

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۱

گاهی ابتلای کف دستها همراه با پوسته ریزی نیز مشهود است . در داخل دهان و در منطقه تناسلی نیز می تواند زخم‌هایی بروز کند . به علت آنکه این بثورات بسیار شبیه دیگر بثورات ویروسی بوده و آزمایش HIV نیز در این زمان هنوز مثبت نشده است بنابراین معمولاً براساس این بیماری نمی توان پی به عفونت HIV برد .

عفونتهای پوستی همراه با بیماری HIV

همانطور که بتدریج اینمی بدن دربیماری HIV کاهش می یابد عفونتهای پوستی نیز می تواند بروز کند . البته این عفونتها در افراد سالم نیز می توانند بروز کند اما دربیماران HIV این عفونتها شدیدتر و نسبت به درمانهای معمول مقاومتر می باشد .

عفونتهای ویروسی

تعدادی از بیماریهای ویروسی هستند که می توانند دربیماری HIV بیشتر بروز کنند و این بیماریها می توانند باعث درگیری پوست و مخاطرات گرددند .

دربیماری HIV می توانند بروز کنند به تفصیل اشاره خواهد شد و تذکر این نکته نیز ضروری است که هر کدام از این مشکلات می تواند بدون وجود بیماری HIV نیز بروز نماید .

عفونت اولیه HIV

اکثر بیماران حدود ۲ تا ۴ هفته پس از اینکه با ویروس HIV تماس پیدا می کنند دچار بیماری ای می شوند که خیلی شبیه به بیماری منوکلئوز عفونی می باشد . از علائم این بیماری می توان به تب ، بزرگ شدن گره های لنفاوی ، گلودرد ، سردرد ، درد گردن ، دردهای عضلانی مفصلی و گاهی تهوع واستفراغ اشاره نمود . در این هنگام بثوراتی پوستی نیز بروز می کند که خیلی شبیه بقیه بیماریهای ویروسی مانند سرخک و سرخچه می باشد . این بثورات می توانند خارش دار بوده و یا اینکه بدون خارش باشند . این بثورات به شکل دانه ای و به رنگ قرمز بوده و معمولاً از نواحی بالای بدن مانند صورت و گردن شروع می شود .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۲

زونا (هرپس زوستر)

این بیماری در اثر فعالیت مجدد ویروس آبله مرغان درین ایجاد می شود . در این بیماری ابتدا درد و سوزش ناحیه مبتلا به مدت چند روز ایجاد شده و سپس ضایعات مخصوص این بیماری به شکل دانه های آبدار با حاشیه قرمز در یک طرف بدن ایجاد می شود . این ضایعات چند هفته طول کشیده و با دلمه بستن ضایعات ، رو به بهبود می رود . درد مربوط به بیماری می تواند مدت‌ها طول بکشد . در عفونت HIV بیماری زونا می تواند از اولین نشانه های سطح ایمنی پایین بیمار باشد . در این حالت بیماری زونا شدیدتر و طولانی تر بوده و احتمال گستردگی شدن ضایعات در تمام بدن نیز وجود دارد .

مولوسکوم کتتاژیوزوم

ضایعات بیماری مولوسکوم به شکل بر جستگیهایی رنگ پوست و ناف دار بوده که بیشتر در کودکان رخ داده اما در سنین جوانی نیز بعلت تماس جنسی می تواند در ناحیه تناسلی بروز کند . در عفونت HIV این ضایعات

تب خال (هرپس)

دو نوع ویروس تب خال وجود دارد که بنامهای تیپ یک و دو معروفند . تیپ یک معمولاً باعث ضایعاتی در صورت و اطراف لبها و دهان می شود که همان تب خال معمولی است و تیپ دو باعث زخمهای نواحی تناسلی می شود . اما باید بدانیم که تب خال در هرجایی از پوست بدن می تواند بروز کند و تنها محدود به نواحی تناسلی و اطراف دهان نمی باشد . معمولاً تب خال ها حدود یک یا دو هفته طول کشیده و خود بخود بهبود می یابند و در هنگام عود نیز معمولاً خفیفتر از بار اول بروز می باشند . در طول زمان تعداد عود تب خال بتدریج کمتر و فاصله زمانی بین بروز ضایعات طولانی تر می شود . اما در بیماری HIV تب خال زود به زود عود کرده ، زمان بیشتری طول می کشد تا بهبود یابد و شدیدتر و منتشرتر شده و گاهی نیز با زخمهای طولانی مدت در دنک خود را نشان می دهد .

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۳

در حالت عادی طولانی و مشکل بوده و در عفونت HIV این مشکلات دوچندان می شود . زگیلهای تناسلی باعث افزایش احتمال ایجاد سرطانهای دهانه رحم و مقعد ورکتوم است که این احتمال در عفونت HIV بیشترهم می گردد . زنان دچار زگیل تناسلی باید بطور مرتب آزمایش پاپ اسمیر از لحاظ وجود سرطان دهانه رحم داده و کسانی هم که دچار زگیل ناحیه مقعد هستند باید مرتباً از لحاظ وجود توده های این ناحیه بررسی شوند .

لکوپلاکی رشته ای دهانی

این بیماری در اثر یک نوع ویروسی از خانواده ویروسهای هرپس بنام اپشتین بارو ویروس ایجاد می شود . در این حالت زبان بخصوص در کناره های آن دچار ضایعات سفید و رشته ای می گردد . این بیماری معمولاً باعث هیچ گونه ناراحتی برای بیمار نمی شود اما می تواند با برفک دهانی اشتباه گردد .

بزرگتر ، گسترده تر و با تعداد بیشتر رخ می دهد . ویروس این بیماری در آبهای گرم می تواند زنده مانده و باعث انتشار بیماری بشود پس به بیماران توصیه می شود که در آبهای گرم واستخرهای آب گرم شنا نکرده واز وان حمام نیز استفاده نکنند .

زگیل

بیماری ویروسی که توسط ویروس پاپیلوما ایجاد می شود و به شکل برجستگی هایی با سطح خشن و یا نرم در روی دست و پا و صورت می تواند بروز کند . در نواحی تناسلی نیز این بیماری می تواند ظاهر شود که در کشورهای غربی حدود ۷۵٪ بالغینی که از لحاظ جنسی فعال هستند دچار عفونت با این ویروس می شوند . در عفونت HIV زگیلهای بزرگتر، متعدد تر و منتشر تر می باشند . زگیلهای تناسلی در بیماران دچار عفونت HIV بسیار وسیع شده و می تواند مناطق وسیعی از این ناحیه را در گیرسازد . این ضایعات ترشح دار و بدبو بوده و برای بیمار در دسرساز می باشد . درمان زگیل

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۶۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۴

. این عفونت قارچی می تواند درسر ، کشاله ران ، دستها و پاها بروز کند .

عفونتهاي باكتريالي پوستي

از جمله اين عفونتها می توان به زردزنم و فوليکوليت هاي چركى اشاره نمود که می تواند دربيماري ايدز بصورت وسيع و مقاوم به درمان بروز کرده و گاه مدتھا طول بکشد تا بهبود يابد .

سرطانهاي پوستي

سارکوم کاپوزي

سارکوم کاپوزي توموري متشكّل از رشد بيش از حد سلولهای رگ ساز می باشد . اين بيماري بيشتر در مردان همجنس باز رخ داده و نقش انتقال جنسی ويروس هرپس تیپ ۸ را نيز درايجاد اين بيماري مهم می دانند . ضایعات اين بيماري تا وقتی که خيلي بزرگ نشده اند ايجاد ناراحتی برای فرد نمی کند . با اينکه ضایعات اين بيماري در هرجايي از پوست و مخاط دهان ممکن است بروز کند اما محل شایع آن پا

عفونتهاي قارچي

برفك (کانديديازيس دهاني)

بيماران دچار عفونت HIV گاهی دچار عفونتهاي کانديدايی درنواحي دهان ، ناحيه تناسلي ونواحي چين دار بدن می شوند . دردهان اين بيماري به شكل پلاکهای سفيدی می باشد که درروي سطح زبان و درمخاط سطح داخلی گونه ها پراكنده شده اند . برفک دهاني می تواند باعث ايجاد احساس ناراحتی دردهان و گلو و مشكلات بلع و کم اشتھائي بعلت احساس ناراحتی بيشتر درهنگام غذا خوردن شود . همچنين عفونتهاي کانديدايی می توانند باعث ضایعات قرمز رنگ خارش دار درنواحي کشاله ران و زيرسينه (درزنان) شوند که اين عفونتها می تواند به قسمتهای اطراف نيز گسترده شود .

تینشا

عفونتهاي قارچي به علت درماتوفيتها می تواند دربيماران دچار عفونت HIV گسترده تر گردد .

راهنماي بيمارهای شایع پوست و مو



پايگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زيبايي دکتر محسن فياض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ ميرزابابايني بلوار عدل بالاي داروخانه ايرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۳۵۰۶۴۴۶

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۵

سلولهای بازال پوست) نیز در افراد مبتلا به ایدز بیشتر رخ می دهد . افراد مبتلا باید یاد بگیرند که پوست خود را هر از چند گاهی خود معاينه نموده و در صورت بروز ضایعات جدید پوستی و یا ایجاد تغییراتی در حالهای قبلی خود به پزشک معالج خود مراجعه نمایند . چون تابش اشعه آفتاب هم باعث افزایش ریسک این نوع سرطانها شده وهم اینکه خود اشعه ماوراء بنفس این وجود در اشعه آفتاب باعث کاهش سطح ایمنی فرد می شود لذا افراد مبتلا باید روشهای مراقبت پوست از آفتاب را به طور کامل رعایت نمایند . سرطان لمفوم (سرطان سولهای ایمنی) هم در مبتلایان به ایدز بیشتر رخ داده که می تواند به شکل توده های پوستی نیز بروز کند .

بیماریهای پوستی دیگر

خارش و خشکی پوست

این حالت یک ناراحتی شایع می باشد که می ویا استفاده از داروهای HIV تواند با ابتلای به لازم برای این بیماری تشدید شود . عدم استفاده

و ساق پا می باشد . این بیماری می تواند ارگانهای داخلی مانند روده ها و ریه را نیز درگیر سازد . رنگ این ضایعات از صورتی تا قرمز تیره وار غوانی می تواند متفاوت باشد و می تواند تخت بوده و یا برجسته باشد . اکثرًا این ضایعات بعنوان حشره گزیدگی و یا کبودشدن پوست در اثر ضربه و یا ضایعات مادرزادی تلقی می شوند . اندازه ضایعات سارکوم کاپوزی نیز خیلی می تواند متفاوت باشد . درمان این بیماری می تواند شامل کرمهای موضعی ترتینوئین ، جراحی ، منجمد کردن ، اشعه درمانی و یا تزریق های مکرر ایترافرون باشد . تعداد واندازه ضایعات سارکوم کاپوزی می تواند بیانگر میزان اختلال ایمنی فرد مبتلا بوده و با درمانهای ضد ویروسی ایدز ، از پیشرفت این ضایعات جلوگیری شده و یا حتی روبه بهبودی می روند .

سرطانهای دیگر پوستی

سرطانهایی نظیر ملانوم ، SCC (سرطان سلولهای سنگفرشی پوست) ، BCC (سرطان

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱۳۵۴۶۴۴۶

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۶

استروپیدهایی نظیر هیدرولورتیزون نیز می توان در این بیماری استفاده نمود .

پسوریازیس

در این بیماری قسمتهایی از پوست دچار قرمزی و پوسته هایی ضخیم و نقره ای می شود . این ضایعات بیشتر در زانوها و آرنجها ، کشاله ران ، پشت کمر و گاهی سرو گوشها رخ داده و این بیماری نیز می تواند در بیماران مبتلا به HIV شدیدتر گردد .

کهیر

یکی از مشکلات پوستی که می تواند بیماران مبتلا به HIV را آزار دهد همین بیماری کهیر می باشد که به شکل برجستگیهایی قرمز رنگ و یا مناطق گسترده صورتی رنگ همراه با خارش شدید است . این ضایعات معمولاً چند ساعت بیشتر دوام نداشته اما مرتباً ممکن است بروز کند . این ضایعات خوبی خوبی می دهند .

از آب داغ جهت شستشو در حمام ، استفاده از روغنهای قابل استفاده در روان و شوینده هایی که خیلی باعث خشکی پوست نمی شوند و همچنین استفاده از نرم کننده های بدن می تواند در این حالت مفید واقع شود . اما در صورتی که این تمهدات موثر واقع نشد باید فرد به پزشک متخصص پوست مراجعه نماید تا با استفاده از دارو این خارش کاهش یافته و یا اینکه تحت بررسی قرار گیرد تا خارش وی علت دیگری نداشته باشد .

درماتیت سبورئیک

درماتیت سبورئیک نیز در بیماران مبتلا به HIV شایع می باشد . در این بیماری پوست نواحی سر، پیشانی، ابروها، بینی و گوش دچار پوسته ریزی و قرمزی می شود . البته گاهی نیز ممکن است این حالت در زیر بغلها و کشاله ران نیز رخ دهد . نقش قارچها در این بیماری ثابت شده و به همین دلیل نیز در درمان آن از ضد قارچها به شکل شامپو، لوسيون و یا حتی در مواد شدید به شکل خوراکی استفاده می شود . از

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۷

به شکل جوشهای کوچک متعدد در سر و صورت و تن و رانها و باسن بروز می‌کند. این ضایعات می‌توانند شدیداً خارش دار باشند. درمان با استریویدهای موضعی به همراه آنتی‌هیستامینهای خوراکی می‌تواند در کاهش این خارش موثر باشد. یک دوره درمان با اشعه ماوراء بنسن نیز جهت بهبودی این ضایعات می‌تواند بسیار موثر باشد که در این موارد می‌توان از اشعه narrow band UVB و یا استفاده نمود.

بشرات دارویی

بشرات دارویی در بیمارانی که با HIV زندگی می‌کنند صد برابر بیشتر از افراد عادی است و واکنشهای دارویی شایع‌ترین دلیل تغییر داروهای ضد ویروسی این بیماران می‌باشد. اکثر این بشرات دارویی در چند هفته اول شروع درمان با یک داروی جدید رخ می‌دهند. در گذشته علت اصلی بشرات دارویی در این بیماران سولفونامیدها و دیگر آنتی‌بیوتیکها بود اما در حال حاضر داروهای ضد ویروسی باعث ایجاد بیشترین واکنشهای دارویی در این افراد

تشدید واکنش به حشره گزیدگی

این واکنش تشدید یافته به حشره گزیدگی در کودکان و بزرگسالان مبتلا به HIV بطور شایعی رخ می‌دهد. ضایعات به شکل برجستگی‌هایی بزرگ، قرمز و خارش دار بوده که پس از حشره گزیدگی بصورت گروه گروه ایجاد شده و مدت‌ها باقی می‌ماند. در محل گزیدگی‌ها می‌تواند تاولهایی نیز بروز نماید. گزشها جدید می‌تواند گزشها قبلی را نیز فعال و خارش آنها را تشدید نماید. خاراندن های مکرر پوست می‌تواند باعث عفونت پوستی شده و حتی باعث ایجاد جوشگاه یا اسکار نیز می‌تواند بشود. داروهای موضعی استریویدی، آنتی‌هیستامینهای خوراکی، آنتی‌بیوتیکها (در موارد عفونت پوستی) (و پیشگیری از حشره گزیدگی می‌تواند در این حالت مفید واقع گردد.

فولیکولیت (اوزینوفیلیک)

ضایعات فولیکولیت اوزینوفیلیک شبیه بیماری آکنه و یا حشره گزیدگی می‌باشد. این ضایعات

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۸

متفاوت باشد . درصورتی که بیمار در چند هفته اول شروع استفاده از دارویی چهار چنین حالاتی شد باید سریعاً با پزشک خود موضوع را درمیان بگذارد تا به رفع مشکل اقدام نماید . درمورد برخی از راشهای دارویی خفیف که با تب و بروز ضایعات دهانی و چشمی همراه نیستند می توان اقدام به قطع دارو نکرد تا این واکنش خود بخود برطرف گردد . اما در مورد واکنشهای شدید دارویی که برای جان بیمار خطرناک است باید سریعاً به قطع دارو اقدام نمود . کرمهای استروییدی ، حمام خنک و استفاده از آنتی هیستامینهای خوراکی می تواند درموارد خفیف درکاهش خارش بیمار موثر باشد .

لیپو دیستروفی

خیلی از بیمارانی که درحال مصرف داروهای می باشند متوجه می HIV ضد ویروسی جهت شوند که توزیع چربی بدن آن تغییر کرده است . مردان بیشتر چربی از دست می دهن و وزنان اکثراً چربی زیاد می کنند . چربی درنواحی شکم ، سینه و گردن تجمع می کند . همزمان ممکن

می شوند . گاهی بعلت شروع همزمان چندین دارو تشخیص داروی ایجاد کننده واکنش دارویی مشکل می باشد اما بطور کلی داروهایی Efavirenz Nevirapine amprenavir delavirdine باعث بیشترین واکنشهای دارویی می شوند . راش دارویی (بثورات دارویی) می تواند به تنها ی یا همراه با دیگر واکنشهای آلرژیک ارگانهای دیگر بدن بروز کند . واکنشهای دارویی مهمتر معمولاً همراه با بروز یک یا چند تا از علائم زیر می باشد : تب ، خستگی ، گلودرد ، کاهش اشتها ، بزرگ شدن غدد لمفاوی ، سرگیجه یا احساس سالم نبودن . خصوصیات دیگر راش دارویی که بیانگر مهم بودن واکنش دارویی و حتی خطر مرگ برای بیمار می باشد شامل گرفتاری دهانی و چشمی ، حساس بودن پوست بخصوص اگر همراه با بروز تاولهایی درپوست باشد یا تورم صورت و گردن است . این نوع راشهای دارویی از نوع خفیف که به شکل ضایعات کوچک و قرمز می باشد تا قرمزی تمام بدن و تاولهای پوستی متعدد وریزش وسیع پوست می تواند

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

تظاهرات عفونت HIV در پوست

WWW.MYSKIN.IR

۷۹

در حال افزایش است و این مشکلات به یکی از گرفتاریهای رایج تبدیل شده است.

ممکن است که چربی طبیعی نواحی بازوها، رانها و صورت ازین برود. وریدهای نواحی اندامهای فوفانی و تحتانی بعلت کاهش حجم چربی در این نواحی بطور واضح نمایان می‌شوند. در ناحیه صورت ازین رفتگی چربی نواحی گونه‌ها باعث بدمنظره شدن چهره می‌گردد.

www.myskin.ir

تغییرات ناخنی و ریزش مو

داروی ضد ویروسی بنام Indinavir باعث درد، قرمزی و تورم اطراف ناخن‌های دست و پا می‌شود. این دارو و بسیاری از داروهای ضد ویروسی دیگر که در این بیماری استفاده می‌گردد باعث ریزش مو نیز می‌شوند.

خلاصه

- اکثر مشکلات پوستی بیماران مبتلا به HIV در افراد عادی نیز رخ می‌دهد.
- تغییرات پوستی در حداقل ۹۰٪ بیماران مبتلا ایجاد می‌شود.
- در حال حاضراهمیت راشهای دارویی و تغییرات پوستی ایجاد شده توسط داروها

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۳۵۰۴۴۶

پیتیریازیس روزه آ

WWW.MYSKIN.IR

۸۰

ضایعات ثانویه نیز زیاد می باشد . انتشار این ضایعات بیشتر در تن و ریشه اندامها (بازو و شانه و بالای رانها و کمر) بوده و معمولاً در محاذات خطوط پوستی ناحیه مذبور بروز می کنند بطوری که در پشت کمر منظره ای بنام منظره درخت کریسمس ایجاد می کند . خارش این ضایعات نیز یا کم بوده و یا اصلاً خارش ندارند . پوسته ریزی مختصراً نیز گاهی در وسط این ضایعات قرمز رنگ بروز می -کند . در دوهفته اول بروز این ضایعات ، هرچند روز یکبار تعدادی از ضایعات جدید بروز کرده اما بتدریج بروز ضایعات جدید متوقف شده و پس از چند هفته استقرار بثورات پوستی ، بیماری خود بخود برطرف شده و خوشبختانه آثاری نیز برروی پوست بجا نمی گذارد . البته در موارد نادر ممکن است بیماری بطور مزمن تا مدتی باقی بماند که در این موارد بهتر است با انجام بیوپسی از صحت تشخیص مطمئن شد .

بیماری پیتیریازیس روزه آ ، خطر سرایت نداشته اما گاهی در موارد استثنائی در یک خانواده دو نفر در یک زمان دچار این بیماری شده اند .
بعلت آنکه این بیماری جزء بیماریهای

علت این بیماری پوستی هنوز نیز بدرستی معلوم نمی باشد اما احتمال ویروسی بودن این بیماری بیش از دیگر احتمالات مطرح است . این بیماری پوستی بیشتر در سنین جوانی و اغلب در فصول خنک سال بروز نموده و در زنان نیز کمی بیشتر از مردان رخ می -دهد . شروع بیماری معمولاً با بروز یک ضایعه گرد قرمز یا صورتی رنگ در تن و یا اندامها بوده که این ضایعه حلقوی گشته بطوری که در وسط آن التهاب و قرمزی کمتری نسبت به حاشیه ضایعه وجود دارد . گاهی در وسط ضایعه پوسته ریزی یقه مانندی نیز مشاهده می شود . به این ضایعه اولیه ضایعه پیشکراول هم می گویند زیرا مقدمه بروز ضایعات منتشر بعدی می -باشد . این ضایعه اولیه معمولاً خارش زیادی نداشته و گاهی حتی قبل از بروز ضایعات منتشر بعدی خود بخود بهبود می یابد . گاهی تعداد این ضایعه نیز می تواند چند عدد باشد . پس از چند روز تا چند هفته که از بروز این ضایعه گذشت ممکن است ضایعات منتشری بروز کند که شکل آنها نیز شبیه ضایعه پیشکراول بوده با این تفاوت که کوچکتر از آن است و تعداد این

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۱ ۴۴۶۳۵۰۱

پیتیریازیس روزه‌آ

WWW.MYSKIN.IR

۸۱

و با خیلی از بیماریهای دیگر پوستی اشتباه گردد . در موارد کلاسیک نیز بروز ضایعه پیشکراول می تواند شبیه ضایعات درماتوفیت بدن باشد که در موارد مشکوک باید از آزمایش اسمیر مستقیم قارچ شناسی نیز استفاده نمود . ضایعات ثانویه نیز گاهی با سیفیلیس مرحله دوم می تواند اشتباه شود که در موارد مشکوک می توان از تستهای مربوط به بیماری سیفیلیس جهت اطمینان تشخیص استفاده نمود . در موارد آتیپیک بیماری ممکن است ضایعه پیش کراول بروز نموده اما ضایعات ثانویه بروز نکند و یا ممکن است بر عکس این حالت نیز اتفاق بیفتد یعنی ضایعات ثانویه بدون بروز ضایعه پیشکراول رخ دهند . یا ممکن است نحوه انتشار ضایعات ثانویه بر عکس آنچه که گفته شد باشد یعنی بیشتر در انتهای اندامها بروز کند و یا اینکه شکل این ضایعات با آنچه گفته شد تفاوت داشته باشد . به هر حال با توجه به مطالب گفته شده معلوم می گردد که موارد آتیپیک بیماری می تواند با خیلی از

خودبخود خوب شونده است نیاز به درمان زیادی نداشته و تنها می توان با استفاده از نرم کننده ها از خشکی پوست در هنگام بروز بیماری کاست . البته گاهی نیز لازم است که از داروهای استروییدی موضعی جهت کاهش خارش والتهاب پوستی استفاده نمود . در هنگام بروز این بیماری بهتر است از شستشوی زیاد پوست خودداری نمود زیرا با خشک شدن بیش از حد پوست در اثر استحمام مکرر ممکن است خارش بیماری نیز بیشتر شود . صابونهای مورد استفاده در هنگام بروز این بیماری نیز باید از انواعی انتخاب گردد که باعث خشکی بیش از حد پوست نشوند .

بیماری پیتیریازیس روزه آ همیشه به این صورت که گفتیم بروز نمی کند و شرحی که داده شد در مورد نوع کلاسیک این بیماری صادق است اما انواع آتیپیک و غیرکلاسیک این بیماری نیز گاهی دیده می شود که می تواند از لحاظ تشخیصی مشکل ساز شده

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir



آدرس مطب: تهران-م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۹۰۵۶۴۴۶۳۵۰۱

پیتیریازیس روزه آ

WWW.MYSKIN.IR

۸۲

WWW.MYSKIN.IR



بیماریهای پوستی مانند اگزماها ، بیماریهای قارچی ، لیکن پلان ، پسوریازیس قطره ای ، اریتم مولتی فرم ، سیفلیس و... اشتباه شود که بهتر است در این موارد دقت بیشتری گردد .

www.myskin.ir

راهنمای بیمارهای شایع پوست و مو



پایگاه اطلاع رسانی پوست، مو و زیبایی دکتر محسن فیاض www.myskin.ir

آدرس مطب: تهران- م پونک خ میرزابابایی بلوار عدل بالای داروخانه ایرانا طبقه چهارم واحد ۲۷ تلفن: ۰۱۶۴۴۳۵۰۱