

# آخری تین منٹ

کائنات کے حتیٰ انجام پر علمی قیاس آرائیاں

## THE LAST THREE MINUTES

Conjectures About The Ultimate Fate of The Universe

مصنف

پال ڈیویس

Paul Davies

ترجمہ

ارشد رازی

نظر ثانی و برقی اشاعت

محمد علی مکی

[makkiabufaris@aol.com](mailto:makkiabufaris@aol.com)

# کتابخانہ

2	مصنف کا تعارف	
3	دیباچہ	
7	قيامت	باب اول
13	مرتی ہوئی کائنات	باب دوم
23	پہلے تین منٹ	باب سوم
39	ستاروں کا انجمام	باب چہارم
50	آغازِ شب	باب پنجم
65	کائنات کا وزن	باب ششم
77	ابدیت ایک طویل وقہ ہے	باب ہفتم
91	آہستہ خرام زندگی	باب ہشتم
103	تیز خرام زندگی	باب نهم
110	اچانک موت اور نیا جنم	باب دهم
122	ان گنت دنیاگیں	گیارہواں باب

## مصنف کا تعارف

پال ڈیویس بروٹانوی بین الاقوامی شهرت یافتہ طبیعت دان، فلکیات دان اور فلکیاتی حیاتیات کے ماہر ہیں اور ایریزونا سٹیٹ یونیورسٹی میں پروفیسر ہیں، جہاں وہ سائنس کے بنیادی تصورات کا مرکز چلاتے ہیں وہیں وہ بیرونی ذہانت کی تلاش کے مرکز کے سربراہ بھی ہیں چنانچہ اگر کائنات میں کوئی ذہین حیات دریافت ہوتی ہے تو وہ سب سے پہلے شخص ہوں گے



جنہیں پتہ چلے گا، ان کے اعزاز میں سیارے OG 1992 کو ان کے نام ([Pauldavies 6870](#)) سے موسم کیا گیا ہے، ان کی علمی خدمات کے پیش نظر انہیں کئی بین الاقوامی سائنسی اعزازات سے نوازا جا چکا ہے جس میں 1995ء میں ٹیمپلٹن انعام ([Templeton Prize](#)) بھی شامل ہے، وہ بیس سے زائد سائنسی کتب کے مصنف بھی ہیں۔

## دیباچہ

1960 کے اوائل میں، جب میں طالب علم تھا، کائنات کے آغاز کا مسئلہ شدید دلچسپی کا حامل تھا، رواں صدی کے دوسرے عشرے میں پیش کیا گیا بگ بینگ کا نظریہ (Big Bang Theory) جسے پچاس کی دہائی تک زیادہ توجہ نہ ملی، اب بھی مقبولیت کی منزل سے دور تھا، اس کا حریف متوازن یا مستحکم کائنات کا نظریہ (Steady State Theory) آغاز کائنات کا یکسر منکر تھا، یہ ابھی تک کئی حلقوں میں کافی مقبول تھا، پھر 1965 میں آرنو پینزیاس (Arno Allan Penzias) اور رابرٹ ولسن (Robert Woodrow Wilson) نے پس منظری شعاعیں دریافت کیں اور اس مضمون کی تقلیل مہیت ہو گئی، کائنات کی دفعاً پڑھنگام اور شدید گرم ابتداء کے حق میں یہ یقیناً واضح شہادت تھی۔

کوئی نیات دانوں (Cosmologists) یعنی کائنات کے ماہرین نے اس دریافت کے مضمرات پر سرگرمی سے کام شروع کر دیا، کائنات بگ بینگ (Big Bang) کے ایک ملین سال بعد کتنی گرم تھی؟ ایک سال گزرنا تھا تو کتنی گرم تھی؟ ایک سینڈ بعد کتنی؟ آغازِ کائنات کے اس جہنم میں کون کون سے عوامل وقوع پذیر ہو رہے تھے؟ اور کیا ایسے امکان موجود ہیں کہ ان شدید حالات کی حامل کچھ باقیات مل جائیں؟

مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 1968 میں، میں نے کوئی پر ایک لیکچر میں شرکت کی تھی، پروفیسر نے پس منظری شعاعوں کی دریافت کے تناظر میں بگ بینگ نظریے کا از سر نو جائزہ لے کر لیکچر کا اختتام کیا تھا، اس نے کہا تھا "کچھ نظریہ دانوں نے بگ بینگ کے پہلے تین منٹ کے دوران ہونے والے نیوکلیئی تعمالات کی بنیاد پر کائنات کی کیمیائی اجزاء ترکیبی بیان کی ہے۔" سبھی حاضرین نے زوردار قہقهہ لگایا۔ کائناتی آغاز کے چند لمحات کے بعد اس کی حالت کو بیان کرنے کی کوشش بے معنی ہے۔ پروازِ تخیل لگتی تھی، ستر ہویں صدی کے آرچ بیش جیمز اشر (James Ussher) نے انجیل کے وقائع نگاری میں جزئیات کی حد پر جا کر کائنات کا 23 اکتوبر 4007 قبل مسیح میں پیدا ہونا بتایا تھا، کائنات کے پہلے تین منٹ کے واقعات بالترتیب بیان کرنے کا حوصلہ اسے بھی نہیں ہوا تھا۔

سامننسی ترقی کی رفتار کا یہ عالم ہے کہ پس منظری شعاعوں کی دریافت کے بہنچل ایک دہائی بعد پہلے تین منٹ کا مطالعہ نصابی

کتب کا حصہ بن چکا تھا، 1977 میں امریکی طبیعت دان سٹیون وائن برگ (Steven Weinberg) نے "پہلے تین منٹ" (The First Three Minutes) نامی ایک کتاب لکھی جو سب سے زیادہ بکنے والی کتب کی فہرست میں شامل رہی، یہ کتاب مقبول عام سائنسی مطبوعات میں ایک سنگ میل ثابت ہوئی، اس کتاب میں مضمون کے ایک ماہر نے عوام الناس کے لیے بگ پینگ کے بعد کے چند لمحات میں ہونے والی سرگرمیاں مدلل اور مفصل انداز میں بیان کیں۔

لوگ ان دریافتتوں سے آشنا ہو رہے تھے اور سائنس دان اپنی تحقیق آگے بڑھا رہے تھے، ان کی توجہ منشوں کی بجائے آغازِ کائنات کے پہلے سینڈوں بلکہ پہلے سینڈ کے بھی ایک انتہائی چھوٹے حصوں پر مرکوز ہو گئی تھی، کم و بیش ایک دہائی گزرنے پر برطانوی ریاضیاتی طبیعت دان سٹیفن ہائنگ (Stephen Hawking) کی کتاب "وقت کی مختصر تاریخ" (A Brief History of Time) منظر عام پر آئی، کتاب میں بڑے اعتماد کے ساتھ کائنات کے پہلے ایک سینڈ کے پہلے کھربویں حصے میں ہونے والے واقعات کے متعلق جدید ترین نظریات پر روشنی ڈالی گئی تھی، 1968 میں یونیورس کے آخر پر لگنے والا قہقهہ کھوکھلا محسوس ہونے لگا تھا۔

بگ پینگ نظریہ جیسے جیسے سائنس دان برادری اور عام لوگوں میں جڑ کپڑتا گیا، کائنات کے مستقبل پر زیادہ توجہ دی جانے لگی، ہمارے پاس کائنات کے آغاز پر ایک اچھا نظریہ موجود ہے، لیکن اس کا انجام کیا ہو گا؟ ہم اس کے حقیقی انجام پر کیا کہہ سکتے ہیں؟ کیا کائنات کو واقعی کبھی ختم ہو جانا ہے؟ اور اگر ایسا ہے تو کیا یہ خاتمه دھماکے پر ہو گا یا سکنی پر؟ ہمارا کیا بنے گا؟ انسانیت یا اس کے جانشین، چاہے وہ روبوٹ نما ہوں یا گوشت پوسٹ کے، کی بقاء ابدیت کی حامل ہوگی؟

ہو سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ قریب نہ ہو لیکن ان سوالوں پر مجھس نہ ہونا ممکن نہیں، زمین پر انسان کے اپنے کھڑے کئے گئے مسائل کے باوجود جب ہم کائناتی پیمانے پر دیکھتے ہیں تو انسانی بقاء کے امکانات روشن ہیں، "آخری تین منٹ" کائنات کے مستقبل کی کہانی ہے جس کی بنیاد نامور طبیعت دانوں اور ماہرین کوئیات (Cosmologists) کے تازہ ترین نظریات کی روشنی میں کی گئی پیش گوئیوں پر ہے، یہ کتاب محض کشف بیانی نہیں، لیکن مستقبل میں ترقی کی فراوانی کے امکانات ماضی کے کسی بھی دور سے کہیں زیادہ ہیں، مگر ہم اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کر سکتے کہ جو وجود میں آتا ہے معلوم بھی ہو سکتا ہے۔

یہ کتاب عام قاری کے لیے ہے، اس کا مطالعہ سائنسی یا ریاضی سے واقفیت کا مقاضی نہیں، تاہم وقتاً فوقتاً جہاں بہت بڑے یا

بہت چھوٹے اعداد سے واسطہ پڑے گا وہاں دس (10) کی طاقت کا طریقہ استعمال کیا جائے گا، اس طریقہ کو مختصرًا اور زیادہ قابل فہم انداز میں لکھا جاسکتا ہے، مثلاً جب ایک سو ملین کو عام انداز میں لکھا جائے تو اس طرح ہو گا 100,000,000,000 یہ طریقہ قدرے الجھن آمیز ہے، اس عدد میں "1" کے بعدہ گیارہ صفر ہیں، اسے لکھنے کا ایک طریقہ 10<sup>11</sup> ہے، جسے پڑھا جائے گا "دس کی طاقت گیارہ" اس طرح ایک ملین کو 10<sup>6</sup> اور ایک ٹریلیون کو 10<sup>12</sup> لکھا جائے گا، ذہن میں رہے کہ یہ طریقہ بعض اوقات عدد کے بڑھنے کی شرح پر ظاہری پرده ڈال دیتا ہے، مثلاً 10<sup>10</sup> اور 10<sup>12</sup> میں بظاہر زیادہ فرق معلوم نہیں ہوتا حالانکہ اول الذکر سو گناہڑا ہے، دس کی طاقت کے ساتھ منفی لگا کر بہت چھوٹے اعداد کو ظاہر کیا جاتا ہے، مثلاً اگر یہ میں سے ایک یعنی  $\frac{1}{1,000,000,000}$  کو ظاہر کرنا ہو تو "دس کی طاقت منفی نو" یعنی 10<sup>-9</sup> لکھا جائے گا۔

مجھے آخر میں قاری سے گزارش کرنا ہے کہ یہ کتاب مفروضاتی ہے، حالانکہ یہ کتاب کائنات کی تازہ ترین اور بہترین تفہیم پر مبنی ہے لیکن مستقبل کی سائنس یا مستقبلیات (Futurology) ابھی درست سائنسوں کا درجہ حاصل نہیں کر پائی ہے، تاہم کائنات کے انجام پر نظریاتی اور قیاسی کام کی ترغیب کی کامیاب مزاحمت مشکل ہے۔

اس کائنات کے پس منظر میں اسی کھلے ذہن کی روح جتنجو کار فرماء ہے، کائنات کے بگ بینگ سے شروع ہونے اور پھر پھیل کر ٹھنڈے ہوتے ہوتے ست رفتار انحطاط یا اچانک تباہی سے دوچار ہونے کا منظر نامہ مسلمه سائنسی بنیادوں پر مبنی ہے، تاہم آغاز اور انجام کے لمبے عرصے میں جو عوامل اور جس طریقہ سے اثر انداز ہوتے ہیں ان پر زیادہ یقین کے ساتھ کچھ کہنا مشکل ہے، فلکیات دانوں کو یقین ہے کہ ستاروں کے انجام سے وہ بخوبی واقف ہیں اور نیوٹران ستاروں اور بلیک ہولوں (Black Holes) کی تفہیم بھی بتدریج بڑھ رہی ہے، لیکن اگر کائنات کئی ٹریلیون سال تک باقی رہتی ہے تو پھر کئی کمزور عوامل، جن پر فی الوقت صرف قیاس آرائی ممکن ہے، اہم ثابت ہو سکتے ہیں، فطرت کے ناکمل علم کے پیش نظر کائنات کے حقیقی انجام پر کچھ جاننے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم موجودہ نظریات کا اطلاق کرتے ہوئے دیکھیں کہ منطقی انجام کیا ہونا چاہیے، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بہت سے نظریات، جن سے کائنات کے مقدار پر اہم پیش گویاں کی جاسکتی ہیں، تجربہ گاہوں میں جانچ نہیں جاسکتے، تجاذبی لہروں کے اخراج، پروٹان کے انحطاط اور بلیک ہول اشعاع کاری (Black Hole Radiation) جیسے کئی عوامل، جنہیں میں زیر بحث بھی لایا ہوں، ایسے ہیں جو مشاہدے میں نہیں آتے لیکن نظریہ ساز ان کے وجود کے سرگرم حامی ہیں، اسی طرح یہ خطرہ بھی ہے کہ کئی ایسے طبعی عوامل موجود ہوں جو ہمارے علم میں نہیں لیکن

اس کتاب میں بیان کئے گئے نظریات کو بدل کر رکھ دیں۔

کائنات میں کسی اور باشمور مخلوق کے امکانی وجود سے صورتحال اور بھی غیر یقینی ہو جاتی ہے، یہاں سے سائنسی افسانوی ادب (Science Fiction) کی حدود کا آغاز ہوتا ہے، ہم اس امکان کو بہر حال نظر انداز نہیں کر سکتے کہ بہت لمبے عرصے میں ذی شعور مخلوق طبعی نظاموں میں روز افزون بڑھتی شرح کے ساتھ تبدیلیاں لاسکتی ہے، میں نے کائنات میں حیات کا موضوع شامل کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ بہت سے قارئین کے لیے کائنات کے انجام میں دلچسپی کی واحد وجہ ان کی انسان یا اس کے جانشینوں کے مستقبل پر تشویش ہے، واضح رہے کہ سائنسدانوں کو نہ تو انسانی شعور کی ماہیت سے کامل واقفیت ہے اور نہ ہی مستقبل بعید میں اس شعور کے تسلسل کے طبعی تقاضوں سے۔

کتاب کے مواد پر معاون ثابت ہونے والی بحثوں کے لیے مجھے جان بیرو (John Barrow) فریک ٹپلر (Frank Tipler) جیسن ٹائم (Jason Twamley) اور ڈنکن سٹیل (Duncan Steel) اور راجر پن روز (Roger Penrose) کا شکریہ ادا کرنا ہے۔

## قیامت

تاریخ: 21 اگست 2126 قیامت

مقام: کرہ ارض۔ پورے سیارے پر ہر اس انسان چھپنے کی کوشش میں ہیں، کروڑوں کے پاس کوئی جائے پناہ نہیں، کچھ مایوسی کے عالم میں غاریں اور متروک کا نیں ڈھونڈ کر زیر زمین چلے گئے ہیں، چند ایک نے آبدوزوں میں بیٹھ کر سمندروں کی گہرائیوں کی راہ لی ہے، ایسے بھی ہیں جو عالم مایوسی میں حواس کھو کر قتل و غارت اور درندگی پر اتر آئے ہیں، لیکن زیادہ تر سکتے کے عالم میں بیٹھے خاتمے کے منتظر ہیں۔

آسمان پر روشنی کی بہت لمبی اور چوڑی پٹی ہے جو لگتا ہے کھڑج کر بنائی گئی ہے، آغاز میں یہ ہلکی لو دیتی پینسل نما باریک شعاع تھی، روز بروز پہلیتے اس نے خلاء میں البتی گیس کے خوفناک گرداب کی شکل اختیار کر لی ہے، گرد اور دھنڈ سے بنی دم کے ایک سرے پر سیاہ بے شکل خوفناک تودہ سا ہے، یہ سرا اتنا چھوٹا ہے کہ خوفناک اثرات کی چغلی نہیں کھاتا، چالیس (40,000) ہزار فنی گھنٹہ یا دس میل فنی سینٹر کی رفتار سے زمین کی طرف بڑھ رہا ہے، اس ٹریلیون ٹن برف اور پتھر کا آواز کی رفتار سے ستر گنا پر زمین سے ٹکرانا طے ہے۔

نسل انسانی سوانی دیکھنے اور انتظار کرنے کے اور کچھ نہیں کر سکتی، سائنسدان ہونی کو اٹل مان کر بہت پہلے دور بینوں پر کام بند کر چکے ہیں، اب کمپیوٹر بھی بند کر دیے گئے ہیں، تباہی کے جو لا محدود خاکے کمپیوٹروں سے حاصل ہوئے تھے اتنے خوفناک اور غیر یقینی ہیں کہ لوگوں تک نہیں پہنچائے جاسکتے ہیں، کچھ سائنسدانوں نے اپنے ہم عصروں پر علمی برتری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بقاء کی تفصیلی اور بہترین حکمت عملی تشکیل دی ہے، کئی ایسے بھی ہیں جو اس حادثے کا ہر ممکن احتیاط سے آخری دم تک مشاہدہ کرنے کا تھیہ کیے ہوئے ہیں تاکہ سچے سائنسدان کا کردار ادا کرتے ہوئے تمام اعداد و شمار کو زیر زمین

دفن کیپول تک منتقل کر سکیں، آنے والی نسل کے لیے۔

تصادم کا لمحہ آن پہنچا ہے، دنیا بھر میں کروڑوں کی آنکھیں گھٹریوں پر ہیں، آخری تین منٹ۔

جہاں دمدار ستارے کو زمین سے ٹکرانا ہے اس کے عین اوپر آسمان شق ہو گیا ہے، ہزارہا میل ہوا دھماکے سے پھٹ پڑی ہے، کسی بڑے شہر جتنا موٹا آتشیں نیزہ آسمان سے لپکا اور زمین میں پیوست ہو گیا ہے، اس سارے عمل میں صرف پندرہ سینٹنڈ لگے ہیں، زمین نے یوں جھر جھری لی ہے گویا دس ہزار زلزلے بیک وقت آئے ہوں، دھماکے سے پیدا ہونے والی دباؤ کی لہریں (Shock Waves) حادثے کے مقام سے چاروں طرف پھیلی ہیں اور راستے میں آنے والی ہر عمارت اور ڈھانچے کو زمین کے برابر کرتی چلی گئی ہیں، تصادم کے گرد کی جگہ ایک دائرے کی شکل میں میلیوں بلند پہاڑ کی طرح اٹھی، زمین کا اندر وون نظر آنے لگا اور میلیوں پر محیط آتش فشاں نے جنم لیا، پگھلی چٹانوں کی دیوار لہروں کی صورت باہر سفر کرنے لگی اور سطح زمین اس طرح تہہ وبالا ہو گئی گویا کسی کمبیل کو جھکتا دے کر چھوڑا گیا ہو۔

خود آتش فشاں کے اندر ٹریلینوں ٹن چٹانیں گیس بن گئی ہیں، بہت سالاوا اتنی قوت سے اچھلا کہ خلائے بسیط تک اٹھتا چلا گیا ہے، اس سے بھی بڑی مقدار سینکڑوں ہزاروں میل دور پارش کی طرح بر سی ہے اور جو کچھ بچا تھا اسے بھی تباہ کر چکی ہے، گرد و غبار کا ایک ستون جو آسمان کی طرف اٹھا، پھیل کر سورج اور زمین کے درمیان حائل ہو گیا ہے۔

جب اچھل کر اوپر گیا ہوا ملبہ دوبارہ زمین پر گرنے لگا تو گرد آلودہ اندھیرے میں کروڑوں شہابیوں کی جھلماہیں ہونے لگیں، ان کی جھلساتی حرارت نے نیچے موجود ہر چیز کو بھون ڈالا ہے۔

مندرجہ بالا منظر نامہ 21 اگست 2126 میں ایک دم دار ستارے سویفت ٹٹل (Swift-Tuttle) کے زمین کے ساتھ ٹکرانے کی پیش گوئی پر مبنی ہے، اگر یہ سب ہو جاتا ہے تو عالمگیر تباہی ہو گی اور انسانی تہذیب معدوم ہو جائے گی، جب یہ دم دار ستارہ 1993 میں ہماری زمین کے پاس سے گزرا تھا تو حساب کتاب لگایا گیا کہ 2126 میں اس کے زمین سے ٹکرانے کے واضح امکانات ہیں، لیکن بعد میں کیے جانے والے حساب کتاب نے ثابت کیا ہے کہ دم دار ستارہ زمین سے ٹکرانے گا نہیں بلکہ دو ہفتوں کے فاصلے سے گزر جائے گا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ ہمیشہ کے لیے ٹل گیا، بہت جلد یا بدیر یہی مذکورہ بالا دم دار ستارہ یا کوئی اور جسم زمین سے ٹکرا جائے گا، تخمینہ لگایا گیا ہے کہ تقریباً 10 ہزار اجسام جن کا قطر نصف میل یا زیادہ ہے ایسے ہیں جن کا گردشی مدار کرہ ارض کے مدار کو قطع کرتا ہے، ان فلکیاتی مداخلت کاروں کا منع نظام شمسی کے دور دراز

کے سرد گوشے ہیں، ان میں سے کچھ دم دار ستاروں کی باقیات ہیں جو سیاروں کے تجاذبی میدانوں میں پھنس گئے ہیں، جبکہ باقی مرخ اور مشتری کے درمیان پائی جانے والی سیارچوں کی پٹی سے تعلق رکھتے ہیں، مداروں کے عدم استحکام کے باعث یہ چھوٹے چھوٹے لیکن مہلک اجسام نظام شمسی کے اندر ورن میں آتے جاتے رہتے ہیں، یہ ہماری زمین اور دوسرے سیاروں کو درپیش مستقل خطرات میں سے ایک ہیں۔

ان میں سے کئی اجسام زمین کو تمام نیوکلیئی دھماکوں سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے وقوع پذیر ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہیں، مسئلہ صرف یہ ہے کہ زمین کو کتنا وقت ملتا ہے، یہ انسان کے لیے بڑی خبر ہوگی، یہ حادثہ نوع انسانی کی تاریخ میں بے مثل ہو گا اور ہماری تاریخ کے خاتمے کا موجب بن سکتا ہے، اوس طاً ہر چند ملین سال بعد شہابِ ثاقب یا دم دار ستارے اس پیانے پر ٹکرانے کے واقعات ہوتے رہتے ہیں، بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ پینتھ (65) ملین سال پہلے ڈائینو سار کی نسل بھی ایسے ہی کسی سانحے کے باعث معدوم ہوئی تھی، اگلی باری ہماری بھی ہو سکتی ہے۔

بیشتر مذاہب اور ثقافتوں کے بنیادی اجزاء میں سے ایک یوم آخرت پر ایمان ہے، بائل کی کتابِ مکاشفہ (Book of Revelation) میں ہمارے لیے رکھی گئی اس تباہی اور موت کا بیان کچھ اس طرح ہے:

"پھر آسمانی بجلی کے کوندے، گڑگڑا ہٹیں، بادلوں کی گرج اور مہیب زلزلے وارد ہوئے، زلزلہ اتنا خوفناک تھا کہ انسان کے زمین پر وارد ہونے سے لے کر ایسا زلزلہ نہیں آیا تھا، قوموں کے شہر مسماں ہو گئے، جزیرے بہہ گئے اور پہاڑ ڈھونڈنے سے نہیں ملتے تھے، آدمی پر آسمانوں سے ایسے اولوں کی بارش ہوئی جن میں سے ہر ایک کا وزن ایک پاؤ نڈ تھا"

بھری ہوئی قوتوں سے بھری اس کائنات میں زمین ایک حقیر سا جسم ہے جس پر بہت سی آفات نازل ہو سکتی ہیں لیکن اس کے باوجود اس نے ساڑھے تین سو ملین سال زندگی کی میزبانی کی ہے، زمین پر زندگی کی کامیابی کا راز خلاء ہے۔ بہت وسیع خلاء۔ خلاء کے اس وسیع سمندر میں ہمارا نظام شمسی سرگرمی کا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، اس نظام شمسی سے باہر نزدیک ترین ستارہ ساڑھے چار نوری سال سے زیادہ فاصلے پر واقع ہے، اس فاصلے کا اندازہ یوں کیا جاسکتا ہے کہ روشنی کو ترانوے (93) ملین میل دور سورج سے ہم تک آنے میں صرف ساڑھے آٹھ منٹ لگتے ہیں، چار سالوں میں روشنی میں ٹریلیین میل سے زیادہ کا سفر طے کرتی ہے۔

سورج ایک عام سا بونا ستارہ ہے جو ہماری کہکشاں کے ایک ایسے حصے میں واقع ہے جو دوسرے حصوں سے کسی طور پر مختلف

نہیں، اس کہکشاں میں کوئی ایک بلین ستارے ہیں جن کے وزن سورج کے وزن کے چند فیصد سے لے کر کئی سو گنا زیادہ تک ہیں، یہ ستارے بہت سی گیس اور غبار کے بادل اور نہ جانے کتنے سیارے، شہابیے، دم دار سیارے اور بلیک ہول کہکشاں کے مرکز کے گرد سست رفتاری سے گھوم رہے ہیں، جب تک یہ ذہن میں نہ ہو کہ کہکشاں کا مریٰ یعنی جو حصہ نظر آتا ہے کوئی ایک لاکھ نوری میل چوڑا ہے، اجسام کی اس تعداد سے یہی تاثر ابھرتا ہے کہ کہکشاں بہت پُر ہجوم جگہ ہے، شکل میں یہ ٹھالی کی سی ہے جس کے مرکز میں گومڑ ہے جس میں سے ستاروں اور گیس سے بننے والے چکر دار بازو باہر نکلے ہوئے ہیں، انہی بازوؤں میں سے ایک میں ہمارا سورج بھی واقع ہے جس کا وسط مرکز سے فاصلہ کوئی تیس ہزار نوری میل ہے۔

جبکہ تک ہمارے علم میں ہے، ہماری کہکشاں کائنات میں کسی امتیازی حیثیت کی حامل نہیں، اسی طرح کی ایک کہکشاں اینڈرومیڈا ([Andromeda](#)) کوئی دو بلین نوری سال فاصلے پر راسی نام کے مجمع النجوم کی سمت میں پائی جاتی ہے، اسے ننگی آنکھ سے دیکھا جائے تو روشنی کے دھنڈ لکے سے پیوند کی صورت نظر آتی ہے، کائنات کی قابل مشاہدہ و سعتوں میں کئی بلین کہکشاں میں نظر آتی ہیں جن میں سے کچھ چکردار، کچھ بیضوی اور کچھ غیر معینہ شکل کی حامل ہیں، فاصلے کے پیمانے بہت بڑے ہیں، طاقتوں دور بینوں کی مدد سے کئی بلین نوری سال دور کہکشاوں کو علیحدہ علیحدہ دیکھا جاسکتا ہے، بعض اتنی دور ہیں کہ ان کی روشنی کو ہم تک آنے میں زمین کی عمر (یعنی ساڑھے چار بلین سال) سے بھی زیادہ عرصہ لگتا ہے۔

ان ساری و سعتوں کا نتیجہ ہے کہ تصادم شاذ و نادر ہی ہوتا ہے، زمین کو سب سے بڑا خطرہ خود اپنے ہمسایوں سے ہے، سیارچے ([Asteroids](#)) اپنے مداروی سفر میں عموماً زمین کے پاس سے نہیں گزرتے، یہ عام طور پر مرخ اور مشتری ([Jupiter](#)) کے درمیان ایک پٹی میں محدود سورج کے گرد گردش کرتے ہیں، لیکن کبھی کبھار مشتری کی بہت بڑی کمیت ([Mass](#)) یعنی مادے کی مقدار کسی سیارچے کے مدار میں خلل ڈال کر اسے سورج کی طرف پھینک دیتی ہے، اور وہی زمین کے لیے خطرہ بن جاتا ہے، دوسرا خطرہ دم دار سیاروں سے ہے، ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ یہ سورج سے ایک نوری سال دور ایک غیر مریٰ یعنی نظر نہ آنے والے بادل میں جنم لیتے ہیں، دم دار سیاروں کا خطرہ، سیارچوں کے بر عکس، مشتری کی بجائے پاس سے گزرنے والے ستاروں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، کہکشاں ساکن نہیں بلکہ اس کا مادہ ایک مرکز کے گرد گھومتا ہے اور یوں یہ گھومتی نظر آتی ہے، سورج اور اس کے سیارے بھی کہکشاں کے گرد گھومتے ہیں اور ایک چکر کوئی دو بلین سالوں میں مکمل کرتے ہیں، اس دوران قریب سے گزرنے والے سیارے مذکورہ بالا بادل میں سے کسی دم دار سیارے کو سورج کی طرف روانہ کر سکتے ہیں، جب یہ نظام شمسی کے اندروںی حصہ میں پہنچتا ہے تو سورج اس کے کچھ مادے کی تباہی

کرتا ہے اور وہ اس کی دم بن جاتا ہے، بہت کم امکان ہے کہ کوئی دم دار سیارہ سورج کے گرد دوران گردنش میں زمین سے نکلا جائے، نقصان دم دار سیارے کے نکرانے سے ہوتا ہے لیکن اس کی ذمہ داری اس ستارے پر ہے جس نے پاس سے گزرتے ہوئے اسے اوپر روانہ کیا تھا، ہماری خوش قسمتی ہے کہ ستاروں کے فاصلے بہت زیادہ ہیں اور ایسے واقعات بڑی تعداد میں رونما نہیں ہوتے۔

کئی اور اجسام بھی کہکشاں میں اپنے سفر کے دوران ہماری راہ میں آسکتے ہیں، بہت بڑے بڑے گیسی بادل اس کی ایک مثال ہیں، اگرچہ ان کی کثافت ہماری تجربہ گاہوں کے خلاء سے بھی کم ہوتی ہے لیکن یہ شمسی آندھیوں پر اثر انداز ہو کر ان سے خارج ہونے والی حرارت کی مقدار کم و بیش کر سکتے ہیں، آوارہ سیارے، نیوٹران ستارے، بھورے ہونے اور بلیک ہول بھی ہر وقت وسعتوں میں گردال رہتے ہیں اور ہم پر ناگہانی بلا کی صورت نازل ہو سکتے ہیں۔

اس سے بھی بھیانک خطرہ اس امکان کی صورت میں موجود ہے کہ کہکشاں کے اور بہت سے ستاروں کی طرح ہمارا سورج بھی دراصل دو ہرے ستاری نظام ([Double Star System](#)) کا ایک رکن ہو، اگر ایسا ہے تو دوسرا ستارہ جسے ستارہ اجل کہنا چاہیے اس نظام کے مدار پر ابھی اتنی دور ہے کہ شناخت میں نہیں آتا، اس کے باوجود یہ اپنے بہت طویل مدار پر گردنش کے دوران بھی تجاذبی طریقہ سے اپنی موجودگی کا احساس، دور دراز دم دار ستاروں کو ہماری طرف روانہ کر کے، دلا سکتا ہے، ماہرین ارضیات کا خیال ہے کہ زمین پر ماضی میں بڑے پیمانے کی ماحولیاتی تباہی تو اتر سے اور خاص و قفوں سے ہوتی رہی ہے، انہوں نے اس وقفہ کی طوالی تقریباً 30 ملین سال شمار کی ہے۔

فلکیات کے ماہرین کو دور دراز علاقوں میں کہکشاوں کا تصادم دیکھنے کو مل جاتا ہے، کسی دوسری کہکشاں کے ہماری کہکشاں کے ساتھ نکلا کر اسے ملیا میٹ کر دینے کے کتنے امکانات ہیں؟ چند خاص ستاروں کی غیر معمولی تیز حرکت اس امر کے شواہد فراہم کرتی ہے کہ پہلے بھی کچھ چھوٹی کہکشاوں اس نوعیت کا تصادم کر چکی ہیں، لیکن دو کہکشاوں کے تصادم کا لازمی نتیجہ ان کے ستاروں کی تباہی نہیں ہوتا، کہکشاوں اور ستاروں کے مابین اتنا فاصلہ ہوتا ہے کہ وہ بغیر ستاروں کے تصادم کے باہم مدغم ہو سکتی ہیں۔

بہت سے لوگوں کے ذہنوں پر قیامت سوار ہے یعنی دنیا کی اچانک اور ہمہ رنگ تباہی، لیکن سست رو انحطاط اچانک موت سے بڑا خطرہ ہے، زمین کئی طرح سے رفتہ رفتہ ناقابل رہائش ہو سکتی ہے، سست رو ماحولیاتی تنزلی، موسمی تبدیلی، سورج سے خارج

ہونے والی حرارت میں معمولی سی کمی بیشی، یہ سب عوامل اس ناقواں سیارے پر ہماری زندگی کو معدوم نہیں تو مشکل ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ایسی تبدیلیاں ہزاروں بلکہ لاکھوں سالوں میں ہوں گی اور تب تک انسان ٹیکنالوجی میں ہونے والی ترقی سے ان پر قابو پانے کا اہل ہو جائے گا، مثلاً اگر ایک برفانی دور کا آغاز ہوتا ہے تو نسل انسانی کے معدوم ہونے کا کوئی امکان نہیں کیونکہ یہ عمل اتنا سست ہو گا کہ اس کے خلاف مدافعتی حکمت عملی وضع کرنے کا موقع مل جائے گا، اگر ٹیکنالوجی کی ترقی کی رفتار کے پیش نظر قیاس آرائی کی جائے تو آنے والے ایک ہزار سال میں انسان یا اس کے جانشین بڑے طبعی نظاموں اور بالآخر فلکیاتی پیمانے کی مہماں سر کرنے کے اہل ہو جائیں گے۔

کیا اصولی طور پر یہ ممکن ہے کہ انسان بحیثیت نوع ابديت حاصل کرے، عین ممکن ہے، لیکن ہم دیکھیں گے کہ ابديت کا حصول آسان نہیں اور یہ ناممکن بھی ثابت ہو سکتی ہے، کائنات خود کچھ طبعی قوانین کے تحت ہے جو اس پر ایک دورِ حیات مسلط کرتے ہیں، یعنی پیدائش، ارتقاء اور شاید موت، ہمارا تصور بھی ستاروں سے علیحدہ نہیں کیا جاسکتا۔


## مرتی ہوئی کائنات

تاریخ سائنس کی غالباً سب سے مایوس کن پیش گوئی 1856 میں جرمن سائنسدان ہرمن فان ہیلیم ہولٹز (Hermann von Helmholtz) نے کی، اس نے دعویٰ کیا کہ کائنات مر رہی ہے، اس دعوے کی بنیاد طبیعت کے ایک قانون پر ہے جسے حر حرکیات (Thermodynamics) کا دوسرا قانون کہتے ہیں، اونکل انیسویں صدی میں دریافت ہونے والا یہ قانون اصل میں حرارتی انجنوں کی کارکردگی کے بارے میں تکمیلی ساینس تھا، جلد ہی اس قانون کے عالم گیر اطلاق کو شناخت کر لیا گیا، اسے اب محض دوسرا قانون کہتے ہیں اور یہ کائناتی نتائج و عواقب کا حامل خیال کیا جاتا ہے۔

اپنی سادہ ترین شکل میں یہ قانون بیان کرتا ہے کہ حرارت گرم سے ٹھنڈے جسم کی طرف بہتی ہے، یہ طبعی نظاموں کی جانی پہچانی اور واضح خصوصیت ہے، کھانا پکنے یا چائے کا کپ ٹھنڈا ہونے کے عمل میں ہم اسی قانون کو بروئے کار دیکھتے ہیں، اس دوران حرارت زیادہ درجہ حرارت کے علاقے سے کم درجہ حرارت والے علاقے کی طرف بہتی ہے، یہ طرز عمل ناقابل فہم نہیں، حرارت مادے کے مالی کیولوں (Molecules) کی ہلچل کا مجموعی اظہار ہے، گیس، مثلاً ہوا میں مالی کیوں تیزی سے ادھر ادھر حرکت کرتے اور باہم ٹکراتے ہیں، جسم جتنا گرم ہو گا مالی کیوں ہلچل اتنی ہی تیز ہوگی، دو مختلف درجہ حرارت کے اجسام کو ملا دیا جائے تو گرم جسم کے مالی کیولوں کی تیز حرکت ٹھنڈے جسم کے مالی کیولوں کو منتقل ہو جاتی ہے۔

چونکہ حرارت کا بہاؤ یک طرفہ ہوتا ہے اس لیے پیچھے کو پلٹا نہیں جاسکتا، اگر کسی فلم کی مدد سے حرارت کو ٹھنڈے سے گرم جسم کی طرف بہتا دکھایا جائے تو یہ ایسا ہی انہونا لگے گا جیسے پہاڑی پر اوپر کی جانب چڑھتی ندی یا بادلوں کی طرف واپس اٹھتے بارش کے قطرے، چنانچہ ہم حرارت کے بہاؤ میں ایک بنیادی سمتیت کی شناخت کر سکتے ہیں، اس سمتیت کو اکثر ماضی سے مستقبل کی طرف اشارہ کرتے تیر سے ظاہر کیا جاتا ہے، یہ "وقت کا تیر" ہے، یہ حر حرکیاتی علوم کی غیر رجعت

پذیر (Irreversible) مہیت یا نوعیت کو ظاہر کرتا ہے، پچھلے ڈیڑھ سو سال سے اس قانون نے طبیعت دانوں کو مسحور کر رکھا ہے۔



وقت کا تیر۔ پگھلتی برف کی ڈلی وقت میں موجود "سمیت" کی تعریف کرتی ہے، یعنی کہ حرارت گرم پانی سے ٹھنڈی برف کی طرف بہتی ہے، اگر کسی فلم کو الٹا چلا کر واقعات کی iii، ii، or i کردی جائے تو یہ کرتب فوراً کپڑا جائے گا، اس عدم تشکل کے ساتھ ایک خصوصیت وابستہ ہے جسے ناکارگی یا توانائی کی عدم دستیابی کہتے ہیں، جوں جوں برف پگھلتی ہے ناکارگی بڑھتی چلی جاتی ہے۔

شکل 2.1

ہیلم ہولٹز (Lord Kelvin) رُدُوف کلاسیس (Rudolf Clausius) اور لارڈ کیلیون (Hermann von Helmholtz) کی تحقیقات کے نتیجے میں ایک طبیعی مقدار ناکارگی یا حرارت کی عدم دستیابی (Entropy) کی اہمیت سامنے آئی کہ کس طور یہ حر حرکیاتی (Thermodynamic) عوامل کو غیر رجعت پذیری یا نہ پہنائے جاسکنے سے متصف کرتی ہے، اگر ایک نظام باہم متصل ایک ٹھنڈے اور ایک گرم جسم پر مشتمل ہے تو حرارت کو درجہ حرارت پر تقسیم کرنے سے ناکارگی کی مقدار حاصل

ہو گی، گرم جسم سے ٹھنڈے جسم کی طرف بہنے والی حرارت کی تھوڑی سی مقدار کو زیر غور لائیں، گرم جسم سے کچھ ناکارگی کم ہو جائے گی اور ٹھنڈے جسم میں کچھ ناکارگی بڑھ جائے گی، جتنی حرارت گرم جسم سے نکلی اتنی ہی حرارت ٹھنڈے جسم نے جذب کی، لیکن درجہ حرارت کے اختلاف کی وجہ سے ٹھنڈے جسم میں ناکارگی کا اضافہ گرم جسم میں ناکارگی کی کمی سے ہمیشہ زیادہ ہوتا ہے، چنانچہ گرم اور ٹھنڈے جسم پر مشتمل نظام کی مجموعی ناکارگی ہمیشہ بڑھتی ہے، اسی وجہ سے حر حرکیات کے دوسرے قانون کی ایک تعریف یہ بھی ہے کہ مذکورہ بالا نظام کی مجموعی ناکارگی میں کبھی کمی نہیں ہوتی، اگر یہ مان لیا جائے کہ ناکارگی میں کمی ہو سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ حرارت ٹھنڈے جسم سے گرم جسم کی طرف بہتی رہتی ہے۔

اس تجربے کو زیادہ پھیلا دیا جائے تو اس قانون کی تعمیل Generalization ہوتی ہے اور یہ تمام بند نظاموں پر محیط ہو جاتا ہے، تب ہم یہ کہیں گے کہ ناکارگی کبھی کم نہیں ہوتی، فرض کریں کہ نظام میں ریفریجریٹر بھی شامل ہے جو ٹھنڈے جسم سے حرارت گرم جس کو منتقل کر سکتا ہے، اب ہم نظام کی مجموعی ناکارگی کا حساب لگانے کے لیے اس توانائی کو بھی زیر غور لائیں گے جو ریفریجریٹر چلانے میں صرف ہوتی ہے، توانائی کا خرچ ہونا بجائے خود ناکارگی میں اضافہ کا سبب بنتا ہے،

ریفریجریٹر کے چلنے سے پیدا ہونے والی ناکارگی ہمیشہ ناکارگی میں اس کمی سے زیادہ ہوتی ہے جو ٹھنڈے سے گرم جسم کو انتقالِ حرارت سے واقع ہوتی ہے، حیاتیاتی اجسام یا قلمائے جیسے قدرتی عوامل میں بیشتر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نظام کے کسی ایک حصے کی ناکارگی کم ہو جاتی ہے لیکن، اس کی وجہ سے، نظام کے کسی دوسرے حصے کی ناکارگی میں اتنا اضافہ ہوتا ہے کہ نہ صرف مذکورہ بالا کمی کی تلافی ہو جاتی ہے بلکہ پورے نظام کی ناکارگی بڑھ جاتی ہے، بحیثیت مجموعی نظام کی ناکارگی کبھی کم نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔

کائنات کے "باہر" کچھ نہیں، اگر اس بنیاد پر کائنات کو بند نظام مان لیا جائے تو حر حرکیات کا دوسرا قانون ایک اہم پیش گوئی کرتا ہے، کائنات کی مجموعی ناکارگی کبھی کم نہیں ہوتی، بلکہ یہ متواتر بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کی ایک اچھی مثال سورج ہے جس سے ہمارا واسطہ کائنات کی سیر کے سفر میں پہلے قدم پر ہی پڑ جاتا ہے، سورج خلائے بسیط کی ٹھنڈی گہرائیوں میں متواتر حرارت انڈیلتا رہتا ہے، حرارت خلائے بسیط میں جاتی ہے اور پھر کبھی نہیں لوٹتی، یہ بھی ایک غیر رجعت پذیر عمل ہے۔

فوراً ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ آیا کائنات میں ناکارگی لا انتہاء عرصے تک بڑھتی چلی جائے گی؟ فرض کریں کہ ہمارے پاس ایک ایسا سیل شدہ برتن ہے جس میں سے حرارت نہ باہر آسکتی ہے اور نہ ہی باہر سے اندر جاسکتی ہے، اس برتن میں ایک ٹھنڈا اور ایک گرم جسم ایک دوسرے سے متصل رکھے ہوئے ہیں، حرارت گرم سے ٹھنڈے جسم میں سفر کرتی ہے اور

ناکارگی بڑھتی ہے، بالآخر ایک ایسا لمحہ آتا ہے کہ گرم جسم کے ٹھنڈے ہونے اور ٹھنڈے جسم کے گرم ہونے کی وجہ سے دونوں ایک درجہ حرارت پر پہنچ جاتے ہیں، جب نظام اس حالت کو پہنچ جاتا ہے تو حرارت کا بہاؤ بند ہو جاتا ہے، اس لمحے نظام حالت توازن میں ہے اور بلند ترین ناکارگی پر ہے، اس وقت کہا جاتا ہے کہ نظام حر کیا تی حالت توازن میں ہے، جب تک یہ نظام گرد و پیش سے کثرا رہتا ہے تب تک اس میں مزید کوئی تبدیلی متوقع نہیں ہے، لیکن نظام میں باہر سے مداخلت کی جائے، جیسے کہ باہر سے مزید حرارت نظام کے اندر داخل کر کے کی جاسکتی ہے، تو مزید حرارتی سرگرمی ہو گی اور پھر ناکارگی اور بلند درجے پر چلی جائے گی۔

حر کیات کے جو بنیادی اصول اوپر بیان کیے گئے ہیں یہ ہمیں فلکی اور کائناتی تبدیلیوں کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ سورج اور دیگر سیاروں سے حرارت کا بہاؤ کروڑوں سال تک جاری رہتا ہے، لیکن ایسا نہیں کہ بہاؤ کبھی ختم نہیں ہو گا، ایک عام ستارے سے خارج ہونے والی حرارت اس کے مرکز میں جاری نیوکلیائی عمل میں پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ ہم اگلے ابواب میں تفصیلاً دیکھیں گے، سورج بھی بالآخر ایندھن کی کمی کا شکار ہو جائے گا، اور اگر معاملات بغیر کسی غیر معمولی مداخلت کے چلتے رہے تو ٹھنڈا ہوتے ہوتے آخر کار اس کا درجہ حرارت بیرونی خلاء کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے گا۔

ہر میں فان ہیلم ہولٹر نیوکلیائی تعاملات سے واقف نہیں تھا اور اس کے زمانے میں سورج کی توانائی کا مأخذ ایک اسرار تھا، تاہم وہ اس عمومی اصول سے واقف تھا کہ کائنات کی تمام طبیعی سرگرمی آخر کار حر کیا تی توازن یا بلند ترین ناکارگی پر منحصر ہوتی ہے، اسی اصول سے یہ اہم نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کوئی بھی سرگرمی لا انتہاء طور پر عرصے کے لیے جاری نہیں رہ سکتی، حر کیا تی توازن کی طرف اس یک طرفہ سفر کو اولین حر کیات دان کائنات کی "حرارتی موت" کے نام سے یاد کرتے تھے، انفرادی نظاموں کو بیرونی مداخلت، مثلاً حرارت کی فراہمی، سے از سر نو سرگرم کیا جاسکتا ہے، لیکن تعریف کی رو سے کائنات کا کوئی بیرون نہیں، چنانچہ ایک محیط کل حرارتی موت سے فرار کا کوئی راستہ نہیں۔

اس دریافت نے کہ کائنات حر کیا تی قوانین کے اتباع میں آخر کار حرارتی موت کا شکار ہو گی، سائنسدانوں اور فلسفہ دانوں کی پوری نسل کو شدید یاسیت سے دوچار کر دیا، مثلاً برٹنیزِ رسیل اپنی کتاب "میں عیسائی کیوں نہیں؟" میں درج ذیل المناک نتائج پر پہنچا ہے:

”زمانوں کی محنت، سارا حنلوص، الوالعزمی اور انسانی ذہانت کے نصف۔ النہار پر آئے دن کی تابنا کی کو نظمِ شمسی کی وسیع تر موت میں فنا ہونا ہے، انسانی کارناموں کے معبد کو کائناتی انہدام کے ملے ہے تلے دب جانا ہے، یہ سب اگر غیر اختلافی طور پر مسلمہ نہیں تو کم از کم اتنا یقینی ضرور ہے کہ اسے مسترد کرنے والا کوئی فلسفہ تمام نہیں رہ سکتا، انہی حقائق کے عارضی فتالب سے اور اسی کڑی مایوسی پر انسانی روح کے آئندہ آشیانے کی بنیاد رکھی جا سکتی ہے“

بہت سے دوسرے مصنفین نے بھی حر حرکیات کے دوسرے قانون اور اس کے کائناتی موت کے مضمرات سے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کائنات بے معنی اور انسانی وجود لا حاصل ہے، اس تاریک تجزیہ پر اگلے ابواب میں بحث ہو گی اور دیکھا جائے گا کہ آیا یہ غلط فہمی ہے یا نہیں۔

حرارتی موت کی پیش گوئی صرف کائنات کے مستقبل سے ہی متعلق نہیں بلکہ اس کے مااضی کے بارے میں بھی اہم مضمرات ہیں، یہ امر واضح ہے کہ اگر کائنات ایک خاص رفتار سے غیر رجعت پذیر طور پر زوال آمادہ ہے تو یہ لامحدود عرصے سے موجود نہیں ہے، وجہ بہت سادہ ہے یعنی کہ اگر یہ لامحدود عرصے سے زندہ ہوتی تو یہ مر بھی چکی ہوتی کیونکہ یہ روبہ زوال ہے، جو چیز ایک خاص رفتار سے زوال پذیر ہے وہ لامحدود عرصے سے موجود نہیں ہوتی، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ کائنات ایک خاص مدت پہلے وجود میں آئی تھی۔


یہاں اس امر کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ انیسویں صدی کے سائنسدان اس نظریے کو مناسب طور پر گرفت میں نہیں لاسکے تھے، کائنات کے ایک بگ پینگ سے اچانک شروع ہونے کے نظریے کو اس صدی کی بیسویں دہائی میں ہونے والے فلکیاتی مشاہدات کا انتظار کرنا تھا، لیکن کائنات کے مااضی میں وقت کے کسی خاص لمحے میں شروع ہونے کا نظریہ بڑے یقین کے ساتھ غالباً حر حرکیاتی بنیادوں پر اس سے پہلے پیش کیا جا چکا تھا۔

لیکن اس بظاہر سادہ سے مظہر کو ابھی دریافت ہونا تھا اس لیے انیسویں صدی کے ماہرین فلکیات کو ایک انوکھے قفسی نے الجھائے رکھا، اس قفسی کو ایک جرمن ماہر فلکیات اولبر Olber نے متshell کیا تھا، اس میں ایک بظاہر سادہ لیکن انتہائی اہم تنائج کا حامل سوال اٹھایا گیا ہے، وہ یہ کہ آسمان رات کو تاریک کیوں نظر آتا ہے؟ آغاز میں مسئلہ بہت معمولی دکھائی دیتا

ہے، آسمان اس لیے تاریک نظر آتا ہے کہ ستارے ہم سے بہت زیادہ دوری پر ہیں اور "اس لیے" اتنے مدد ہم ہیں۔

لیکن فرض کریں کہ خلاء کی کوئی حد نہیں، اس صورت میں ستاروں کی تعداد لامحدود ہونی چاہیے، ستاروں کی لامحدود تعداد مجموعی طور پر کافی روشنی دے گی، فضاء میں کم و بیش یکساں طور پر اطراف میں پھیلے غیر متغیر اور لامحدود ستاروں سے آنے والی اجتماعی روشنی کا حساب لگانا کچھ اپیادشووار نہیں، کسی ستارے کی تابانی فاصلہ بڑھنے کے ساتھ معموس مربع قانون کے مطابق کم ہوتی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ستارے کا فاصلہ دو گنا ہو جائے تو اس کی تابانی ایک چوتھائی رہ جاتی ہے اور فاصلہ تین گنا کر دیا جائے تو اس کی تابانی نو گنا کم ہو جاتی ہے اور اس طرح اگلا حساب ہے، جبکہ دوسری طرف آپ جتنی دور تک دیکھتے ہیں نظر آنے والے ستاروں کی تعداد بڑھ جاتی ہے، سادہ جیومیٹری سے ثابت کیا جاسکتا ہے کہ جو ستارے دو سو نوری سال کے فاصلے پر ہیں ان کی تعداد فاصلے کے مربع کے تناسب سے بڑھتی ہے یعنی فاصلے کے مربع کے ساتھ راست تناسب ہے، جبکہ ان کی تابانی فاصلے کے مربع کے حساب سے کم ہوتی ہے یعنی فاصلے کے مربع کے ساتھ معموس تناسب ہے، یہ دونوں اثرات ایک دوسرے کو منسوخ کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ لکھتا ہے کہ سب ستاروں سے ایک خاص فاصلے پر جو مجموعی روشنی پہنچتی ہے اس کا خصار ستاروں کے فاصلوں پر نہیں ہوتا، یعنی کہ دو سو نوری میل دور ستاروں سے آنے والی مجموعی روشنی اتنی ہی ہوتی ہے جتنی نوری میل دور ستاروں سے آنے والی مجموعی روشنی۔

مسئلہ اس وقت کھڑا ہوتا ہے جب ہم تمام ممکنہ فاصلوں پر موجود سب ستاروں سے آنے والی روشنی کو جمع کرتے ہیں، اگر کائنات کی کوئی حد نہ ہو تو ہم تک آنے والی مجموعی روشنی کو بھی لامحدود ہونا چاہیے، پھر ہمارے آسمان کو بھی لامحدود طور پر روشن ہونا چاہیے۔



اولبرز کا قضیہ، ایسی غیر متغیر کائنات کا تصور کریں جس میں ستارے بغیر کسی خاص ترتیب کے بکھرے ہوئے ہیں اور اس کی اوست کثافت تمام علاقوں میں یکساں ہے، شکل میں زمین کے گرد پائے جانے والے ایک فضائی کرے میں موجود منتخب ستارے دکھائے گئے ہیں، اس کرے کے باہر اور اندر پائے جانے والے ستارے نہیں دکھائے گئے، زمین پر پہنچنے والی روشنی ان کی روشنیوں کا مجموعہ ہے، کرے کا نصف قطر بڑھنے سے زمین پر پہنچنے والی روشنی کی شدت فاصلے کے مریع کے حساب سے کم ہوگی، اور اس طرح زمین پر پہنچنے والی کُل روشنی کا انحصار اس کے کرے کے نصف قطر پر نہیں ہو گا، چنانچہ اگر کائنات لامحدود ہے تو ایسے کروں کی تعداد بھی لامحدود ہو گی اور زمین پر پڑنے والا توانائی کا دھارا بھی لامحدود ہو گا۔

شکل 2.2

جب ستاروں کے محدود حجم کو زیر غور لایا جاتا ہے تو صورتِ حال قدرے بہتر ہو جاتی ہے، کوئی ستارہ زمین سے جتنا دور ہوتا ہے اس کی ظاہری جسمات اتنی ہی کم ہو جاتی ہے، اگر دو ستارے ایک سیدھ میں واقع ہوں تو دور والا ستارہ نزدیکی ستارے کے پیچھے چھپ سکتا ہے، کائنات کے لا محدود ہونے کی صورت میں یہ وقوع لا محدود مرتبہ ہو گا، اسے پیش نظر رکھا جائے تو پیچھے کئے گئے حساب کتاب میں تبدیلی لانا پڑتی ہے، اس صورت میں بھی زمین پر آنے والی روشنی لا محدود تو نہیں لیکن بہت زیادہ ہو گی، یہ روشنی اتنی ہو گی جتنی زمین پر سورج سے دس لاکھ میل دور ہونے کی صورت میں پڑے گی، لیکن یہ صورت بھی کچھ زیادہ آرام دہ نہیں، اس پر بھی زمین شدتِ حرارت سے فوراً بخارات میں بدل جائے گی۔

یہ نتیجہ کہ ایک لا محدود کائنات ایک کائناتی بھٹی کی صورت ہو گی دراصل اسی حر حرکیاتی مسئلہ کو دوسرے الفاظ میں بیان کرنا ہے جس پر پہلے بحث ہو چکی ہے، ستارے خلاء میں حرارت اور روشنی انڈیتے ہیں جو رفتہ رفتہ خالی جگہ میں جمع ہوتی جاتی ہے، اگر ستارے سدا سے روشن ہیں تو اس سے براہ راست نتیجہ نکلتا ہے کہ اشاعی تو انائی کی شدت کو لا محدود ہونا چاہیے، لیکن کچھ تو انائی کو خلاء میں سفر کے دوران دوسرے ستارے دوبارہ جذب کر لیں گے، (یہ مفروضہ ایسا ہی ہے جیسے یہ ماننا کہ ایک ہی سیدھ میں موجود دو ستاروں میں سے ایک دوسرے کو نظر سے او جھل کر دیتا ہے) چنانچہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شاععون کی شدت بڑھتی ہے حتیٰ کہ وہ مرحلہ آ جاتا ہے جب خارج اور جذب ہونے والی شاععون کے درمیان حالتِ توازن قائم ہو جاتی ہے، لیکن یہ حر حرکیاتی توازن تب قائم ہو گا جب فضاء میں موجود شاععون کا درجہ حرارت ستاروں کی سطح کے درجہ حرارت کے برابر ہو جائے گا، چنانچہ کائنات کے لا محدود ہونے کی صورت میں یہ ایسی اشاععون سے بھری ہو گی جن کا درجہ حرارت کئی ہزار ڈگری ہو گا اور آسمان بھی بجائے تاریک نظر آنے کے ان شاععون سے دہلتا نظر آئے گا۔

ہیزیرج اولبرز نے اپنے پیش کردہ قضیے کا حل بھی خود ہی پیش کیا، اس نے دیکھا کہ کائنات میں گرد کی بہت بڑی مقدار موجود ہے اور تجویز کیا کہ شاععون کی زیادہ تر مقدار یہ مادہ جذب کر لیتا ہے اور اس لیے آسمان تاریک نظر آتا ہے، لیکن بد قسمتی سے بلندی تخلی کی حامل ہونے کے باوجود یہ وضاحت بنیادی طور پر تناقض ہے، کیونکہ تو انائی کی شعاعیں جذب کرتے کرتے یہ گرد اسی شدت سے دہلنے لگے گی جس شدت سے وہ شاععون کو جذب کر رہی ہے۔

ایک اور ممکنہ حل یہ ہے کہ کائنات کے لا محدود ہونے کا مفروضہ ترک کر دیا جائے، فرض کریں ستاروں کی تعداد بہت زیادہ ہے جسے ایک لا محدود فضائے بسیط گھیرے ہوئے ہے، اب ستاروں کی زیادہ تر روشنی کائنات سے باہر جا کر گم ہو رہی ہے، لیکن اس حل میں بھی ایک مہلک تناقض موجود ہے، ایک ایسا تناقض جس سے آئزک نیوٹن ستر ہویں صدی میں واقف تھا،

اس تناقض کا تعلق کشش ثقل کی مہیت سے ہے، ہر ستارہ ہر دوسرے ستارے پر قوتِ تجاذب لگاتا اور اسے اپنی جانب کھینچتا ہے چنانچہ ستاروں کے جمکھے پر مشتمل کائنات میں تمام ستارے اکٹھے "گریں" گے اور قوتِ تجاذب کے مرکز پر یورش کر دیں گے، چنانچہ بظاہر ایسا لگتا تھا کہ اگر کائنات کا کوئی خاص مرکز اور کنارہ بھی ہے تو اسے خود اپنے اندر گر کر ختم ہو جانا چاہیے، چنانچہ ایک محدود اور ساکن کائنات غیر مستحکم ہے اور اسے قوتِ تجاذب کے ہاتھوں مسماں ہونا ہے، تجاذب کا مسئلہ اگلے ابواب میں پھر سامنے آئے گا، سر دست اتنا جانتا ہی کافی ہو گا کہ نیوٹن نے کس خوبی سے اس مسئلے سے پہلو تہی کی کوشش کی ہے، نیوٹن نے دلیل دی کہ کائنات کے اپنے مرکزِ تجاذب کی طرف مسماں ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کا ایک مرکزِ تجاذب موجود ہو، اگر کائنات اپنی وسعت میں لا محدود ہے اور ستارے اس میں کم و بیش یکساں طور پر بکھرے ہوئے ہیں تو کائنات کا نہ مرکز ہو گا اور نہ ہی کنارہ، کسی بھی ایک ستارے کو ہر طرف سے ہمسایہ ستارے کھینچیں گے نتیجہ کے طور پر ساری قوتیں ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں گی اور ستارہ ساکن رہے گا۔

انہدام پذیر کائنات کے قضیے پر نیوٹن کا حل مان لیا جائے تو ہمارا سامنا پھر لا محدود کائنات اور اوبلرز کے قضیے (Paradox) سے ہوتا ہے، بظاہر یہی لگتا ہے کہ ہمیں کسی ایک کا سامنا لازماً کرنا ہو گا، لیکن اگر ہم رونما ہونے والے واقعات کے بعد کی فہم وادرائک یعنی پس اندیشی (Hindsight) سے کام لیں تو ان میں سے کسی ایک کو مان لینے کی مشکل سے نکل سکتے ہیں، جو مفروضہ غلط ہے وہ یہ نہیں ہے کہ کائنات مکاں (Space) میں لا محدود ہے بلکہ یہ ہے کہ کائنات زماں (Time) میں لا محدود ہے، شعلہ فشاں آسمان کا قضیہ ماہرین فلکیات کے اس مفروضے کی وجہ سے اٹھا کہ کائنات غیر متغیر ہے، لیکن اب ہم جانتے ہیں کہ دونوں مفروضے غلط ہیں، اول تو یہ کائنات ساکن نہیں ہے بلکہ پھیل رہی ہے، دوسرم یہ کہ ستارے بھی لامتناہا مدت سے جل نہیں رہے ورنہ وہ کب کے اپنا ایندھن خرچ کر کے ٹھنڈے اور بے نور ہو چکے ہوتے، یہ حقیقت ہے کہ ستارے اب بھی جل رہے ہیں اس امر پر دلالت ہے کہ کائنات ماضی میں کسی لمحہ وقت پر معرض وجود میں آئی ہو گی، اگر کائنات کی عمر لا محدود ہے تو پھر اوبلر کا قضیہ فوراً رفع ہو جانا چاہیے، کیسے؟ یہ دیکھنے کے لیے ایک دور دراز ستارے کا تصور کریں، اب چونکہ روشنی ایک خاص رفتار (تین لاکھ کلو میٹر فی سینٹ) سے سفر کرتی ہے اس لیے ہمیں ستارہ ویسا نظر آئے گا جیسا وہ روشنی کے وہاں سے روانہ ہوتے وقت تھا، آج وہاں کیسا منظر ہے ہم آج وہاں سے آنے والی روشنی کی مدد سے نہیں دیکھ سکتے، مثلاً ایک روشن ستارہ بی [بلیجیس Betelgeuse](#) ہم سے چھ سو چھاس نوری سال کے فاصلے پر ہے، چنانچہ ہمیں یہ ویسا نظر آئے گا جیسا یہ آج سے سڑھے چھ سو سال پہلے تھا، چنانچہ اگر کائنات آج سے دس کروڑ سال پہلے معرض وجود میں آئی ہو تو ہمیں زمین سے دس کروڑ نوری سال کے فاصلے سے آگے کوئی ستارہ نظر نہیں آئے گا، ہو سکتا ہے کہ کائنات مکانی

و سعت میں لامحدود ہو لیکن اگر اس کی ایک محدود عمر ہے تو ہم کسی بھی طرح سے ایک خاص فاصلے سے آگے نہیں دیکھ سکتے، چنانچہ محدود عمر کے ستاروں کی ایک لامحدود تعداد سے آنے والی مجموعی روشنی محدود ہو گی اور ممکنہ طور پر کافی کم ہو گی۔

حر حرکیاتی نقطہ نظر سے بھی ہم اسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، چونکہ خالی فضاء بہت بڑی ہے اس لیے ستاروں کو اسے شعاعوں سے بھرنے اور پھر حرارتی توازن پر لانے میں بہت لمبا عرصہ درکار ہے، کائنات کی ابتداء سے لے کر اب تک جو وقت گزرا ہے وہ اتنا نہیں ہے کہ حر حرکیاتی توازن قائم ہو سکے۔

چنانچہ تمام شواہد اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ کائنات کی عمر لامحدود نہیں بلکہ محدود ہے، ماضی میں وقت کے کسی خاص لمحے پر یہ وجود میں آئی، اگرچہ اس وقت یہ تو انائی سے بھری ہوئی اور متحرک ہے لیکن بہر حال روبہ زوال ہے اور مستقبل میں کسی لمحے اسے حرارتی موت کا شکار ہو جانا ہے، فوراً ہی بہت سے سوال جنم لیتے ہیں، خاتمه کب ہو گا؟ کس صورت میں ہو گا؟ یہ عمل آنا فانا ہو گا یا بتدریج؟ اور کیا یہ بھی قابل فہم ہے کہ حرارتی موت کے بارے میں سائنسدانوں کا موجود تصور غلط ثابت ہو جائے؟

## پہلے تین منٹ

تاریخ دانوں کی طرح ماہرین کائنات بھی ماضی کے علم کو مستقبل کی تفہیم کے لیے لازم خیال کرتے ہیں، میں نے پچھلے باب میں وضاحت کی تھی کہ حرحرکیات کے قوانین محدود عمر کی کائنات تجویز کرتے ہیں، تمام سائنسدانوں کی تقریباً متفقہ رائے ہے کہ تمام کائنات دس سے بیس بلین سال پہلے بگ بینگ سے وجود میں آئی، اور اسی واقعہ نے کائنات کو اس کے انجام کی راہ پر گامزد کر دیا، کائنات کے آغاز پر غور و فکر اور ابتدائی مرحلے میں وقوع پذیر ہونے والے عملوں پر تحقیق سے ہم اس کے مستقبل بعید کے بارے میں اہم نتائج پر پہنچ سکتے ہیں۔

یہ نظریہ کہ کائنات ہمیشہ سے موجود نہیں ہے مغربی تمدن کے اندر بہت گہری جڑیں رکھتا ہے، اگرچہ یونانی فلسفیوں نے ایک لا زوال اور ابدی کائنات کے امکانات پر بھی غور کیا لیکن تمام بڑے مغربی مذاہب میں یہ عقیدہ شامل ہے کہ خدا نے کائنات کو ماضی میں وقت کے ایک خاص لمحے پر پیدا کیا۔


کائنات کے ایک بہت بڑے دھماکے سے اچانک جنم لینے کا نظریہ وزنی ہے، اس کی سب سے زیادہ براہ راست شہادت دور دراز کی کہکشاوں سے آنے والی روشنی کی نوعیت سے ملتی ہے، نیسیولا کے ایک ماہر ویسلو سلیفر ([Vesto Slipher](#)) کے فلیگ سٹاف رصدگاہ ([United States Naval Observatory Flagstaff Station](#)) میں کئے گئے صبر آزمایشہات کے اتباع میں امریکی ماہر فلکیات ایڈون ہبل ([Edwin Hubble](#)) نے 1920 میں دیکھا کہ دور کی کہکشاوں نزدیکی کہکشاوں کے مقابلے میں قدرے زیادہ سرخ نظر آتی ہیں، ہبل نے ماونٹ ولیسن رصدگاہ ([Mount Wilson Observatory](#)) کی 100 انج کے قطر کی دور بین استعمال کرتے ہوئے اس بڑھتی ہوئی سرخی کا مشاہدہ کیا اور ایک گراف کھینچا، اس نے دریافت کیا کہ اس سارے مظہر میں ایک خاص ترتیب ہے، کوئی کہکشاں جتنی زیادہ دور ہے اتنی ہی سرخ نظر آتی ہے۔

روشنی کے رنگ کا تعلق اس کے طولِ موج سے ہے، سفید روشنی کا طیف یا سپکٹر (Spectrum) بنایا جائے تو نیلی روشنی چھوٹی طولِ موج میں ملتی ہے جبکہ سرخ روشنی لمبی طولِ موج میں ملتی ہے، دور کی کہکشاوں کا سرخ ہونا ظاہر کرتا ہے کہ ان کی روشنی کی طولِ موج کسی طرح پھیل گئی ہے، کئی کہکشاوں کے طیف کے تخصیصی خطوط کے محل و قوع کا احتیاط سے تعین کرنے کے بعد ہبل نے مندرجہ بالا اثر کی تصدیق کی، اس نے خیال پیش کیا کہ روشنی کی امواج کے پھیلاوے کی وجہ یہ ہے کہ کائنات پھیل رہی ہے، اس تاریخی اعلان کے ساتھ ہبل نے جدید کونیات (Cosmology) کی بنیاد رکھی۔

پھیلتی کائنات کی نوعیت بہت سے لوگوں کو شش و پنج میں ڈال دیتی ہے، کہہ ارض پر سے دیکھا جائے تو لگتا ہے جیسے دور دراز کی کہکشاویں ہم سے دور ہٹ رہی ہیں، تاہم اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمین کائنات کا مرکز ہے، پوری کائنات میں یہ طرز پھیلاوے اوسطاً ہر جگہ ایک جیسا ہے، ہر کہکشاں.. بلکہ کہکشاوں کا جمگٹھا کہنا زیادہ مناسب ہو گا... دوسری سے ہٹ رہی ہے، اس عمل کا تصور یوں زیادہ بہتر کیا جاسکے گا اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ کہکشاوں کے جمگٹھے کے درمیان کا خلاء پھولتا جا رہا ہے۔

یہ کہنا کہ خلاء پھیل سکتی ہے قدرے حیران کن ہو گا لیکن سائنسدان اس تصور سے 1915 سے آشنا ہیں، یعنی اس سال جب آئن سٹائن نے اپنا مجموعی نظریہ اضافیت شائع کروایا، اس نظریے کی رو سے تجاذب دراصل فضاء کے انحصار یا خمیدگی کا مظہر ہے، ایک اعتبار سے فضاء چکدار ہے اور اس کے پھیلاوے اور خمیدگی کا انحصار اس میں موجود مادے کی تجاذبی خصوصیات پر ہے، مشاہدے سے اس نظریے کی تصدیق ہوتی ہے۔

ایک سادہ تمثیل کی مدد سے مکاں (Space) کے پھیلاوے کا یہ نظریہ آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے، فرض کریں کہ ایک ریڑ کی ڈوری پر بٹنوں کی ایک قطار چسپاں ہے، اور یہ بٹن کہکشاوں کے جمگٹھوں کو ظاہر کر رہے ہیں، اب فرض کریں کہ آپ اس ڈوری کے سروں کو پکڑ کر کھینچتے ہیں، سارے بٹن ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں، آپ کسی ایک بٹن کا مشاہدہ کریں اور گرد کے بٹن اس سے دور ہٹتے نظر آئیں گے، یعنی کہ پھیلاوے ہر جگہ یکساں ہے اور کسی بٹن کو کوئی خصوصی مقام حاصل نہیں، یعنی کہ کوئی بٹن ایسا نہیں جس کے حوالے سے دوسرے بٹن ہٹ رہے ہیں، بلاشبہ بنائی گئی تصویر میں کوئی نہ کوئی بٹن مرکزی ہو سکتا ہے لیکن اس کا ڈوری کے پھیلنے کے طریقہ سے کوئی واسطہ نہیں، لیکن اگر بٹنوں سے مزین یہ ڈوری لامحدود لمبائی کی ہو یا دائرے کی صورت میں ہو تو اس طرح کے نظری شابے کی تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔



پھیلتی ہوئی کائنات کا ایک جھنی خاکہ، بُن کہکشاوں کے جمگٹھے کو اور ڈوری مکان یا خلاء کو ظاہر کرتی ہے، ڈوری کھینچنے پر بُن ایک دوسرے سے دور ہٹتے ہیں، ڈوری یعنی مکان کے کھینچنے پر اس میں سفر کرنے والی بر قی مقناطیسی شعاعوں کا طول موج بھی بڑھتا ہے، ہب نے جو سرخ تبدل دریافت کیا تھا، اسی علم کا مظہر ہے۔


شکل 3.1

کسی ایک بُن پر غور کریں، اس کا قریب ترین ہمسایہ اگلے قریب ترین ہمسائے بُن کی نسبت نصف رفتار سے زیر غور بُن سے دور ہٹے گا، کوئی بُن حوالے کے بُن سے جتنا دور ہو گا وہ اتنی ہی زیادہ رفتار سے پرے ہٹے گا، اس طرح کے پھیلاوے میں دور یا پرے ہٹنے کی رفتار درمیانی فاصلے کے ساتھ تناسب راست رکھتی ہے، یہ بہت اہم تعلق ہے، اب روشنی کی لہروں یا امواج پر غور کریں جو ایک بُن سے دوسرے کی طرف یعنی کہکشاوں کے ایک جمگٹھے سے دوسرے کی طرف سفر کر رہی ہے اور مکان وسعت پذیر ہے یعنی پھیل رہا ہے، جب مکان پھیلتا ہے تو موجودین بھی پھیلتی ہیں، اس مظہر سے کائناتی سرخ تبدل کی وضاحت ہوتی ہے، ہب نے معلوم کیا کہ سرخ تبدل کی مقدار فاصلے کے ساتھ راست تناسب ہے یعنی کہ کوئی کہکشاں کرہ ارض سے جتنی دور ہوگی اس کی روشنی میں پایا جانے والا سرخ تبدل اتنا ہی زیادہ ہو گا، یہ نتیجہ پیچے دی گئی سادہ تمثیل کے عین مطابق ہے۔

اگر کائنات پھیل رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ماضی میں اس کے اجزاء زیادہ قریب رہے ہوں گے، ہب کے مشاہدات سے شرح پھیلاوے یعنی کہ پھیلاوے کی رفتار نکالی گئی، اس شرح کی تصدیق بعد میں ہونے والے زیادہ بہتر مشاہدات سے بھی ہوتی

ہے، اگر ہم کائناتی فلم کو الٹا چلا سکیں تو تمام کہشاںیں واپس ماضی بعید میں اس نقطے کی طرف جاتیں اور باہم مخلوط ہوتی نظر آئیں گی جہاں سے یہ چلی تھیں، موجودہ شرح پھیلاؤ کے علم سے ہم حساب لگاسکتے ہیں کہ کئی کروڑوں سال پہلے یہ کہشاںیں باہم ملی ہوئی تھیں لیکن درست حساب لگانے کی راہ میں دو مشکلات حائل ہیں، ایک تو درست پیمائش لینا ہی مشکل ہے اور اس میں کئی طرح کی اغلاط ہو سکتی ہیں، اور دوسرے ابھی تک توسعی یا پھیلاؤ کی درست رفتار میں بھی اتنا عدم تیقین پایا جاتا ہے کہ یہ عموماً تسلیم شدہ قیمت سے دو گنی بھی ہو سکتی ہے، جس سے قبل ذکر اختلافات جنم لیتے ہیں، حالانکہ جدید اور طاقتور دور بینوں کی مدد سے زیر تحقیق آنے والی کہشاںوں کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے۔

دوسرم یہ کہ کائنات کے پھیلاؤ کی شرح وقت کے ساتھ مستقل نہیں رہتی ہے، شرح پھیلاؤ کے مستقل نہ ہونے کی وجہ کہشاںوں کے درمیان پائی جانے والی تجاذبی قوت ہے، یہ تجاذبی قوت کائنات میں موجود مادے اور توانائی کی تمام اقسام کے ماہین موجود ہے، قوتِ تجاذب بریکوں کی طرح عمل کرتے ہوئے اور باہر کی جانب لپکتی کہشاںوں کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہے، نتیجہ کے طور پر وقت کے ساتھ ساتھ کہشاںوں کی رفتار کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے اخذ کیا جاسکتا ہے کہ ماضی میں کائنات اب کی نسبت زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہو گئی، اگر ہم کائنات کے ایک خاص حصے کی جسامت کا وقت کے مقابل گراف کھینچیں تو ہمیں عموماً شکل نمبر 3.2 سے ملتا جلتا خط حاصل ہو گا، اس گراف سے پہنچنا ہے کہ اپنے آغاز میں کائنات بہت بچپنی ہوئی حالت میں تھی، پھر یہ بہت تیزی سے پھیلی، پھر کائنات کا جنم بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس میں مادے کی اوسمی کثافت بہت تیزی سے کم ہوئی، اگر ہم اس خط خمیدہ کو کھینچ کر پہنچے کی ابتداء یعنی صفر وقت پر لے جائیں تو دیکھا جاسکتا ہے کہ اپنے لمحہ آغاز میں کائنات کا جنم صفر اور شرح پھیلاؤ لا محدود تھا، دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کہشاںوں میں موجود گل مادہ ایک نقطے میں محدود تھا، یہ بگ بینگ نامی نظریے کا امثلی اور اصولی بیان ہے۔



کائنات کے پھیلاؤ کی شرح میں والی کم و بیش خاکہ کے مطابق ہوتی ہے، جب وقت صفر تھا تو پھیلاؤ لا محدود شرح سے ہوا تھا، یہی بگ بینگ کا لمحہ ہے۔

شکل 3.2

لیکن کیا اس خط خمیدہ کو ابتداء تک بڑھانے کا عمل درست ہے، بہت سے ماہرین کے نزدیک یہ درست ہے اگر یہ درست ہے کہ کائنات کی ایک ابتداء تھی تو پھر بگ بینگ کا ہونا بھی یقینی ہے، اور اگر ایسا ہے تو پھر اس خط خمیدہ کا آغاز محض ایک دھماکے سے کچھ زیادہ معنی رکھتا ہے، یاد رہے کہ جس پھیلاؤ کو گراف سے ظاہر کیا گیا ہے وہ خود مکاں کا پھیلاؤ ہے چنانچہ جنم کے صفر ہونے کا مطلب محض یہ نہیں کے مادے کو بھیج کر لا محدود کثافت کا حامل بنایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ مکاں کو بھیج کر لاشے (Nothing) میں بدل دیا گیا ہے، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ بگ بینگ مکاں کے ساتھ ساتھ مادے اور توانائی کا بھی نقطہ آغاز ہے، اس سارے تصور کا اہم ترین پہلو یہ ہے کہ ایسی کوئی خالی جگہ یا خلاء پہلے سے موجود نہیں تھا جس میں بگ بینگ و قوع پذیر ہوا، اس بنیادی نظریے کا وقت پر بھی اطلاق ہوتا ہے، مادے کی لا محدود کثافت اور

مکاں کا لا انتہاء کھنچاؤ بھی وقت کے آگے ایک حد لگاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ زماں اور مکاں دونوں تجاذب کے باعث کھنچتے ہیں، آئن سٹائن کے عمومی نظریہ اضافیت سے یہی نتیجہ نکلتا ہے اور تجربات سے بھی ثابت ہوتا ہے، بگ بینگ کی حالت کے مضمرات میں سے ایک زماں کا لامحدود بگاڑ ہے جس کے باعث زماں (اور مکاں) کے تصور ہی کو بگ بینگ سے پیچھے کی طرف پھیلایا نہیں جاسکتا، جس نتیجے کو قبول کرنے پر ہم مجبور ہیں وہ یہ ہے کہ بگ بینگ ہی تمام طبیعی مقداروں یعنی مکاں، زماں، مادہ اور تووانائی کا نقطہ آغاز تھا، بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، مندرجہ بالا نتائج کی روشنی میں ظاہر ہے کہ یہ سوال بے معنی ہے، اسی طرح یہ سوال بھی بے معنی ہے کہ بگ بینگ کے برپا ہونے کا سبب کون تھا یا کیا تھا، اس سے پہلے کوئی نہیں تھا، اور جہاں پر وقت نہ ہو وہاں عام فہم تسبیب کا کوئی سوال نہیں۔

اگر بگ بینگ نظریے اور اس کے کائنات کی ابتداء کے بارے میں عجیب و غریب مضمرات کی بنیاد صرف کائناتی پھیلاؤ کے شواہد پر ہوتی تو غالباً بہت سے ماہرین کائنات اسے مسترد کر دیتے، 1965 میں اس نظریے کے حق میں اہم اضافی شہادت ملی جو یہ تھی کہ تمام کائنات حرارتی شاعروں سے بھری ہوئی ہے، ہم پر یہ حرارتی شاعریں خلاء میں سے ہر طرف سے یکساں شدت کے ساتھ پڑتی ہیں، یہ شاعریں کائنات کی ابتداء کے ذرا بعد سے اب تک بلا رکاوٹ مسلسل جاری و ساری ہیں، چنانچہ یہ ابتدائی کائنات کی حالت کی ایک تصویر فراہم کرتی ہیں، اس حرارتی اشاعر کا طیف اس بھٹی کی تابانی کے طیف جیسا ہے جو حر کیا تی توازن حاصل کر چکی ہے، اس بھٹی کی شاعروں کو طبیعت دان سیاہ جسم کی شاعریں کہتے ہیں، اس سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ابتدائی حالت میں کائنات حر کیا تی توازن میں تھی یعنی کہ اس کے تمام حصوں کا درجہ حرارت یکساں تھا۔

ان پس منظری حرارتی شاعروں کی پیمائش سے پہنچتے چلتا ہے کہ ان کا درجہ حرارت منفی 270 ڈگری سینٹی گریڈ سے تین درجے اوپر ہے، لیکن درجہ حرارت کی یہ تبدیلی وقت کے ساتھ ساتھ بہت آہستہ آہستہ ہوئی، یہ شاعریں شروع میں ظاہر ہے بہت گرم تھیں اور ان کی طول موج بہت چھوٹی تھی، کائنات کے پھیلاؤ کے ساتھ یہ بھی ایک سادہ سے فارمولے کے مطابق ٹھنڈی ہوتی گئیں، کائنات کا نصف قطر دو گنا ہوا تو درجہ حرارت آدھا رہ گیا، ٹھنڈا ہونے کا یہ عمل بھی سرخ تبدل جیسا ہے، حرارتی شاعریں اور روشنی دونوں برقی مقناطیسی شاعریں ہیں اور اسی وجہ سے حرارتی شاعروں کا طول موج بھی کائنات کے پھیلنے سے پھیل جاتا ہے، کم درجہ حرارت کی شاعروں کا طول موج اونچے درجہ حرارت کی شاعروں سے زیادہ ہوتا ہے، ایک مرتبہ پھر جب ہم ماضی کی طرف بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کائنات ابتداء میں یقیناً بہت گرم رہی ہو گی، یہ حرارتی شاعریں بگ بینگ ہونے کے کوئی چار لاکھ سال بعد کی ہیں جب کائنات کا درجہ حرارت کوئی 4000 سینٹی گریڈ رہ گیا ہو گا، اس سے

پہلے اولین گیس جو زیادہ تر ہائیڈروجن پر مشتمل تھی آئنی پلازما (ionized plasma) کی شکل میں تھی اور اس وجہ سے اس میں سے برقی مقناطیسی شعاعیں نہیں گزر سکتی تھیں، درجہ حرارت کم ہونے کے ساتھ ساتھ آئنی پلازما غیر آئنی عام ہائیڈروجن گیس کی شکل اختیار کر گیا جو شفاف ہے، اس نے حرارتی شعاعوں کو اپنے اندر سے گزر جانے دیا۔

پس منظری شعاعوں کی وجہ امتیاز صرف یہی نہیں کہ اس کا طیف سیاہ جسم کے طیف جیسا ہے بلکہ یہ بھی ہے کہ آسمان میں ہر طرف ان کی شدت انتہائی یکساں ہے، آسمان کی مختلف سمتیوں سے آنے والی شعاعوں کے درجہ حرارت میں بھی صرف ایک درجے کے لاکھوں حصے کا فرق ہے، یہ ہمواری اور یکسانیت ظاہر کرتی ہے کہ بڑے پیمانے پر کائنات کافی زیادہ متجالس Homogeneous ہے کیونکہ اگر کائنات کے کسی خاص حصے یا کسی خاص سمت میں مادہ مقابلتاً زیادہ مجتمع ہوتا تو درجہ حرارت کے تغیر سے اس کا اظہار ہوتا، دوسری طرف ہم جانتے ہیں کہ کائنات مکمل طور پر یکساں نہیں ہے، مادہ کہکشاوں میں مجتمع ہے اور آگے کہکشاوں کے جمگٹھے ہیں اور پھر یہ جمگٹھے مل کر بڑے جمگٹھے بناتے ہیں، اگر لاکھوں نوری سالوں کے پیمانے پر دیکھا جائے تو کائنات کی ساخت جھاگ سی لگتی ہے، کہکشاوں سے بنی ہوئی جھلیاں اور تار بسیط خلاوں کو گھیرے ہوئے ہیں۔

ابتداء میں کائنات مادے کی تقسیم کے حوالے سے خاصی یکساں تھی، بڑے پیمانے پر مادے کا بے ڈھنگے طور پر مجتمع ہونے کا عمل بعد میں ہوا ہو گا، اگرچہ بہت سے طبیعی عوامل اس کے ذمہ دار رہے ہوں گے لیکن سب سے قابل قبول وضاحت ست تجاذبی قوتِ کشش ہے، اگر بگ پینگ کا نظریہ درست ہے تو مادے کے اس بے ڈھنگے طور پر مجتمع ہونے کے عمل کی شہادت پس منظری شعاعوں پر مرتب اثرات سے بھی ملنی چاہیے، 1992 میں ناسا کے ایک مصنوعی سیارے کو بے COBE Cosmic Background Explorer نے اکشاف کیا کہ پس منظری شعاعیں شدت میں یکساں نہیں بلکہ آسمان کی مختلف سمتیوں سے آنے والی شعاعوں کی شدت میں خفیف سی کمی بیشی ہے، لگتا ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی بے قاعدگیاں عظیم جمگٹھوں کے وجود میں آنے کے عمل کی نشانیاں ہیں، پس منظری شعاعوں نے آخر میں کائنات کے ابتدائی ادوار میں جمگٹھے بننے کے عمل کے نشانات کو من و عن محفوظ کر رکھا ہے، ان نشانات سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات ہمیشہ سے ایسی نہ تھی جیسا کہ آج ہم اسے دیکھتے ہیں، مادے کے کہکشاوں اور ستاروں میں مجتمع ہونے کا طویل ارتقائی عمل ایک ایسی کائنات میں شروع ہوا تھا جو تقریباً پوری طرح یکساں کثافت کی حامل تھی۔

ایک آخری شہادت اور بھی ہے جو کائنات کی گرم اور کثیف ابتداء کی تصدیق کرتی ہے، حرارتی شعاعوں کے آج کے معلوم درجہ حرارت سے حساب لگایا جائے تو آسمانی سے پتہ چل جاتا ہے کہ آغاز سے تقریباً ایک سینٹر کے بعد کائنات کا درجہ

حرارت دس کروڑ ڈگری سینٹی گریڈ ہو گا، یہ درجہ حرارت اتنا زیادہ ہے کہ ایمپوں کے نیوکلیئس بھی اپنی اس مجتمع حالت میں موجود نہیں رہ سکتے، اس وقت مادہ یقیناً سب سے بنیادی ذرات یعنی پروٹان، نیوٹران اور الیکٹران کی شکل میں موجود ہو گا، درجہ حرارت کچھ کم ہوا تو نیوکلیائی تعاملات ممکن ہوئے، خصوصاً اب نیوٹران اور پروٹان باہم مل سکتے تھے اور پھر یہ جوڑے باہم مل کر ہیلیم کے نیوکلیئس بن سکتے تھے، حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ نیوکلیائی سرگرمی تقریباً تین منٹ تک برقرار رہی (سینیون وائیں برگ Steven Weinberg) کی کتاب کا نام بھی ”پہلے تین منٹ“ تھا اس دوران موجود مادے کا ایک چوتھائی ہیلیم کے نیوکلیئس کی شکل اختیار کر گیا، جو پروٹان اس طرح جڑنے سے بچ گئے وہ ہائیڈروجن کے نیوکلیئس بن گئے، اس لیے اس نظریے کی رو سے کائنات کو 75 فیصد ہائیڈروجن اور 25 فیصد ہیلیم پر مشتمل ہونا چاہیے، یہ اعداد و شمار کائنات میں پائی جانے والی ان عناصر کی مقادیر پر جدید ترین تحقیق کے ساتھ کافی حد تک مطابقت رکھتے ہیں۔

ابتداء میں ہونے والے نیوکلیائی تعاملات سے ڈیوٹریم، ہیلیم-3 اور لیتھیم بھی بہت تھوڑی مقدار میں پیدا ہوئے، تاہم بھاری عناصر جو کائنات کے گل مادے کے ایک فیصد سے بھی کم ہیں، بگ بینگ میں پیدا نہیں ہوئے تھے، یہ عناصر بعد ازاں ستاروں سے پیدا ہوئے، ان کی پیدائش پر چوتھے باب میں بحث کی جائے گی۔

چنانچہ کائنات کا پھیلاوہ، کائناتی پس منظری شعاعیں اور کیمیائی عناصر کی باہمی نسبت بگ بینگ کی تصدیقی شہادتیں ہیں، تاہم بہت سے سوال ایسے بھی ہیں جن کے جوابات نہیں دیے جاسکے، کائنات کے پھیلاوہ کی شرح یہی کیوں ہے یا دوسرے الفاظ میں بگ بینگ اتنا بڑا کیوں تھا؟ کائنات اپنی ابتداء میں اتنی یکساں کیوں تھی اور اس کے پھیلاوہ کی شرح تمام اطراف اور مکان کے تمام خطوط میں ایک سی کیوں تھی؟ COBE نے پس منظری شعاعوں کی شدت میں جو تغیر ڈھونڈا ہے اس کا مانخدہ کیا ہے؟ یہ سوال بہت اہم ہے کیونکہ ان تغیرات کا کہکشاوں اور ان کے جمگٹھوں کی تشکیل سے گہرا تعلق ہے۔

حالیہ چند سالوں میں ان گہرائی کے حامل مسائل کے حل کے لیے بگ بینگ نظریات اور اوپھی تو انائی کی ذراتی طبیعتی (High Energy Particle Physics) کے جدید نظریات کے ارتباٹ کی ہیر و وانہ کوششیں کی گئی ہیں، مجھے زور دینا پڑتا ہے کہ یہ نئی کا سمیولوچی یا کائنات کی سائنس کی بنیاد پچھے زیر بحث نظریات کے مقابلے میں کم مستحکم سائنسی بنیادوں پر استوار ہے، اس ضمن میں خصوصی دلچسپی کا مرکز وہ تعاملات ہیں جو ایسی پارٹیکل تو انائیوں سے متعلق ہیں جو براہ راست مشاہدے میں آنے والی تو انائیوں سے بہت زیادہ ہیں، دلچسپی کا دوسرا مرکز وہ کائناتی دور ہے جس میں مذکورہ بالا عوامل کائنات کی پیدائش کے فوراً بعد بہت تھوڑے عرصے کے لیے ظہور پذیر ہوئے، اس وقت حالات اتنے شدید تھے کہ ان کی تحقیق کے لیے سردست


واحد طریقہ صرف ریاضیاتی ماؤنگ ہے جو تمام کی نظریات پر مبنی ہے۔

نئے علم کائنات سے اخذ شدہ نتائج میں سے ایک کو پھلاو کہتے ہیں، پھلاو کا مرکزی خیال یہ ہے کہ ایک سینکڑ کے پہلے کسی حصے میں کائنات کا جم اچانک ایک چھلانگ کی صورت میں بڑھا یعنی کئی گنا پھول گیا، اس سے جو نتیجہ نکلا ہے اسے شکل 3.2 کی مدد سے دکھایا گیا ہے، خط خمیدہ ہمیشہ نیچے کی جانب جھلتا ہے جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب مکاں کا کوئی ایک حصہ جم میں بڑھتا ہے تو ایسا ایک کم ہوتی ہوئی شرح سے ہوتا ہے، اس صورت حال کو شکل 3.3 میں دکھایا گیا ہے، ابتداء میں جم میں اضافہ سے رفتاری سے ہوتا ہے، لیکن پھر پھلاو کے مرحلے کا آغاز ہوتا ہے تو جم میں اضافے کی رفتار تیزی پہنچتی ہے اور خمیدہ خط بہت تھوڑے وقت میں اوپر جا پہنچتا ہے، پھر دوبارہ خط خمیدہ اپنے معمول کے رجحان پر لوٹ آتا ہے، لیکن اس اثناء میں فضاء کا جم بہت زیادہ بڑھ چکا ہوتا ہے، جم میں یہ اضافہ شکل 3.2 میں دکھائے گئے اضافے کی نسبت بہت زیادہ ہے۔

کائنات میں اس غیر معمولی انداز میں پھلاو کیوں ہوتا ہے؟ یہاں خیال رکھا جانا چاہیے کہ شکل 3.2 میں خمیدہ خط کا نیچے کی طرف جھکاؤ بلا وجہ نہیں ہے، ہوتا یہ ہے کہ جب پھلاو شروع ہوتا ہے تو تجاذب کی قوت اس میں رکاوٹ بنتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھلاو کی رفتار یا شرح پھلاو کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس تناظر میں دیکھا جائے تو شکل 3.3 کے خمیدہ خط کا ایک ہی مطلب ہو سکتا ہے کہ جوں ہی پھلاو شروع ہو تجاذب کی جگہ ضد تجاذب یا اینٹی کریوٹی (Anti Gravity) بروئے کار آئی ہے اور کائنات کے پھلاو کی رفتار تیز سے تیز ہوتی چلی گئی، اگرچہ ضد تجاذب یا اینٹی گریوٹی ایک امکانی قیاس آرائی ہے لیکن کچھ مفروضہ جاتی نظریات سے نتیجہ نکلتا ہے کہ کائنات کے اوپر مراحل میں درجہ حرارت اور کثافت کی جو انتہائی حالتیں درپیش تھیں ان میں اس وقت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جاسکتا۔

پچھلے صفحات میں بگ بینگ کے نظریے پر کچھ اعتراض لگائے گئے تھے، پھلاو کا مذکورہ بالا نظریہ ان اعتراضات کے تسلی بخش جواب فراہم کرتا ہے، ہر لمحہ بڑھتی ہوئی شرح پھلاو اس اعتراض کا جواب ہے کہ بگ بینگ اتنا بڑا کیوں تھا، ضد تجاذب اثر متوازن نہیں ہوتا جس کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کا جم (Exponentially) بڑھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وقت کے ایک خاص وقٹے میں کائنات کا جسم دو گنا ہو گیا، اگلے اس وقٹے میں کائنات کا جم پھر دو گنا ہو گیا، اگر ہم اس وقٹے کو ٹک کا نام دے لیں تو ڈٹک کے بعد جم چار گنا، تین ٹک کے بعد آٹھ گنا، اور دس ٹک کے بعد ہزار گنا ہو چکا ہوتا ہے، پھلاو کا نظریہ اختیار کیا جائے تو جو ریاضیاتی قیمت آج کل کی شرح پھلاو کے لیے حاصل ہوتی ہے وہ مشاہداتی طور پر حاصل شدہ رفتار سے

مطابقت رکھتی ہے، باب 6 میں زیادہ صحیح طور پر واضح کیا جائے گا کہ میرا اس سے کیا مطلب ہے۔



پھولنے کا منظر، کائنات اپنے آغاز کے کچھ وقت کے بعد اچانک پھلاو کے عمل سے گزری جو بہت تھوڑی دیر جاری رہا، عمودی محور بہت چھوٹا کر کے دکھایا گیا ہے، پھلاو کا مرحلہ گزر جانے پر کائناتی پھلاو کی شرح بہت کم ہو جاتی ہے۔

شکل 3.3

کائنات میں کثافت کی یکسانیت پائی جاتی ہے، اس کی وضاحت جنم میں پھلاو سے ہونے والے اچانک اور بہت زیادہ اضافہ سے ہو جاتی ہے، اگر ابتدائی مرحلوں میں کچھ بے قاعدگیاں موجود بھی رہی ہوں گی تو بعد ازاں فضاء کے پھلاو سے یہ دور ہو گئیں، اسی طرح جیسے پھیلانے سے غبارے کی شکنیں دور ہو جاتی ہیں، اس طرح اگر ابتداء میں مختلف سمتوں میں پھلاو مختلف شرح سے ہوا تھا تو پھلاو سے اس کے نتائج بھی ہموار ہو گئے کیونکہ یہ تمام سمتوں میں ایک سی قوت سے وقوع پذیر ہوتا ہے، جہاں تک COBE کی مدد سے دریافت ہونے والے تغیرات Variations کا تعلق ہے تو اس کی وجہ یہ ہو سکتی

ہے کہ پھلاو کائنات کے تمام حصوں میں ایک ہی وقت میں ختم نہ ہوا ہو (اس کی وضاحت آگے آئے گی) چنانچہ کچھ حصے دوسروں سے آگے نکل گئے اور نتیجہ کے طور پر کثافت میں کچھ تغیرات Variations آگئے ہوں۔

آئیے اس بحث میں کچھ اعداد شامل کرتے ہیں، پھلاو کا نظریہ اپنی سادہ ترین شکل میں بیان کرتا ہے کہ پھلاو میں کار فرما قوت یعنی کہ ضد تجاذب یا ایٹمی گریوٹی ایک بہت طاقتور قوت ہے جس نے کائنات کے جنم کو ہر  $^{34}10$  یعنی:

$$\frac{1}{100,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000}$$

سینڈ کے بعد دو گنا کر دیا، اس بہت چھوٹے وقت کو میں نے پیچھے تک کا نام دیا تھا، ایک سو ٹک کے بعد ہی ایک نیو گلیس کے سائز کا علاقہ پھیل کر ایک نوری سال کی جسمت کا ہو گیا ہو گا، اس حساب سے اوپر اٹھائے گئے سوالات میں سے آخری کا جواب مل جاتا ہے۔

زیر ایٹمی ذرات کی طبیعت (Sub-Atomic Particles) کے نظریات کی مدد سے مذکورہ بالا پھلاو میں کار فرمائی مکانیزم میکانیات یعنی طریقہ کار سامنے آتے ہیں، یہ تمام میکنزم ایک ہی تصور سے استفادہ کرتے ہیں جسے قدری خلاء یا کوانٹم ویکیوم (Quantum Vacuum) کہتے ہیں، قدری میکانیات (Quantum Theory) کا آغاز بر قی مقناطیسی موجودوں کی ماہیت کے ایک نظریے کے طور پر ہوا تھا، اگر یہ شعاعیں مکاں میں موجود کی طرح سفر کرتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ ایسے رویے کا اظہار بھی کر سکتی ہیں جیسے کہ وہ ذرات پر مشتمل ہوں، خصوصاً روشنی کا اخراج اور انجداب تو انہی کے چھوٹے چھوٹے پیکٹوں یا کوانٹا (Quanta) کی شکل میں ہوتا ہے جنہیں فوٹون (Photon) کہتے ہیں، موچی اور ذراتی پہلو کے اس آمیزے کو بعض اوقات موچی اور ذراتی دوئی بھی کہتے ہیں، اس نظریے کا ایٹم اور ایٹم سے چھوٹے (Sub-Atomic) ذرات کی سطح پر تمام طبیعی مقادیر پر اطلاق ہونا ثابت ہے، چنانچہ ایسی تمام مقادیر جنہیں عام طور پر ذرات سمجھا جاتا ہے، جیسے الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران بمع پورے ایٹموں کے خاص حالت میں موجود کی طرح کے رویے کا اظہار کرتے ہیں۔

قدری میکانیات کا ایک مرکزی اصول ہیزن برگ (Werner Heisenberg) کا اصول عدم تیقین (Uncertainty Principle) ہے جس کے مطابق قدرتی اجسام کے خصائص کی مقداریں قطعیت سے متعین نہیں ہوتیں، مثال کے طور پر ایک الیکٹران کسی ایک وقت میں مقام اور مقدارِ حرکت یا مومنیم کا یکساں قطعیت کے ساتھ حامل نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وقت کے کسی خاص لمحے پر اس الیکٹران کے ساتھ تو انہی کی کوئی خاص مقدار مخصوص کی جاسکتی ہے، یہاں ہمارا سروکار

توانائی کے عدم تيقن سے ہے، جبکہ انجنئری خور دینی میں یعنی کہ ایم اور مالی کیوں سے بڑی مقادیر کی دنیا تو وہاں بقائے تو انائی کا قانون (یعنی کہ تو انائی نہ پیدا کی جاسکتی ہے اور ہی فنا) کار فرمایا ہے، لیکن جہاں کو انٹم تو انیں کی دنیا شروع ہوتی ہے وہاں قانون بقائے تو انائی منسخ ہو جاتا ہے، تو انائی لمحہ بہ لمحہ تبدیل ہوتی ہے، یہ تبدیلی اچانک ہوتی ہے اور اس کے وقوع پذیر ہونے یا نہ ہونے کے متعلق سو فیصد تيقن سے کوئی پیش گوئی نہیں کی جاسکتی، مشاہدے کا وقفہ جتنا چھوٹا ہو گا یہ بے قاعدہ تغیرات (Fluctuations) اتنے ہی بڑے ہوں گے، دراصل یہ ذرات تو انائی ادھار لے سکتے ہیں لیکن صرف اس وقت جب وہ اسے فوراً ہی لوٹا دیں، ہیزن برگ کے اصول عدم تيقن کی ریاضیات بتاتی ہے کہ ادھار لی گئی تو انائی جتنی زیادہ ہو گی اسے اتنی ہی جلدی لوٹانا ہو گا، تو انائی کے کم ہونے کے ساتھ ساتھ لوٹائے جانے کی مہلت کا وقفہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔

تو انائی کا عدم تيقین کچھ دلچسب نتائج سامنے لاتا ہے، ان نتائج میں ایک دلچسب نتیجہ یہ بھی ہے کہ فوٹون جیسے ذرات عدم (Nothing) سے وجود میں آسکتے ہیں لیکن انہیں فوراً ہی دوبارہ معروف ہو جانا چاہیے، یہ ذرات ادھار کی تو انائی پر وجود میں آتے اور خواہ کتنے ہی کم عرصے کے لیے موجود رہتے ہیں ہم انہیں دیکھنے نہیں سکتے کیونکہ وہ بہت کم عرصے کے لیے وجود میں آتے ہیں، لیکن جسے ہم عام طور پر ہر چیز سے خالی خلاء خیال کرتے ہیں وہ اس طرح کے ذرات سے لبالب بھرا ہوتا ہے، اس میں نہ صرف فوٹان بلکہ الیکٹران، پروٹان بلکہ ہر چیز موجود ہوتی ہے، ان عارضی ذرات کو ہمارے شناسا عام اور مستقل ذرات سے متیز کرنے کے لیے اول الذکر کو مجازی (Virtual) اور ثانی الذکر کو حقیقی یا (Real) کے نام سے یاد کرتے ہیں۔

اپنے عارضی ہونے سے قطع نظر یہ مجازی ذرات باقی ہر طرح سے حقیقی ذرات جیسے ہوتے ہیں، درحقیقت اگر کسی طریقے سے ان ذرات کو نظام کے باہر سے ہیزن برگ تو انائی کے قرض کے برابر تو انائی فراہم کی جاسکے تو ان ذرات کا حقیقی بن جانا ممکن ہے کیونکہ یہ ذرات باقی ہر طرح سے حقیقی ہیں، مثلاً ایک مجازی الیکٹران عام طور پر  $^{10^{-21}}$ <sup>1</sup> یعنی:

$$\frac{1}{100,000,000,000,000,000,000,0}$$

سینڈ کے لیے موجود رہتا ہے، اپنی اس مختصر زندگی میں بھی یہ الیکٹران ساکن نہیں بلکہ متحرک رہتا ہے اور  $^{10^{-11}}$  یعنی  $\frac{1}{100,000,000,000}$  سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے، اس فاصلے کا تقابل اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ ایک ایم کا جنم  $^{10^{-8}}$  سینٹی میٹر ہوتا ہے، اگر اس الیکٹران کو اس مختصر عرصے میں سے کہیں سے، مثلاً ایک برقی مقناطیسی میدان سے

تو انائی مل جائے تو یہ غائب نہیں ہوتا بلکہ ممکن ہے کہ موجود رہے اور ایک حقیقی الیکٹران بن جائے، ہر چند کہ ہم ان ذرات کو دیکھ نہیں سکتے لیکن یہ اپنی جگہ یعنی خلاء میں موجود ہوتے ہیں، ہمارے یقین کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنی موجودگی کے ایسے آثار چھوڑتے ہیں جن کا سراغ لگایا جاسکتا ہے، مثلاً ایک مجازی Virtual فوٹون کا ایک اثر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ ایٹم کی حالت میں خفیف سی تبدیلی کر دے جس کا سراغ لگایا جاسکتا ہے، اس کے علاوہ ایٹم میں موجود الیکٹرانوں کے مقناطیسی حرکت میں بھی خفیف سی تبدیلی کرتے ہیں، سپیکٹرو سکوپی (Spectroscopy) کا طریقہ استعمال کر کے ان خفیف لیکن اہم تبدیلیوں کی نہایت صحت سے پیمائش کی جا سکتی ہے۔

جب ہم اس امر کو مدِ نظر رکھتے ہیں کہ تحت ایٹمی ذرات (Sub-Atomic Particles) اپنے طور پر حرکت نہیں کرتے بلکہ کئی طرح کی قوتوں کے زیر اثر ہوتے ہیں تو قدری خلاء (Quantum Vacuum) کی مندرجہ بالا سادہ تصویر میں تبدیلیاں کرنی پڑتی ہیں، مختلف ذرات پر مختلف قوتیں اثر انداز ہوتی ہیں، یہ مماثل Corresponding قوتیں غیر حقیقی ذرات کے درمیان بھی کار فرما ہوتی ہیں، چنانچہ یہ بھی عین ممکن ہے کہ ایک سے زیادہ اقسام کی خلائی حالتیں Vacuum موجود ہوں، کئی ممکنہ "قدری حالتیں" قدری طبیعت میں عام اور جانی پہچانی حقیقت ہے، اس کی سب سے عام مثال یہ ہے کہ ایٹم کی کئی تو انائی کی حالتیں (States) ہوتی ہیں، نیو کلینس کے گرد گردش کرتا ہوا الیکٹران مخصوص طے شدہ مداروں یا حالتوں میں گردش کرتا ہے جن میں سے ہر ایک کے ساتھ تو انائی کی مخصوص مقدار وابستہ ہوتی ہے، سب سے نچلے مدار کو زیریں صورت Ground State کہتے ہیں، یہ مستحکم ہوتا ہے، اس سے بلند مدارج برائیگختہ یا مشتعل حالتیں ہوتی ہیں، اور غیر مستحکم ہوتی ہیں، اگر ایک الیکٹران کسی بلند حالت میں چلا جائے تو وہ ایک سے زیادہ مراحل میں اپنی نچلی مستحکم حالت Ground Level پر اتر آتا ہے، ایٹم کی برائیگختہ حالت کی ایک خاص نصف زندگی Half Life ہوتی ہے جسے خاصی صحت کے ساتھ معلوم کیا جاسکتا ہے۔

خلاء پر بھی اسی اصول کا اطلاق ہوتا ہے، اس کی بھی ایک یا ایک سے زیادہ برائیگختہ حالتیں ہوتی ہیں، ان حالتوں سے وابستہ تو انائیوں میں خاصاً فرق ہوتا ہے، یہ اور بات ہے کہ تمام حالتوں میں خلاء ایک سی یعنی خالی ہوتی ہے، کم ترین تو انائی یا Ground Level کو بعض اوقات حقیقی خلاء بھی کہتے ہیں، یہ نام اس حقیقت کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ حالت خلاء کے ان حصوں سے وابستہ ہے جو آج خالی نظر آتے ہیں، جبکہ ایک برائیگختہ خلاء کو باطل خلاء کا نام دیا جاتا ہے۔

اس امر پر زور دیا جانا مطلوب ہے کہ باطل خلاء خالصتاً نظریاتی تصور ہے، ان کے خصائص کیا ہیں؟ اس کا اختصار بہت حد تک

اس امر پر ہے کہ کوئی نظریہ بروئے کار لایا جا رہا ہے، فطرت کی چار بنیادی قوتوں یعنی تجاذب، برقی مقناطیس، کمزور قوت و Weak Forces اور طاقتور قوتوں Strong Forces کے اتحاد کے لیے جو جدید نظریے استعمال کیے جا رہے ہیں ان سے باطل خلاء کا تصور خود بخود سامنے آتا ہے، فطرت کی قوتوں کی فہرست طویل ہوا کرتی تھی، کبھی برقی اور مقناطیسی قوتوں کو علیحدہ علیحدہ خیال اور شمار کیا جاتا تھا 19 ویں صدی کے اوائل میں ان کے اتحاد کا عمل شروع ہوا اور حالیہ دہائیوں میں کافی اوپر چلا گیا ہے، اب یہ ہمارے علم میں ہے کہ برقی مقناطیسی اور کمزور قوتیں باہم مربوط ہیں اور ایک ہی قوت کی صورتیں ہیں جسے "الیکٹرودیک" قوت کہتے ہیں، بہت سے طبیعت دنوں کا خیال ہے کہ بالآخر مضبوط قوت اور الیکٹرودیک قوت کا باہم مربوط ہونا بھی ثابت ہو جائے گا، یہ ربط ان مساواتوں میں کسی نہ کسی صورت میں بیان ہو چکا ہے جنہیں عظیم وحدتی نظریات کہتے ہیں، عین ممکن ہے کہ کسی بہت گہری سطح پر چاروں قوتیں کسی ایک عظیم قوت میں ختم یا متعدد ہو جاتی ہوں۔

مختلف عظیم وحدتی نظریات (Grand Unified Theories) میں پھلاو کے ممکنہ طرز کار کے لیے خاصے قابلِ اعتناء نظریات کو آگے بڑھایا جا رہا ہے، ان نظریات کی بنیادی خصوصیات میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے مطابق باطل خلاء کی تو انائی حیرت انگیز طور پر زیادہ ہے یعنی کہ<sup>87</sup> 10 جول ہے، حتیٰ کہ خلاء اگر ایک ایٹم کی جسامت کا بھی ہے تو اس کی تو انائی کا بھی<sup>62</sup> 10 جول ہے، اس تو انائی کا مقابلہ ایک برابریختہ ایٹم میں موجود تو انائی سے کریں جو صرف<sup>18</sup> 10 جول جیسی حیرت مقدار ہے، چنانچہ اگر ہمیں ایک حقیقی خلاء کو برابریختہ کرنا ہے تو اس کے لیے تو انائی کی بہت بڑی مقدار درکار ہو گی اور اسی وجہ سے کائنات میں آج ہمارا کسی باطل خلاء سے واسطہ پڑنے کا کوئی امکان نہیں، لیکن اگر ہم بگ بینگ کے وقت کی انہتائی حالتوں کو پیش نظر رکھیں تو تو انائی کی ایسی مقداریں بعید از قیاس نہیں۔

ان باطل خلائی حالتوں کے ساتھ وابستہ بہت بڑی تو انائی کے طاقتور تجاذبی اثرات ہیں، جیسا کہ آئندہ سالوں کے کام سے ثابت ہوتا ہے، تو انائی کی بھی کمیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ تجاذبی کشش لگاتی ہے، ایسے ہی جیسے عام مادہ لگاتا ہے، قدری خلاء میں موجود تو انائی بہت بڑی تجاذبی قوت لگاتی ہے، ایک سینٹی میٹر باطل خلاء میں جتنی تو انائی ہے اس کا وزن<sup>67</sup> 10 ٹن ہو گا، اور یہ وزن آج کی تمام قابل مشاہدہ کائنات سے بھی زیادہ ہے جس کا وزن تقریباً<sup>50</sup> 10 ٹن ہے، لیکن اتنی زیادہ قوت تجاذب پھلاو پیدا کرنے میں کوئی معاونت نہیں کر سکتی، کیونکہ اس کے لیے تو ضد تجاذب کی ضرورت ہے، تاہم باطل خلاء کی یہ عظیم تو انائی اتنے ہی بڑے باطل خلائی دباؤ سے بھی وابستہ ہے، اور یہی وہ دباؤ ہے جس نے پھلاو کا کارنامہ سرانجام دیا تھا، عام طور پر ہم دباؤ کو تجاذب کا ذریعہ خیال نہیں کرتے، لیکن ایسا ہے، اگرچہ دباؤ بیرونی جانب میکانی قوت لگاتا ہے لیکن

ساتھ ہی ساتھ یہ اندر کی جانب عمل کرنے والی تجاذبی کشش بھی لگاتا ہے، ہمارے جانے پہچانے اجسام میں دباؤ کا تجاذبی اثر اتنا کم ہوتا ہے کہ اسے جسم کی کمیت سے پیدا ہونے والے تجاذب کے مقابلے میں نظر انداز کیا جاسکتا ہے، مثال کے طور پر زمین پر آپ کے وزن کا ایک کروڑواں حصہ زمین کے اندر ونی دباؤ کی وجہ سے ہے، کم ہونے کے باوجود یہ اثر بہر حال حقیقی ہے، اور اگر دباؤ انہائی حالتوں کو پہنچ جاتا ہے تو اس سے جنم لینے والی تجاذبی قوت مادے کی قوتِ تجاذب کی حریف ہو سکتی ہے، باطل خلاء میں تو انائی کی بہت بڑی مقدار موجود ہوتی ہے اور دباؤ بھی مقابلتاً بہت زیادہ ہوتا ہے، دونوں کے درمیان تجاذبی غلبے کے لیے چپکش چلتی ہے، ایک اہم اور فیصلہ کن خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ دباؤ منفی ہوتا ہے، باطل خلاء دھکیتاً بالکل نہیں بلکہ اپنے اندر کھینچتا ہے، منفی دباؤ منفی تجاذبی اثر پیدا کرتا ہے، مطلب یہ کہ اس طرح ضد تجاذبی اثر پیدا ہوتا ہے، یوں باطل خلاء کے تجاذبی عمل کے پس پر دو اصول اس کی تو انائی کی قوتِ کشش اور منفی دباؤ کی بہت بڑی پرے دھکیلنے کی قوت کا حاصل ملوث ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دباؤ غالب آ جاتا ہے اور اتنی بڑی نفوری قوت (Repulsive Force) جنم لیتی ہے جو کائنات کو ایک سینڈ کے چھوٹے سے حصے میں دور تک بکھیر دیتی ہے، یہی وہ قوت ہے جو کائنات کے جم کو ہر  $10^{-34}$  سینڈ میں پہلے سے دو گنا کرتی چلی جاتی ہے۔

باطل خلاء اپنی ساخت میں غیر مستحکم (Unstable) ہوتا ہے، تمام قدری حالتوں کی طرح اس میں بھی اخبطاط پذیر ہو کر واپس اپنی زیریں ترین حالت (Ground State) یعنی صادق خلاء پر چلے جانا کا رجحان پایا جاتا ہے، اسے ایسا کرنے میں غالباً چند درجہ "مک" کا وقت لگتا ہے، جس کا ذکر پچھلے صفحات میں ہیزن برگ کے اصول عدم تیقین کے حوالے سے ہو چکا ہے، اس سے نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ کائنات کے مختلف حصوں میں باطل خلاء کا اپنی ایگزٹنٹیوٹیو حالت سے مستحکم حالت Ground State پر مختلف اوقات میں جانے کا زیادہ امکان ہے، چنانچہ تغیرات ناگزیر ہیں، بعض نظریہ سازوں کا خیال ہے کہ COBE نے جو لہریں دریافت کی ہیں ان کا منبع ہی تغیر ہے۔

جب باطل خلاء کا اخبطاط ہو چکتا ہے تو کائناتی پھلاو منفی اسراع یا کم ہوتی ہوئی شرح اختیار کر لیتا ہے، باطل خلاء میں بند تو انائی خارج ہو چکتی ہے اور حرارت کی صورت میں نمودار ہوتی ہے، پھلاو کے باعث جو اچانک کھنچاؤ مکاں میں ہوا تھا وہ درجہ حرارت کو مطلق صفر کے بہت قریب لے آتا ہے، لیکن جب پھلاو اچانک رکتا ہے تو کائنات دوبارہ گرم ہوتی ہے اور درجہ حرارت ایک بار پھر  $10^{28}$  درجہ ہو جاتا ہے، تو انائی کا یہی عظیم ذخیرہ تقریباً معدوم ہو کر آج کائناتی پس منظری حرارتی شعاعوں کی صورت میں موجود ہے، خلائی تو انائی کے اخراج کا ایک نتیجہ یہ ہے کہ قدری خلاء میں سے بہت سے غیر حقیقی

ذرات نے توانائی لی اور ان میں سے کچھ حقیقی ذرات کے درجے کو پہنچ گئے، مزید عملوں اور تبدیلیوں سے گزرنے کے بعد ابتدائے آفرینش میں جنم لینے والے یہ ذرات انسان سمیت ساری کائنات میں جلوہ گر <sup>50</sup> 10 ٹن مادے کا حصے بنے۔

اگر بچلاوہ کے اس منظر نامے کے مختلف مراحل کو ہم نے درست طور پر بیان کر لیا ہے، اور اکثر ماہرین اسے درست مانتے ہیں، تو پھر کائنات کے عام طبیعی مشمولات اور بنیادی ساخت اس کے آغاز کے بعد صرف <sup>32</sup> 10 سینٹ کے اندر اندر کامل ہو چکے تھے، بچلاوہ کے اس دور کے بعد کائنات ایسی سطح پر بہت سی تبدیلیوں سے گزرا اور بیشتر مادے نے ان ایٹموں کی شکل اختیار کر لی جنہیں آج ہم دیکھتے ہیں، لیکن یہ سب کچھ شروع ہونے کے بعد صرف پہلے تین منٹ کے اندر اندر کامل ہو گیا۔

پہلے تین منٹوں کا آخری تین منٹوں سے تعلق کس طرح بتا ہے، رائل سے چلائی گئی گولی کے انجام کا اسے چلاتے وقت لیے گئے نشانے سے جو تعلق ہوتا ہے وہی تعلق کائنات کے انجام کا اس کی ابتدائی حالتوں سے ہے، ہم دیکھیں گے کہ کائنات کا اپنے نقطہ آغاز کے بعد پہلے کا طریقہ اور جنم لینے والے مادے کی ماہیت کس طرح اس کے انجام کا تعین کرتی ہے، کائنات کے آغاز اور انجام کو ایک دوسرے سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔

## ستاروں کا انحصار

فروری 1987 میں 23 اور 24 کی درمیانی شب کینیڈا کا ایان شیلٹن (Ian Shelton) نامی ایک ماہر فلکیات چلی (Chile) میں اینڈز کی بلندی پر واقع کمپنا رصدگاہ (Las Campanas Observatory) میں کام کر رہا تھا، اس کا ایک معاون ذرا دیر کو باہر نکلا اور اس نے کاملی سے آسمان پر نگاہ ڈالی، آسمان سے اپنی شناسائی کے باعث اسے فوراً وہاں کسی تبدیلی کا احساس ہوا، اسے میگلیلنی (Large Magellanic Cloud) نامی روشنی کے نیبولائی (Nebulous) دھبے کے کنارے پر ایک ستارہ دکھائی دیا، ستارہ کوئی زیادہ روشن نہیں تھا، بس اتنا ہی جتنے اورین پٹی کے ستارے ہوتے ہیں، اس میں اہم بات یہ تھی کہ گزرشہ شب یہ اس جگہ نہیں تھا۔

معاون نے شیلٹن کی توجہ اس جسم کی طرف مبذول کرائی اور چند گھنٹوں کے اندر اندر یہ اطلاع ساری دنیا میں گشت کر رہی تھی، شیلٹن اور اس کے چلیئن معاون نے سپر نووا دریافت کیا تھا، یہ دوسرا سپر نووا تھا جسے ننگی آنکھ سے دیکھا جاسکتا تھا، اس سے قبل اس طرح کا ایک سپر نووا 1604 میں جوہنیز کیپلر (Johannes Kepler) نے دریافت کیا تھا، بہت سے ممالک میں ماہرین فلکیات نے اپنے آلات میگلیلنی پر مرکوز کر دیے، آنے والے مہینوں میں سپر نووا SN 1987A کے رویے کا باریک بینی سے جزئیات کی حد تک مطالعہ کیا جا چکا تھا۔

شیلٹن کی اس ہیجان انگیز دریافت سے چند گھنٹوں قبل ایک اور جگہ کامی اوکا جاپان کی ایک کان (Kamioka zinc mine) کی گہرائیوں میں بھی ایک بہت اہم واقعہ ریکارڈ کیا جا رہا تھا، اس مقام پر لمبے عرصے سے ایک تجربہ کیا جا رہا تھا جس سے طبیعت دانوں نے بہت سی توقعات وابستہ کر رکھی تھیں، اس تجربے کا مقصد مادے کے سب سے بنیادی مشمولات میں سے ایک یعنی پروٹان کے حصی استحکام کا جائزہ لینا مقصود تھا، 1970 میں سامنے آنے والے عظیم وحدتی نظریات سے یہ پیش گوئی

اخذ ہوتی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ پروٹان میں عدم استحکام پایا جاتا ہو اور جب وہ انحطاط سے دوچار ہو تو نادر قسم کے ذرات کا ایک یا دوسرا گروہ خارج ہو، اگر نظریاتی طور پر اخذ شدہ یہ نتیجہ تجرباتی سطح پر بھی درست ثابت ہو جاتا تو اس کے اندر کائنات کے انجام کے حوالے سے گھرے اور دور رس مضرات پپاں ہوتے، اس پر اگلے باب میں بحث کی جائے گی۔

پروٹان کے انحطاط کا سراغ لگانے کے لیے جاپانی تجربہ کرنے والوں نے ایک ٹینک کو 2000 پونڈ خالص ترین پانی سے بھرا اور اس کے گرد فوٹون کا سراغ لگانے والے انتہائی حساس آلات نصب کر دیے، اگر کوئی ذرہ انحطاط کا شکار ہوتا تو نتیجے میں تیز رفتار ذرات جنم لیتے جو پانی میں اپنے سفر کے دوران فوٹون خارج کرتے، پانی کے ٹینک کے گرد آلات ان فوٹون کا سراغ لگانے اور ان ذرات کی نوعیت اور ان کے خصائص کے حساب کتاب میں مدد دیتے، زیر زمین جگہ کا انتخاب کائناتی شعاعوں سے بچنے کے لیے کیا گیا تھا، جو بصورتِ دیگر سراغ رسال آلات میں جعلی اور ان چاہے تعاملات کی بھیڑ لگا دیتے۔

22 جنوری کو کامی ادا کا میں لگے سراغ رسال گیارہ سینٹ میں گیارہ بار چلے، اس دورانے میں کرہ زمین کی دوسری جانب اوہ کی ایک نمک کی کان میں نصب ایسے ہی آلات میں اسی طرح کی ٹک گیارہ بار ریکارڈ کی گئی، چونکہ بیک وقت انیس پروٹان کی "خوکشی" کا سوچا بھی نہیں جاسکتا تھا چنانچہ ان واقعات کی لازماً کوئی اور وضاحت ہونی چاہیے تھی، طبیعت دانوں نے جلد ہی ان واقعات کی وجہ دریافت کر لی، انہیں اپنے سراغ رسال آلات کے ریکارڈ کا بغور مطالعہ کرنے سے پہنچا کہ پروٹان جو جانا پہچانا تھا اور تجربہ گاہوں میں بر تا بھی جاتا تھا، ان سے نیوٹرینو ٹکرائے تھے، نیوٹرینو تحت ایسی ذرات ہیں جنہیں اس کتاب کے آنے والے بیان میں اہم کردار ادا کرنا ہے، چنانچہ مناسب ہو گا کہ ہم یہاں رک کر اس کے بارے میں قدرے تفصیل سے کچھ جان لیں، ان کے وجود کو اصولی اور ریاضیاتی طور پر سب سے پہلے آسٹروی نژاد طبیعت دان وولف کانگ پالی (Wolfgang Pauli) نے 1931 میں بیٹا انحطاط (Beta Decay) نامی مسئلے کے ایک پہلو کے توضیحی عمل کے دوران دریافت کیا تھا، ایک مثالی یا نمائندہ (Typical) بیٹا انحطاط میں ایک نیوٹران کا پروٹان اور الیکٹران میں انحطاط ہوتا ہے، چونکہ الیکٹران بہت ہلاک ہوتا ہے اس لیے خاصی توانائی کے ساتھ نکل بھاتا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ انحطاط کے ہر واقعہ میں الیکٹران کی توانائی مختلف ہوتی ہے، اور یہ اس توانائی سے کم ہوتی ہے جتنی اسے نیوٹران کے انحطاط سے حاصل ہونا چاہیے، انحطاط کے واقعہ کی توانائی آخر میں شروع کی توانائی سے کم ہوتی ہے، لیکن یہ طبیعت کے بنیادی قانون یعنی کہ قانون بقاء توانائی کی غلاف ورزی ہے، چنانچہ پالی نے تجویز پیش کی کہ کم ہونے والی توانائی کسی غیر مرئی ذرے کو مل جاتی ہے جو اس کی مدد سے فرار ہو جاتا ہے، ان ذرات کے سراغ کی ابتدائی کوششوں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا، اور یہ واضح ہو گیا کہ اگر ایسے

ذرات موجود ہیں بھی تو ان کی قوت سرائیت Penetrating ناقابل یقین حد تک زیادہ ہے، اگر ان ذرات پر کسی بھی طرح کا برقرار چارج ہوتا تو مادہ انہیں فوراً جذب کر لیتا چنانچہ پالی نے نتیجہ اخذ کیا کہ یہ ذرات نیوٹرول ہیں اسی وجہ سے انہیں نیوٹرینو (Neutrino) کا نام دیا گیا۔

اگرچہ اس وقت اس ذرے کی نشاندہی نہ کی جاسکی تھی لیکن نظریہ داں اس کے مزید خواص مختلف نظریوں کی مدد سے سامنے لاتے رہے، ان خصوصیات میں سے ایک نیوٹرینو کی کمیت بھی ہے۔

جب تیزی سے حرکت کرنے والے ذرات کا معاملہ آتا ہے تو کمیت کا تصور بڑی نزاکت کا حامل ہوتا ہے، وجہ یہ ہے کہ اس کی کمیت کوئی مستقل مقدار نہیں بلکہ رفتار کے ساتھ بدلتی ہے، مثلاً اگر سنکے کے ایک کلو گرام وزنی گینڈ کو 260,000 کلو میٹر فی سینٹ سینڈ کی رفتار دے دی جائے تو دورانِ حرکت اس کی کمیت دو کلو ہو جائے گی، فیصلہ کن عامل روشنی کی رفتار ہے، کسی جسم کی رفتار روشنی کی رفتار کے جتنا نزدیک ہوتی چلی جائے گی اس کی کمیت اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، اس کی کوئی حد نہیں، اب چونکہ کمیت ایک قابل تغیر مقدار ہے اس لیے غلط فہمی سے بچنے کے لیے طبیعت داں جب بھی تحت ایسی (Sub-Atomic) ذرات کی بات کرتے ہیں تو ان کا اشارہ ان کی مجموعی کمیت کی طرف ہوتا ہے، اگر کسی ذرے کی رفتار روشنی کی رفتار سے قریب تر ہو جائے تو اس کی اصل کمیت اس کی ساکن حالت کی کمیت سے کئی گناہ زیادہ ہوتی ہے، بڑے بڑے ذراتی اسرائیل گروں (Particle Accelerator) میں گردش کرنے والے الیکٹرونوں اور پروٹانوں کی کمیت ان کی ساکن حالت کمیت سے ہزاروں گناہ زیادہ ہوتی ہے۔

نیوٹرینو کی ساکن حالت صفر کمیت کی طرف ایک اشارہ اس حقیقت سے بھی ملتا ہے کہ بعض اوقات بیٹھا اخاطط میں نکلنے والے الیکٹران پوری دستیاب توانائی سے نکلتے ہیں اور نیوٹرینو کے لیے تقریباً کوئی توانائی نہیں چھوڑی جاتی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ نیوٹرینو عملی طور پر بغیر توانائی کے بھی اپنا وجود رکھ سکتا ہے، اب آئن شائن کے فارمولے میں  $E=mc^2$  اور کمیت  $m$  متساوی ہیں چنانچہ صفر توانائی کا مطلب صفر کمیت ہو گا، نتیجہ یہ نکلا کہ نیوٹرینو کی کمیت یا تو بہت ہی کم ہے یا پھر ممکن ہے صفر ہو، اگر اس کی کمیت حقیقاً صفر ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ روشنی کی رفتار سے حرکت کرتا ہے، اتنا بہر حال یقینی ہے کہ اگر اس کی رفتار کی پیمائش کی جائے تو وہ روشنی کی رفتار کے قریب ترین ہو گی۔

ایک اور خاصیت ہے جس کا تعلق ذرے کے گھماو سے ہے، نیوٹران، پروٹان اور الیکٹران ہمیشہ گھماو (Spin) کی حالت میں

پائے جاتے ہیں، گھماو کی مقدار متعین ہوتی ہے اور مندرجہ بالا تینوں ذرات میں یہ ایک سی ہے، گھماو زاویائی مقدارِ حرکت (Angular Momentum) کی ایک شکل ہے، اور قانون بقاء توانائی کی طرح قانون بقاء زاویائی مقدارِ حرکت بھی ایک بنیادی قانون ہے، جب ایک نیوٹران کا انحطاط ہوتا ہے تو اس کے زاویائی انحطاط کی بقاء بھی ہونا ہوتی ہے، اب اگر اس انحطاط سے پیدا ہونے والے الیکٹران اور پروٹان کا گھماو ایک ہی سمت میں ہے تو دونوں گھماو جمع ہو جائیں گے اور حاصل گھماو نیوٹران کے گھماو سے دو گنا ہو جائے گا، دوسری جانب اگر نیوٹران کے گھماو ایک دوسرے سے الٹ سمتوں میں ہیں تو وہ ایک دوسرے کو منسوخ کر دیں گے اور حاصل گھماو صفر ہو جائے گا، دونوں میں سے کسی بھی صورت میں الیکٹران اور پروٹان کا حاصل گھماو نیوٹران کے گھماو کے برابر نہیں ہو گا، تاہم اگر نیوٹران کے وجود کو بھی حساب میں لایا جائے اور یہ فرض کر لیا جائے کہ اس کا گھماو بھی دونوں ذرات کے گھماو کے برابر ہے تو حساب متوازن ہو جاتا ہے، پھر ذیلی پیداوار کے تین ذرات میں سے دو کا گھماو ایک سمت میں ہو گا اور تیسرا کا ان کے الٹ سمت میں۔

چنانچہ نیوٹران کا سراغ لگائے بغیر ہی طبیعت دنوں نے استخراج کر لیا تھا کہ اس ذرے کا بر قی چارج صفر، حالت سکون، کیت بہت کم یا صفر، گھماو الیکٹران جیسا اور مادے کے ساتھ تعامل اتنا کمزور ہے کہ وہ اس میں سے گزرنے کا کوئی نشان نہیں چھوڑتا، مختصر یہ ہے کہ اسے اپنے گھماو کا حامل بہوت کہا جاسکتا ہے، چنانچہ تعجب کی کوئی بات نہیں کہ پالی کے حسابی طور پر دریافت کرنے کے بعد بھی تجربہ گاہ میں اسے یقینی طور پر دریافت کرنے میں تقریباً بیس سال کا عرصہ لگا، نیو کلیسٹر ری ایکٹر میں یہ اتنی زیادہ مقدار میں پیدا ہوتے ہیں کہ باوجود اتنے ابہام کے مناسب انتظام کے ذریعے ان کا بالواسطہ سراغ لگایا جاسکتا ہے۔

کامی اوكا کان میں نیوٹرینو کے دھارے اور سپر نووا 1987A کا بیک وقت ظہور مغض اتفاق خیال نہیں کیا گیا، ان دو واقعات کی مطابقت کو سائنسدانوں نے سپر نووا کے متعلق نظریے کی تصدیق خیال کیا، سائنسدانوں کو لمبے عرصے سے توقع تھی کہ سپر نووا سے نیوٹرینو کے دھارے چھوٹتے ہیں۔

اگرچہ لاطینی لفظ NOVA کا مطلب New یعنی نیا ہے لیکن سپر نووا 1987A کسی نئے ستارے کی پیدائش کی علامت نہیں تھا، دراصل یہ ایک قبل دیدھماکے کی صورت میں ایک پرانے ستارے کی موت تھی، میگیلینی بادل جس کے کنارے یہ سپر نووا نمودار ہوا تھا دراصل ہم سے ایک سو ستر ہزار نوری میل دور ایک نسبتاً چھوٹی سی کہکشاں ہے، یہ ہماری کہکشاں سے اتنی نزدیک ہے کہ اسے ہم اپنی کہکشاں کی "سیلہ کہکشاں" کہہ سکتے ہیں، اسے جنوبی نصف کرے میں ننگی آنکھ سے بھی

روشنی کے ایک دھنڈے سے دھبے کی صورت میں دیکھا جاسکتا ہے، لیکن اس کے علیحدہ علیحدہ ستارے دیکھنے کے لیے خاصی طاقتور دوربین کی ضرورت ہوتی ہے، شیلٹن کی دریافت کے چند گھنٹے بعد ہی آسٹریلیا کے فلکلیات دانوں نے بتا دیا تھا کہ اس کہکشاں میں چند کروڑ ستارے پائے جاتے ہیں ان میں سے کون سا بھٹا ہے، انہوں نے یہ کام آسمان کے اس دھبے کی پہلے سے لی گئی تصویر کا جائزہ لے کر کیا، بھٹنے والا ستارہ نیلی Super-giant قسم کا تھا، اس کا قطر سورج کے قطر سے چالیس گنا زیادہ تھا، اس کا نام بھی تھا یعنی سین ڈیولیک 202° Sanduleak -69°.

اس نظریے پر کہ ستارے بھٹ سکتے ہیں، سب سے پہلے اس صدی کی پچاس کی دہائی کے نصف میں فریڈ ہائل (Fred Hoyle)، ولیم فاؤلر (William Fowler)، جیفرے (Geoffrey Burbidge) اور مارگریٹ بربرج (Margaret Burbidge) نے کام کیا، یہ سمجھنے کے لیے کہ کوئی ستارہ اس انجام سے کیسے دوچار ہوتا ہے اس کے اندر وہی معاملات سے واقعیت ضروری ہے، سورج وہ ستارہ ہے جس سے ہماری واقعیت باقی سب سے زیادہ ہے، دوسرے تمام ستاروں کی طرح سورج بھی استقرار میں نظر آتا ہے یعنی کہ بظاہر اس میں کوئی تبدیلی ہوتی نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ سورج تباہ کار قوتوں کے خلاف مسلسل جدوجہد میں مصروف ہے، تمام ستارے گیس سے بنے گولے ہیں جن کو قوتِ تجاذب نے اکٹھا کر رکھا ہے، لیکن اگر تجاذب ان پر کارگر واحد قوت رہی تو یہ اپنے بے پناہ وزن کے باعث فوراً اندر کی طرف دھماکے سے دوچار ہوتے اور گھنٹوں میں غائب ہو جاتے، لیکن اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ستاروں کے اندروں میں بھی ہوئی گیس کا بیرونی طرف بے پناہ دباؤ اندر کی جانب عمل کرنے والی قوتِ تجاذب کو متوازن کرتا رہتا ہے۔

گیس کے دباؤ اور اس کے درجہ حرارت میں ایک سادہ ساتھی ہے، جب گیس کے کسی مقرر جنم کا درجہ حرارت بڑھایا جاتا ہے تو عام طور پر گیس کے دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے جو درجہ حرارت کے ساتھ راست تناسب ہوتا ہے، اور اس کے بر عکس جب درجہ حرارت کم کیا جاتا ہے تو دباؤ بھی کم ہوتا ہے، ستارے کے مرکز میں گیس کا دباؤ اس لیے بہت زیادہ ہے کہ اس کا درجہ حرارت بہت زیادہ ہے، یعنی درجہ حرارت کئی ایک دس لاکھ یعنی کئی میلین ڈگری ہوتا ہے، یہ حرارت نیوکلیئی تعامل سے پیدا ہوتی ہے، کسی ستارے کی زندگی کے زیادہ تر حصے میں جو نیوکلیئی تعامل اسے توانائی مہیا کرتا ہے وہ فیوژن (Fusion) سے ہائیڈروجن کے ہیلیئم میں بدلتے کا عمل ہے، دونیوکلیئسون کے درمیان جو رافع بر قتی قوت پائی جاتی ہے اس پر قابو پانے کے لیے بہت اونچے درجہ حرارت کی ضرورت ہوتی ہے، فیوژن سے حاصل ہونے والی حرارت ستارے کی کروڑوں سال تک کفالت کر سکتی ہے لیکن جلد یا بدیر ایندھن ختم ہونے لگتا ہے اور توانائی پیدا کرنے والا ری ایکٹر سست

ہو جاتا ہے، تب یہ ہوتا ہے کہ باہر کی جانب عامل گیسوں کے دباؤ سے ملنے والی معاونت مخدوش ہو جاتی ہے اور ستارہ اندر کی جانب عمل کرنے والی قوتِ تجاذب کے خلاف عرصے سے جاری جنگ ہارنے لگتا ہے، اصل میں ستارہ ہمیشہ حیاتِ مستعار پر زندہ ہوتا ہے، وہ اپنے ایندھن کے ذخائر جھونک کر تجاذب سے بچتا رہتا ہے، لیکن اس کی سطح سے خلاء میں بہتا ہر کلو واٹ اس کے خاتمے کو قریب لاتا جاتا ہے۔

حساب لگایا گیا ہے کہ سورج نے ہائیڈروجن کی جس مقدار کے ساتھ اپنی زندگی کا آغاز کیا وہ دس کروڑ یا دس ملین سال کے لیے کافی تھی، آج ہمارے اس مقامی ستارے کی عمر پانچ کروڑ سال ہو چکی ہے اور یہ اپنے ذخائر کا نصف خرچ کر چکا ہے (ابھی گھبرانے کی کوئی بات نہیں)، کوئی ستارہ جس شرح کے ساتھ اپنا ایندھن خرچ کرتا ہے اس کا اس کیت سے گھرا تعلق ہے، وزنی ستارے اپنا ایندھن زیادہ تیزی سے خرچ کرتے ہیں کیونکہ وہ زیادہ بڑے اور زیادہ روشن ہیں اور زیادہ تو انائی خرچ کرتے ہیں، زیادہ کیت کی وجہ سے مرکز میں موجود گیس پر زیادہ دباؤ پڑتا ہے اور ان کے اندر فیوژن کی رفتار بھی بڑھ جاتی ہے، مثلاً ایک ستارہ جس کی کیت دس سورجوں کے برابر ہے اپنا ایندھن کوئی دس ملین سال کے اندر خرچ کر ڈالے گا۔

اب آئیں ایسے ایک بھاری ستارے کے مقدار پر غور کریں کہ بالآخر اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ابتداء میں زیادہ تر ستارے ہائیڈروجن پر مشتمل ہوتے ہیں، ہائیڈروجن ایندھن کے جلنے کا مطلب اس کے نیو کلیئس کا ملاپ ہے، ہائیڈروجن کا نیو کلیئس ایک پروٹان ہوتا ہے، ان کے ملنے سے ہیلیئم کا نیو کلیئس بنتا ہے جو دو پروٹانوں اور دو نیوٹرانوں پر مشتمل ہوتا ہے، تفصیلات قدرے چیخیدہ ہیں اور اس بیان میں غیر ضروری بھی، ہائیڈروجن کا "جلنا" نیوکلیائی تو انائی کا سب سے سرگرم سرچشمہ ہے، لیکن یہ تو انائی کا واحد ذریعہ نہیں ہے، اگر ستارے کے مرکز کا درجہ حرارت مناسب حد تک زیادہ ہے تو ہیلیئم کے نیو کلیئس باہم پیوست ہو کر کاربن بن جاتے ہیں جو مزید تعاملات سے گزر کر آسیجن، نیون (Neon) اور دیگر عناصر بن جاتے ہیں، ایک بڑے ستارے کے مرکز میں درجہ حرارت اتنا بلند ضرور ہوتا ہے کہ مندرجہ بالا نیوکلیائی تعاملات بالترتیب ہوتے چلے جاتے ہیں، لیکن ہر اگلے تعامل سے ملنے والی تو انائی کم تر ہوتی چلی جاتی ہے، ایندھن کا جلنی تیز سے تیز تر ہوتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ وہ مرحلہ آجاتا ہے کہ ستارے کے اجزاء ترکیبی پہلے مہینوں میں بدلتے ہیں پھر دونوں میں پھر گنٹوں میں بدلنے لگتے ہیں، اس مرحلے پر ستارے کے اندر وہن کو پیاز سے تشییہ دی جاسکتی ہے، اس کی مختلف پرتوں کیے بعد دیگر بننے والے عناصر سے بننے کی رفتار روز بروز بڑھتی چلی جاتی ہے، بیرون میں ستارے کا حجم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ وہ ہمارے پورے نظام شمسی جتنا ہو جاتا ہے، اس مرحلے پر ماہرین فلکیات اسے سرخ Super-giant کہتے

ہیں۔

عصر لوہا نیوکلیائی آٹھیں تماشہ گاہ کے اختتام کی نشانی ہے کیونکہ اس کی نیوکلیائی ساخت خصوصاً خاصی مستحکم ہوتی ہے، لوبہ سے وزنی عناصر کی فیوژن سے تنشیل کے لیے درکار تو انائی اس عمل سے خارج ہونے والی تو انائی سے زیادہ ہوتی ہے اس وجہ سے جب کسی ستارے کا مرکز لوہے کا ہو جاتا ہے تو اسے فناہ آجائی ہے، جب ستارے کا مرکز مزید حرارت پیدا کرنے کے قابل نہیں رہتا تو پانسہ تجاذب کے حق میں پلٹ جاتا ہے، اس وقت ستارہ ایک تباہ کن عدم استحکام کے کنارے پر جھوول رہا ہوتا ہے اور بالآخر اسے اپنے تجاذبی گڑھے میں گرفتار ہے۔

اب جو کچھ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے ہوتا ہے، اس کی تفصیل یوں ہے، ستارے کا لوہے کا مرکز جواب نیوکلیائی تعامل کے ذریعہ حرارت پیدا نہیں کر سکتا، خود اپنا وزن برداشت نہیں کر سکتا اور قوت تجاذب کے زیر اثر اتنی زور سے سکھرتا ہے کہ اس کے ایٹم بھی کچلے جاتے ہیں، مرکز کی کثافت نیوکلیئس کی کثافت کے قریب پہنچ جاتی ہے، اس لوہے سے بنی ایک انگوٹھی کا وزن ایک ٹریلین ٹن کے قریب ہو گا، اس ستارے کا مرکز اب صرف نیوکلیئسوس سے مل کر بنا ہوا ہے کیونکہ ایٹم پہنچے جا چکے ہیں، اس مرحلے پر ستارے کا مرکز عام طور پر صرف دو کلو میٹر چوڑا ہوتا ہے، جب مرکز میں یہ صورتحال ہوتی ہے تو مرکز کے ارد گرد کا مادہ تیزی سے اس میں گرتا ہے، ٹریلین کے ٹریلین ٹن مادہ بیسیوں ہزار کلو میٹر فی سینٹ کی رفتار سے سخت مرکزے پر گرتا ہے، اس تصادم سے بے شمار شاک ویو پیدا ہوتی ہیں جو باہر کی جانب ستارے میں سے گزرتی ہیں۔

جب مرکز اپنے ہی تجاذب کی وجہ سے سکھرتا ہے اور ایٹم کچلے جاتے ہیں تو ان کے الیکٹران اور پروٹان مل کر نیوٹران بناتے ہیں اور نیوٹرینو خارج ہوتے ہیں چنانچہ ستارے کا مرکز نیوٹران سے مل کر بنا ایک بہت بڑا گولہ بن جاتا ہے، اس مرکز سے شاک ویو (Shock Wave) اور نیوٹرینو کی آبشار مرکز سے باہر کا رخ کرتی ہے، اس تو انائی کو جذب کرتے ستارے کی بیرونی تہہ ایک نیوکلیائی دھماکے سے پھٹ جاتی ہے، چند روز تک ستارہ لاکھوں سورجوں کے برابر روشنی دیتا نظر آتا ہے اور آخر کار بجھ کر منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔

ہمارے جیسی ایک عام کہکشاں میں یہ سپر نووا واقعہ ایک صدی میں اوستاً دو سے تین بار ہوتا ہے، ان میں سے ایک مشہور واقعہ عرب اور چینی ماہرین ریکارڈ پر لائے جو 1054 عیسوی میں مجمع النجوم عقرب میں وقوع پذیر ہوا، وہ بھٹا ہوا ستارہ اس مجمع نجوم میں پھیلے ہوئے بادل کی صورت نظر آتا ہے اور اسے کریب نیبیولا ([Crab Nebula](#)) کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

سپر نووا A 1987 کے پھٹنے نے پوری کائنات کو نیوٹرینو کے سیلا ب سے نہلا دیا، یہ ششد رکن شدت کی ایک لہر تھی، زمین کے ہر ربع سینٹی میٹر میں سے سینکڑوں ملین نیوٹرینو گزر گئے، حالانکہ دھماکہ زمین سے ایک سو ستر نوری سال کے فاصلے پر ہوا، خوش قسمتی سے اس کے باشندوں کو خبر نہ ہوئی کہ ایک دور دراز کہشاں سے آنے والے کئی ٹریلیں نیوٹرینو ان میں سے گزر رہے ہیں، لیکن کبھی ادا کا اور اوہایو کے پروٹان اختطاط سراغ کنندوں نے ان میں سے انیس کو روک لیا، ان آلات کے بغیر یہ ذرات انجانے ہی میں گزر گئے ہوتے جیسا کہ 1054ء میں ہوا تھا۔

درست ہے کہ سپر نووا ستارے کے لیے یہ صورتِ موت کی حیثیت رکھتا ہے لیکن اس کا ایک پہلو اسی ستارے کے لیے حیات افزا بھی ہے، مرکز سے تو انائی کا یہ بے پناہ اخراج بیرونی تہوں کو گرم کر دیتا ہے اور مختصر وقت کے لیے نیوکلیائی فیوژن کے تعاملات دوبارہ شروع ہو جاتے ہیں، یہ اور بات ہے کہ یہ تعاملات تو انائی خارج کرنے کی بجائے اس کے سوتے خشک کر دیتے ہیں، سونا، سکہ اور یورینٹیم جیسے لوہے سے وزنی عناصر کی ڈھلانی ستارے کی بھٹی کے اس آخری اور گرم ترین مرحلہ میں ہوتی ہے، یہ عناصر نیوکلیئس سازی کے ابتدائی مراحل میں بننے والے کاربن اور آسیجن جیسے عناصر کے ساتھ پھٹ کر بیرونی فضاء میں چلے جاتے ہیں اور کائنات کے دوسرے سپر نوووں سے نکلنے والے ایسے ہی مادوں کے ساتھ مل جاتے ہیں، آنے والے زمانوں میں ان عناصر کو ستاروں اور سیاروں کی نئی نسلیں سمیٹ کر لے جاتی ہیں، ان عناصر کے بننے اور بکھرے بغیر ہماری زمین جیسے سیاروں کا معرض وجود میں آنا ممکن نہیں، حیات افزاء کاربن اور آسیجن، ہمارے بینکوں کا سونا، ہماری چھتوں کا سکہ اور ہمارے ایٹھی ری ایکٹروں کی یورینٹیم کی سلاخیں سب زمیں پر ان ستاروں کی موت کے طفیل موجود ہے جو سورج کے بھی وجود میں آنے سے پہلے ہو چکی تھی، کیسی عجیب بات ہے کہ آج جو عناصر ہمارے جسم کی ترکیب میں شامل ہیں وہ قرنوں پہلے مردہ ہو جانے والے ستاروں کی نیوکلیائی را کھہ ہے۔

سپر نووا کسی ستارے کو مکمل طور پر تباہ نہیں کرتا، اگرچہ زیادہ تمادہ باہر کی طرف بکھر جاتا ہے لیکن دھماکے سے اندر کی طرف گرنے والا مرکز اپنی جگہ موجود رہتا ہے، اس کے مقدر کا فیصلہ ہونے میں بھی دیر نہیں لگتی، اگر تو اس مرکز میں ہمارے سورج جتنا مادہ بھینچا ہوا ہو تو یہ ایک نیوٹران ستارے کی شکل میں موجود رہے گا جس کا جنم ایک چھوٹے شہر جتنا ہو گا، لیکن زیادہ امکان یہی ہے کہ نیوٹران سے بنا یہ ستارہ بہت تیزی سے اپنے گرد گھومنے لگے گا، اس کی رفتار کوئی ایک ہزار چکر فی سینکڑ ہو گی، یعنی اس کی سطح کی رفتار روشنی کی رفتار کا دس فیصد ہو گی، دراصل ستارہ ابتداء ہی سے گھماو میں ہوتا ہے، لیکن جب اندر کی طرف دھماکے سے مادہ اس پر بے پل ماہ رفتار سے گرتا ہے تو دراصل یہی رفتار بڑھتے بڑھتے تیز ہونے لگتی ہے،

اس کی مثال سکینگ کے اس کھلاڑی کی سی ہے جو گھومتے ہوئے اپنے بازو سکیر لیتا ہے اور اس کی گردش تیز ہو جاتی ہے، فلکیات دانوں نے ایسے بہت سے نیوٹران ستاروں کا سراغ لگایا ہے، مثال کے طور پر کریب نیبیولا (Crab Nebula) کے وسط میں جو نیوٹران ستارہ پایا جاتا ہے اس کے گھماو کی رفتار 33 چکر فی سینڈ ہو چکی ہے، اب اگر اس نیبیولے کے مرکزی حصے کی کمیت زیادہ ہے یعنی کہ متعدد سورجوں کے برابر ہے تو یہ نیوٹران ستارہ اس کی آخری منزل نہیں ہوتا، یہاں قوتِ تجاذب اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ سخت ترین معلوم مادہ، یعنی کہ نیوٹرانوں سے بنایہ بچا کچھ ستارہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جس پر سپر نووا سے بھی حیران کن اور تباہ کن واقعہ ہوتا ہے، مرکز سکڑنے لگتا ہے اور ایک ملی سینڈ یعنی کہ سینڈ کے ہزاروں حصے سے بھی کم وقت میں ایک بلیک ہول بنایا کر اس میں غائب ہو جاتا ہے۔

چنانچہ ایک وزنی ستارے کے ساتھ بالآخر یہ ہوتا ہے کہ ٹکڑے ہونے کے بعد اس کا جو کچھ بچتا ہے وہ یا تو نیوٹران ستارہ ہوتا ہے یا پھر ایک بلیک ہول، کوئی نہیں جانتا کہ اب تک کتنے ستارے بھی چکے ہیں، لیکن اکیلی ہماری کہشاں ہی میں ستاروں کے اس طرح کے اجسام بیسیوں کے حساب سے ملتے ہیں۔

مجھے بچپن میں خوف ہوتا تھا کہ کہیں سورج پھٹ نہ جائے، تاہم اس کے سپر نووا بننے کا کوئی خطرہ نہیں ہے، یہ اتنا چھوٹا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا، چھوٹے ستاروں کا انعام اتنا پرہنگام نہیں ہوتا جتنا ان کے بڑے رشتہ داروں کا، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایندھن کو اتنی رفتار سے خرچ نہیں کرتے، مثلاً ستاروں کی وہ قسم جنہیں سفید ہونے کہتے ہیں، اور وہ ستاروں کی بہ اعتبار جنم فہرست میں سب سے نیچے آتے ہیں، ایک ٹریلیون سال تک چمک سکتے ہیں، دوسرے یہ کہ ان چھوٹے ستاروں کے مرکز میں اتنا درجہ حرارت پیدا نہیں ہو سکتا کہ لوہے کا مرکز بن سکے جو باعثِ تباہی اچانک اندر کی جانب گرنے والے دھماکے کو شروع کرنے کے لیے ضروری ہے۔

سورج خاصی کم کمیت والے ستاروں کی ایک مثال ہے جو رفتہ رفتہ اپنی ہائیڈروجن کو سطح پر جلا رہا ہے جبکہ اپنے مرکز کو ہیلیئیم میں تبدیل کرتا جا رہا ہے، ہیلیئیم زیادہ تر اس کے مرکز میں موجود ہے جو نیوکلیائی تعاملات کے اعتبار سے سرگرم عمل نہیں یعنی کہ اس میں نیوکلیائی تعاملات نہیں ہوتے، چنانچہ اس کا مرکز اس حرارت کی پیدائش میں حصہ دار نہیں جو کچل ڈالنے والی قوتِ تجاذب کی مزاجمت کرتی ہے، چنانچہ کچلے جانے سے بچنے کے لیے سورج کو اپنے نیوکلیائی تعاملات کی سرگرمی سطح پر رکھنا پڑتی ہے تاکہ اسے مطلوب ہائیڈروجن ملتی رہے، اس دوران ہیلیئیم سے بنا مرکز سکڑتا رہتا ہے، ان اندر ورنی تبدیلیوں کی وجہ سے زمانے گزرنے کے ساتھ سورج کی ظاہری حالت میں غیر محسوس تبدیلیاں آتی ہیں، اس کا جنم بڑھ جائے

گا، اس کی سطح کا درجہ حرارت کم ہو جائے گا جس سے اس کی رنگت میں سرخی مائل جھلک آجائے گی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنے جنم سے تقریباً پانچ گنا زیادہ ہو جائے گا اور ایک سرخ جن ستارہ (Red Giant Star) بن جائے گا، ایسے کئی ستارے آسمانوں میں پہچانے جاسکتے ہیں، [Betelgeuse](#) اور [Arcturus](#)، [Aldebaran](#) اسی صفت میں آتے ہیں، سرخ ستارے کی شکل میں آجانا ستارے کے خاتمے کا آغاز ہے۔

اگرچہ سرخ ستارہ نسبتاً ٹھنڈا ہوتا ہے لیکن اس کا بڑا رقبہ اسے بہت بڑی نور افشاں سطح کا حامل بنا دیتا ہے، اسی لیے اس کی مجموعی ضو افشاری Luminosity زیادہ ہوتی ہے، کوئی چار بلین (چار کروڑ) سال بعد نظام شمسی کے ستاروں کو مشکلات کا سامنا ہو گا، اس سے بہت پہلے سمندر ابل کر غائب ہو چکے ہوں گے، اور اس کا کردہ ہوائی بھی خلاوں میں کھو چکا ہو گا، اس سے بھی بہت پہلے زمین بے آباد ہو چکی ہو گی، اپنے پھولنے کے عمل میں سورج زمین تک کے تمام سیاروں کو اپنی آتشیں لپیٹ میں لے لے گا، لیکن زمین پھر بھی اپنے محور پر گھومتی رہے گی، سورج کی آتشیں لپیٹیں کثافت میں اتنی لطیف ہوں گی کہ وہ زمین کی حرکت پر کوئی قابل ذکر منفی اسراع مرتب نہیں کریں گی، کردہ ہوائی غائب ہو چکا ہو گا اور زمین کے گرد قریب قریب خلاء کی کیفیت ہو گی۔

زمین پر ہمارا وجود سورج جیسے ستاروں کے غیر معمولی استحکام کا نتیجہ ہے جو کروڑوں سال تک بغیر کسی بڑی تبدیلی کے جلتے اور حرارت خارج کرتے رہتے ہیں، یہ عرصہ زندگی کے ارتقاء اور پھیلنے پھولنے کے لیے کافی ہے، لیکن جب سورج جیسے ستاروں کی زندگی کا "سرخ جن" مرحلہ آتا ہے تو یہ استحکام برقرار نہیں رہتا، ایسے ستارے کی زندگی کے اگلے مراحل پیچیدہ بے قاعدہ اور پُرہنگام ہوتے ہیں، ان آخری مراحل میں ان کے روپ اور شکل و شبہت میں اچانک تبدیلیاں آتی ہیں، اپنے بڑھاپے کے ان مراحل میں یہ گیس کے کروی مرغولے خارج کرتے ہیں، یعنی کہ گیس ان کروں کے ہر طرف خارج ہوتی ہے، عین ممکن ہے کہ ستاروں کے مرکز میں موجود ہیلیم گیس شعلہ فشاں ہو اور کاربن، ناٹروجن اور آسیجن وجود میں آئے، اس عمل سے جو توانائی وجود میں آئے گی وہ ستارے کو مزید کچھ عرصہ زندہ رکھے گی، اپنا یہ ورنی غلاف خلاء میں دھماکوں سے اڑاکنے کے بعد ستارہ مرتا ہے تو باقی صرف مرکزی حصہ رہ جاتا ہے جو کاربن اور آسیجن سے مرکب ہوتا ہے۔

اس پیچیدہ سرگرمی سے گرزنے کے بعد بے اعتبار کمیت نچلے اور درمیانے درجے کے ستاروں کا تجاوز کے ہاتھوں پس جانا ناگزیر ہوتا ہے، یہ سکڑاؤ بے رحمانہ طور پر ہوتا ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک سورج کا جنم ایک چھوٹے سے سیارے کے برابر نہیں ہو جاتا، اس جسم کو ماہرین فلکیات سفید بننے کا نام دیتے ہیں، اپنے اس چھوٹے جنم کی بناء پر سفید

بونے بہت مدھم نظر آتے ہیں حالانکہ ان کی سطح کا درجہ حرارت سورج کی سطح کے درجہ حرارت سے بہت زیادہ ہو سکتا ہے، دور میں کے بغیر زمین سے کوئی سفید بونا نظر نہیں آتا۔

ہمارے سورج کو مستقبل بعید میں سفید بونا بنا ہے، اس مرحلے کے بعد بھی سورج کئی بیلین سال تک گرم رہے گا، اس کا عظیم الشان جثہ اتنا کثیف ہو گا کہ یہ کسی بھی بہترین غیر موصل یا حاجز سے زیادہ بہتر طور پر حرارت کو اپنے اندر روک سکے گا، لیکن چونکہ اس کے اندر نیوکلیائی ری ایکٹر ہمیشہ کے لیے رک چکا ہے اس لیے ایسا کوئی ذریعہ نہیں جو ٹھنڈی فضاء میں آہستہ آہستہ فرار ہوتی حرارت کی تلافسی کر سکے، آہستہ یا بہت آہستہ بونا ٹھنڈا ہوتا جائے گا حتیٰ کہ یہ اپنی عظیم کایا کلپ کے نقطہ آغاز پر جا کر کھڑا ہو گا، اس کے بعد یہ غیر معمولی سختی کے حامل قلمی مادے میں بدل جائے گا، پھر یہ مدھم ہوتے ہوتے بالآخر تاریک ہو کر گرد و پیش کے سیاہ منظر کا ایک حصہ بن جائے گا۔

## آغازِ شب

ہماری کہکشاں میں ایک سو بلین ستارے نور افشاں ہیں اور ان میں سے ہر ایک کا انجام متعین ہے، دس بلین سال کے بعد جو ستارے ہم دیکھتے ہیں سب کے سب نظروں سے اوچھل ہو چکے ہوں گے، یہ سب حرکیات کے دوسرے قانون کا شکار ہو کر ایندھن کی کمی کے ہاتھوں بجھ چکے ہوں گے۔

لیکن ملکی وے یا ثریا پھر بھی دمکتی رہے گی، کیونکہ جہاں ستارے موت سے ہمکنار ہوتے ہیں وہاں، ساتھ ساتھ، نئے ستارے بھی جنم لیتے ہیں، کہکشاں کے مرغولہ نما بازوؤں میں میں سے ایک میں ہمارا نظام شمسی بھی ہے، گیسے کے بادل اکٹھے ہوتے ہیں، بچخت ہیں، تجاذب کے زیر اثر ایک نقطے کے گرد دب کر اکٹھے ہوتے ہیں اور ٹکڑے ہو کر نومولود ستاروں کی آبشاریں بناتے ہیں، اور یہ نامی جھرمٹ (Constellation of Orion) میں ستاروں کی ایسی ہی ایک نرسری نظر آتی ہے، اور یہ کی توار کے مرکز میں روشنی کا دھندلا سا جو دھبہ نظر آتا ہے ستارہ نہیں بلکہ ایک نیسیولا ہے، نیسیولا غبار اور گیس سے بھرا بہت بڑا علاقہ ہوتا ہے جس میں نئے ستارے جڑے ہوئے نظر آتے ہیں، جب اس نیسیولا کا مریٰ روشنی کی بجائے انفاریڈ روشنی میں مشاہدہ کیا گیا تو ایسے ستارے نظر آئے جو اپنی تشکیل کے پہلے مرحلے میں تھے اور ابھی تک ان کے گرد وہ گیس اور گرد موجود تھی جس نے انہیں چھپا رکھا تھا۔

جب تک گیس کی مناسب مقدار موجود ہے ہماری کہکشاں کے مرغولہ نما بازوؤں میں نئے ستارے بنتے رہیں گے، یہ گیس دو ذرائع سے وجود میں آئی، کچھ گیس تو آغازِ کائنات کے وقت سے موجود ہے یعنی یہ ابھی تک ستارے نہیں بنی، اور کچھ گیس وہ ہے جو سپر نووا دھماکوں، ستاروں کی آندھیوں، ستاروں کی زندگی کے مخصوص مراحل میں بیرونی جانب دھماکوں اور کچھ دوسرے عملوں سے وجود میں آتی رہتی ہے۔

ظاہر ہے کہ ایک ہی مادے کا بار بار استعمال لامحدود مدت تک جاری نہیں رہ سکتا، جب پرانے ستارے مرتے ہیں اور مسماں ہو کر سفید ہونے، نیوٹران ستارے یا بلیک ہول بن جاتے ہیں تو وہ یعنی ستاروی یا ستاروں کے درمیان پائی جانے والی گیس کو مادے کی رسید فراہم نہیں کر سکتے، ابتدائے کائنات سے موجود مادہ بھی رفتہ رفتہ ستاروں میں شامل ہوتا چلا جائے گا اور بالآخر مفقود ہو جائے گا، آخری ایام کے یہ ستارے جب اپنی زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے دم توڑیں گے تو کہکشاں سنگینی کی حد تک مدھم ہو جائے گی، سب سے چھوٹے اور آخری نوجوان ستاروں کو اپنا نیوکلیئی ایندھن خرچ کرنے اور سفید ہونے بننے میں کئی بلین سال لگیں گے، لیکن ایک سست اور تکلیف دہ قطعیت کے ساتھ اس لازوال رات کو بہر حال چھا جانا ہے۔

ہر لمحہ وسعت پذیر خلاء میں ہر طرف پھیلی دوسرا کہکشاوں کو بھی اس خاتمے کا سامنا کرنا ہو گا، کائنات جو نیوکلیئی سرچے سے نکلتی وافر تو انائی سے تاباں اور درخشاں ہے بالآخر اپنے اس ناگزیر مأخذ سے محروم ہو جائے گی، روشنی کے دور کو بالآخر ہمیشہ کے لیے ختم ہونا ہے۔

لیکن روشنی کے ختم ہو جانے کا مطلب کائنات کا اختتام نہیں ہے، کیونکہ تو انائی کا ایک اور منبع ابھی باقی ہے جو نیوکلیئی تو انائی سے بھی زیادہ طاقتور ہے، قوتِ تجاذب جو ایسی سطح پر کمزور ترین قوت ہے جب فلکیاتی پیمانے پر آتی ہے تو غالب ترین قوت بن جاتی ہے، اپنے اثرات میں ہو سکتا ہے یہ اتنی شدید نہ ہو لیکن یہ بہر حال مطلق طور پر دائی ہے، کئی بلین سال تک ستارے اس قوت کے خلاف اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے نیوکلیئی ایندھن جلاتے ہیں لیکن اس سارے عمل کے دوران تجاذب منتظر رہتا ہے اور بالآخر انہیں لے ڈوبتا ہے۔


ایک ایٹم کے نیوکلیئس میں دو پروٹانوں کے درمیان پائی جانے والی تجاذبی قوت طاقتور نیوکلیئی قوت (Strong Nuclear Force) کا  $^{37}10$  وال حصہ ہوتی ہے، لیکن تجاذب جمی خاصیت رکھتا ہے، ستارے میں شامل ہونے والا ہر نیا پروٹان اس کے وزن کو بڑھاتا ہے۔

تجاذب کی قوت کو بیان کرنے کے لیے سب سے بہتر وضاحتی مثال بلیک ہول کی ہے، یہاں قوتِ تجاذب مکمل فتح حاصل کر چکی ہوتی ہے۔

ستارے کو کچل کر عدم وجود کی منزل تک پہنچا دیا گیا ہوتا ہے، اور اس ستارے کا واحد نشان اس کے گرد کا زمان و مکان ہے جو لامحدود زمانی کجھی یا بگاڑ کی شکل میں موجود ہوتا ہے، بلیک ہول کے بارے میں ایک فکر انگیز خیالی تجربہ بیان کیا جاتا ہے،

فرض کیجئے ایک چھوٹا سا جسم ہے، جیسے 100 گرام وزنی ایک گیند وغیرہ، جو کافی دور سے بلیک ہول کے اندر گر رہا ہے، گیند اس بلیک ہول میں گرے گا اور پھر کبھی نہ ملنے کے لیے کھو جائے گا، تاہم اس بلیک ہول کی ساخت میں یہ اپنے سابقہ وجود کا ایک سراغ ضرور چھوڑ جائے گا، کیونکہ گیند نگلنے کے بعد وہ خفیف سا بڑا ہو جائے گا، حساب لگایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ اگر جسم کافی دور سے گرا یا جائے تو اس بلیک ہول کی کمیت میں گیند کی اصل کمیت کے برابر اضافہ ہو گا کیونکہ مادے اور توانائی سمیت کوئی بھی چیز بلیک ہول سے فرار نہیں ہو سکتی۔

اب ایک اور تجربے پر غور کریں جس میں وزن کو بلیک ہول کے اندر رفتہ رفتہ اتارا جا رہا ہے، اس مقصد کے لیے جسم کے ساتھ ایک ڈوری باندھی جاسکتی ہے جو ایک پلی پر سے گزر کر ایک ڈرم کے گرد لپٹی ہو، اس ڈوری کے لپیٹ کھول کر اسے بتدربنچ بلیک ہول کے اندر اتارا جاسکتا ہے، جب وزن نیچے کی جانب حرکت کرتا ہے تو یہ توانائی پیدا کرتا ہے جس کی ایک صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ ڈرم کے ساتھ منسلک ایک جزیئر گھما کر بجلی پیدا کرے، یہ وزن بلیک ہول کی سطح کے جتنا قریب ہو گا اتنی زیادہ قوتِ تجاذب اس پر عمل کرے گی، نیچے کی جانب عمل کرنے والی قوت جوں جوں بڑھتی ہے وزن جزیئر بھی توں توں زیادہ کام کرتا ہے، سادہ سے عمل سے حساب لگایا جاسکتا ہے کہ جب جسم بلیک ہول کی سطح تک پہنچے گا تو وہ جزیئر پر کتنا کام کر چکا ہو گا، ایک مثلی صورتِ حال میں اس کا جواب یہ نکلتا ہے کہ جزیئر پر لگائی گئی توانائی اس جسم کی کل ساکن کمیت توانائی کے برابر ہو گی۔



ایک خیالی تجربے میں وزن کو پلی سے گزرتی ڈوری سے باندھ کر بلیک ہول کی طرف لکایا گیا ہے، وزن نیچے جاتے ہوئے کام کرتا ہے اور پچھلے ڈبے کو توانائی فراہم کرتا ہے، بلیک ہول کی سطح تک پہنچنے تک وزن اپنی سکونی کمیت کے برابر (  $E=mc^2$  ) توانائی فراہم کرچکا ہوتا ہے۔

شکل 5.1

آن سٹائن کے فارمولے  $E=mc^2$  کو یاد کریں جو ہمیں بتاتا ہے کہ کمیت  $m$  کے اندر موجود توانائی  $mc^2$  کے برابر ہوتی ہے، اصولی اعتبار سے کسی جسم میں موجود یہ گل توانائی قابل حصول ہے، جسم کی کمیت کے سو گرام ہونے کی صورت میں یہ توانائی بھلی کے تین کلو وات کے برابر ہے، تقابلی اعتبار سے دیکھا جائے تو سورج جب اسی سو گرام کو نیوکلیائی فیوژن سے توانائی میں تبدیل کرتا ہے تو مندرجہ بالا مقدار کا ایک فیصد سے بھی کم حصہ خارج کرتا ہے، چنانچہ اصولی اعتبار سے تجاذب کا اخراج توانائی نیوکلیائی فیوژن کے مقابلے میں کم از کم سو گنا زیادہ توانائی خارج کرتا ہے، اور ستاروں میں توانائی نیوکلیائی فیوژن سے پیدا ہوتی ہے۔

بے شک جو صورتِ حال بیان کی گئی ہے مکمل طور پر غیرِ حقیقی ہے، بلاشبہ اجسام متواتر بلیک ہولوں میں گرتے ہیں لیکن ان کے ساتھ تو انائی کے حصول کا کوئی پلی سسٹم اور جزیئر نصب نہیں ہوتا، عملی طور پر یہ ہوتا ہے کہ جسم کی ساکن کیت تو انائی کا صفر سے لے کر سو فیصد تک کوئی بھی حصہ خارج ہو سکتا ہے، اب تو انائی کا لکتنا حصہ خارج ہوتا ہے اس کا انحصار طبیعی حالات پر ہے، پچھلی دو دہائیوں سے سائنس دان کوشش کر رہے ہیں کہ وہ مرغلوں کی صورت بلیک ہول میں اترتی گیس کے رویے کو سمجھیں اور خارج ہونے والی تو انائی کی مقدار اور طرزِ اخراج کا حساب لگائیں، اس مقصد کے لیے وہ کمپیوٹر کے نمونہ جاتی پروگراموں اور ریاضیاتی مادلوں سے کام لے رہے ہیں، اس میں ملوث طبعی عمل بہت پیچیدہ ہیں، تاہم اس قدر ضرور واضح ہے کہ اس طرح کے عملوں میں تجاذبی قوت کی بہت بڑی مقدار خارج ہوتی ہے۔

ایک مشاہدہ ہزاروں حسابی عملوں کی سی اہمیت رکھتا ہے، سائنسدان ایسے اجسام کی تلاش میں وسیع پیمانے پر کام کر رہے ہیں جن کے بلیک ہول ہونے کا امکان ہو اور وہ بیرون سے مادہ نگلنے کے عمل سے گزر رہے ہوں، ابھی تک کسی ایسے جسم کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکا جس کے بارے میں قائل کر دینے والے دلائل دیے جاسکیں کہ یہی بلیک ہول ہے، لیکن ایک نظام جس کے بارے میں سائنسدان کافی پر امید ہیں مجمع النجوم سلگنس ([Cygnus Constellation](#)) میں واقع ہے اور اسے [Cyg X-1](#) کا نام دیا گیا ہے، اس نظام میں شامل ستارے کو عام دور بین یعنی [Optical Telescope](#) سے دیکھا جاسکتا ہے، اس کے رنگ کی وجہ سے اسے "نیلا جن" قسم کے ستاروں میں رکھا جاتا ہے، سپیکٹر و سکوپ کی مدد سے کیا گیا مطالعہ بتاتا ہے کہ یہ ستارہ اکیلا نہیں ہے، اس ستارے میں آگے پیچھے کی حرکت نظر آتی ہے جو با آہنگ ہے یعنی بے قاعدہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ستارہ اور کوئی دوسرا جسم باہم بہت قریب ایک دوسرے کے مداروں میں موجود ہیں، لیکن ارتعاش میں لاتا ہے، ظاہر ہے کہ ستارہ اور کوئی دوسرا جسم باہم بہت قریب ایک دوسرے کے مداروں میں موجود ہیں، بصری دور بین میں وہ دوسرا ساتھی نظر نہیں آتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دوسرا جسم یا تو "سیاہ" ہے یعنی کوئی تو انائی خارج یا منعکس نہیں کرتا یا پھر بہت ٹھووس اور کم روشن ستارہ ہے، اس سے بلیک ہول کا اشارہ تو ملتا ہے لیکن کوئی ثبوت نہیں۔

ایک اور سراغ اس سیاہ جسم کی کیت سے بھی ملتا ہے، جب ہمیں نیلے ستارے کی کیت معلوم ہو تو نیوٹن کا قانون استعمال کر کے ہم دوسرے ستارے کی کیت معلوم کر سکتے ہیں، اب کسی ستارے کی رنگت اور اس کی کیت کا بھی آپس میں ایک باہمی تعلق ہے، نیلے ستارے گرم ہوتے ہیں اور اس لیے ان کی کیت بھی زیادہ ہوتی ہے، حسابی عمل سے پتہ چلتا ہے کہ اس دوسرے غیر مرئی ساتھی ستارے کی کیت کئی سورجوں کے برابر ہے، چنانچہ اتنا واضح ہے کہ یہ کوئی عام چھوٹا اور مددھم ستارہ

نہیں ہے، بلکہ یہ سفید بونا، نیوٹران ستارہ یا پھر بلیک ہوں ہے، لیکن کچھ بنیادی طبیعتی وجوہات ہیں جن کی بناء پر اس کمیت کا ٹھوس جسم سفید بونا یا نیوٹران ستارہ نہیں ہو سکتا، ہمارا مسئلہ اس شدید قوتِ تجاذب سے متعلق ہے جو جسم کو کچلنے کی کوشش کرتی ہے، کچلے جانے کے نتیجے میں بلیک ہوں بننے سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے کہ مرکز سے باہر کی طرف عمل کرنے والی کوئی قوت موجود ہو جو تجاذب کی بھینچنے والی قوت کو متوازن کر سکے، لیکن اگر مسامار ہوتا ہوا ستارہ کئی سورجوں کی کمیت کا حامل ہے تو پھر کوئی معلوم قوت ایسی نہیں جو کچلتی ہوئی تجاذبی قوت کو متوازن کر کے اس کی مزاحمت کر سکے، اور پھر اگر ستارے کا مرکز اتنا کثیف اور سخت ہو کہ وہ اس تجاذبی دباؤ کو برداشت کر جائے اور کچلانہ جاسکے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ مرکز میں آواز کی رفتار روشنی کی رفتار سے زیادہ ہو گی، اور چونکہ یہ امر آئن شائن کے مخصوص نظریہ اضافت سے مقصود ہے اس لیے زیادہ تر فلکیات دان اور طبیعت دانوں کا یقین ہے کہ ان حالات میں بلیک ہوں کی تشکیل ناگزیر ہے۔

سگنس-X-1 میں بلیک ہوں کے موجود ہونے کی ایک ناقابل تردید شہادت ایک اور مشاہدہ سے بھی ملتی ہے، اسے 1-X کا نام ہی اسی لیے دیا گیا تھا کہ اس سے ایکس ریز بے پناہ شدت سے خارج ہوتی ہیں جن کا سراغ مصنوعی سیاروں پر موجود آلات نے لگایا تھا، بنائے گئے نظری ماؤلوں کی مدد سے ان ایکس رے شاعنوں کی توضیح صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے اگر مذکورہ بالا نظام میں ایک بلیک ہوں کا ہونا مان لیا جائے، حسابی عمل سے اس بلیک ہوں کا تجاذبی میدان اتنا طاقتور ہے کہ وہ اس نیلے ستارے سے مادہ جذب کرتا ہے، جب نیلے ستارے سے اغوا کی گئی گیس بلیک ہوں کی طرف گرتی ہے تو نظام کی گردش کے باعث یہ بلیک ہوں کے گرد گھومنے لگتی ہے اور ایک پلیٹ بنا دیتی ہے، لیکن اس طرح کی گیسی پلیٹ مستحکم نہیں ہوتی، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پلیٹ کا جو حصہ بلیک ہوں کے قریب ہوتا ہے کناروں پر موجود گیس کی نسبت زیادہ تیزی سے گردش کرتا ہے، اب لزوجی قوت (Viscous Force) اس رفتاری فرق کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، نتیجہ کے طور پر گیس گرم ہو کر نہ صرف روشنی بلکہ ایکس رے بھی خارج کرے گی، اس طرح تو انہی کا ضیاع ہو گا اور گیس کم ہوتے ہوئے قطر کے دائروں میں گھومتی بلیک ہوں میں گر جائے گی۔

چنانچہ سگنس-X-1 میں بلیک ہوں موجود ہونے کی شہادت دلائل کے ایک سلسلے پر مبنی ہے جن میں مشاہداتی جزئیات اور نظریاتی ماؤں دونوں شامل ہیں، یہ تحقیق آج کل ہونے والی زیادہ تر فلکیاتی تحقیق کا مثالی نمونہ ہے، اگرچہ کوئی ایک دلیل قطعیت سے فیصلہ کرنے میں مدد نہیں دیتی لیکن سگنس-X-1 اور ایسے ہی دوسرے نظاموں کا مطالعہ کیا جائے تو نتائج کے مشترک تجربی سے اس جگہ ایک بلیک ہوں ہونے کے قوی امکانات ظاہر ہوتے ہیں۔

بڑے بلیک ہولوں کی سرگرمیوں کے نتیجے میں اور بھی عجیب اثرات مشاہدے میں آتے ہیں، ان سے پتہ چلتا ہے کہ بہت سی کہکشاوں کے مرکز میں عظیم کمیت (Super-massive) بلیک ہول پائے جاتے ہیں، ان کہکشاوں کے مرکزوں میں ستاروں کی حرکت سے ایسے بلیک ہولوں کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے، ستارے اس طرح کے رویے کا اظہار کرتے ہیں جیسے انہیں نہایت کثیف اور اوپنجی کشش کا حامل کوئی جسم اپنی طرف کھینچ رہا ہے، ایسے ممکنہ اجسام کی کمیت دس ملین سے کئی ملین سورجوں کے برابر ہو سکتی ہے، اتنی کمیت اور نتیجہ کے طور پر اتنے تجاذب کے باعث یہ گرد و پیش میں موجود مادے کو ہڑپ کرنے کو تیار رہتے ہیں، ستارے، سیارے، گیس اور گرد ہر چیز ان دیوؤں کی بھوک کا ایندھن بن جاتی ہے، ان کے اندر مادے کے گرنے کی یہ ہنگامہ خیزی ساری کہکشاں کے نظام میں گڑبرٹ کرتی ہے، فلکیات کے ماہر کہکشاوں کے مرکز کی سرگرمیوں کے اعتبار سے قسم بندی کرتے ہیں، کچھ کہکشاوں پہٹ کر بکھرتی نظر آتی ہیں اور بہت سی ریڈیو لہروں، ایکس ریز اور توانائی کی دوسری اقسام خارج کرتی ہیں، لیکن سب سے منفرد کہکشاوں کی وہ قسم ہے جن سے گیس کے بہت بڑے دھارے پھوٹتے ہیں، یہ دھارے ہزاروں لاکھوں نوری سال لمبے ہوتے ہیں، ان اجسام میں سے کچھ کا توانائی کا اخراج حیران کن ہے، مثال کے طور پر بہت زیادہ فاصلے پر کواسرز (Quasars) ہزاروں کہکشاوں کے برابر توانائی اتنے حصے سے خارج کرتے ہیں جو ایک نوری سال سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا، غالباً اپنی چھوٹی جسامت کی وجہ سے ہی یہ بظاہر ستارے لگتے ہیں۔

بہت سے فلکیات دانوں کا خیال ہے کہ اتنی شدت سے پھٹتے ہوئے ان اجسام کی کارگزاری کے ذمہ دار بہت بڑے بلیک ہول ہیں جو اپنے گرد گھومتے رہتے ہیں، یہ اپنے گرد و پیش میں موجود مادہ نگلتے رہتے ہیں، ان کے حلقة اثر میں داخل ہونے والا کوئی بھی سیارہ یا تو تجاذب کے زیر اثر ٹکٹرے ہو کر بکھر جاتا ہے یا پھر دوسرے ستاروں سے ٹکرا کر ٹوٹ جاتا ہے۔

سگنٹس-X کے نمونے پر، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ مادہ امکانی طور پر گرم گیس کے ایک چھلے کی صورت بلیک ہول کے گرد گردش کرے گا اور رفتہ رفتہ اس میں غرق ہو جائے گا، مئی 1994 میں روپورٹ دی گئی کہ ہبل دوربین (Hubble) نے کہکشاں M87 کے مرکز میں تیزی سے گھومتی ہوئی ایک گیسی پلیٹ دریافت کی ہے۔

ہو سکتا ہے کہ اس گیسی ڈسک سے بے پناہ توانائی خارج ہو کر بلیک ہول کی طرف جاری ہے اور وہ اسے ہول کے محور کے متوازی حرکت دیتی ہو اور نتیجے کے طور پر مختلف سمتی فواروں کا جوڑا جنم لیتا ہو، اس قسم کے فوارے مشاہدے میں بھی آئے ہیں، توانائی کے اخراج کے اس طرزِ اخراج کے تشکیل میں بر قی مقناطیسی، نزوجی اور دوسری قوتوں کے ساتھ ساتھ تجاذب کا بھی ہاتھ ہوتا ہے، اس موضوع پر ابھی بہت سا مشاہداتی اور نظریاتی کام ہونا باقی ہے۔

ہماری کہکشاں یعنی ثریا ([Milky way](#)) کا کیا بنے گا؟ کیا یہ امکان موجود ہے کہ اسے بھی بالآخر پھٹ جانا ہے؟ اس کا مرکز تیس ہزار نوری میل دور مجمع النجوم سیچھی ٹیریں ([Sagittarius Constellation](#)) میں ہے، اگرچہ اس میں گیس اور غبار کے بہت بڑے بڑے بادلوں کی موجودگی کے باعث مشاہدہ مشکل ہے لیکن ایکس ریز، گیما ریز، اور انفاریڈ آلات کی مدد سے کیے گئے مطالعہ سے یہاں بہت کثیف (Compact) اور توانا مرکز [Sagittarius A](#) کی موجودگی کے بالواسطہ شواہد ملتے ہیں، اگرچہ یہ جسمات میں صرف چند ملین کلو میٹر ہے (جو فلکیاتی فاصلوں کے حوالے سے واقعی چھوٹا سا فاصلہ ہے) لیکن یہ ہماری کہکشاں میں ریڈیو شعاعوں کا سب سے طاقتور مرکز ہے، اس کا محل وقوع انفاریڈ شعاعوں کے ایک طاقتور مرکز کے ساتھ منطبق ہے، ایکس ریز کا ایک مرکز بھی اس کے قریب پایا جاتا ہے، اگرچہ صورتحال کافی پیچیدہ ہے لیکن یہاں کسی بلیک ہول کے موجود ہونے کے امکانات بڑھتے جا رہے ہیں جو مشاہدے میں آنے والے کچھ مظاہر کی وجہ اور منبع خیال کیا جاتا ہے، تاہم اس کی کمیت صرف دس ملین سورجوں کے برابر ہے، بہ اعتبار کمیت یہ بلیک ہولوں کی فہرست میں سب سے نیچے آتا ہے، تو انائی اور مادے کا جیسا شدید اخراج دوسرا کہکشاوں کے مرکزوں میں ہو رہا ہے اس قسم کے اخراج کی کوئی شہادت نہیں ملی، لیکن اس بلیک ہول کا ابھی ابتدائی مرحلے میں ہونا بھی اس کی وجہ ہو سکتی ہے، لیکن مستقبل میں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی بھڑک اٹھے اور ایسا غالباً گرد و پیش سے گیس کی مناسب سپلائی ملنے کی صورت میں ہو گا، لیکن اس کی شدت کسی بھی صورت دوسرے معلوم نظاموں کی سی نہیں ہوگی، ابھی یہ واضح نہیں ہو سکا کہ اس طرح کی شعلہ فتنی کہکشاں کے بازوؤں میں موجود ستاروں اور سیاروں پر کیا اثرات مرتب کرے گی۔

جب تک کسی بلیک ہول کے گرد اس کی بھوک مٹانے کے لیے مادہ موجود رہے گا اس کی ساکن کمیت تو انائی خارج ہوتی رہے گی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بلیک ہول زیادہ سے زیادہ مادہ نگلتا جائے گا اور ہول زیادہ بڑے اور زیادہ بھوکے ہوتے چلے جائیں گے، حتیٰ کہ ہول کے مدار میں موجود بہت دور دراز کے ستارے بھی اس کی زد میں آجائیں گے، اس کی وجہ ایک بہت کمزور لیکن بالآخر فیصلہ کن قوت ہے جسے تجازی شعاعیں کہتے ہیں۔

1915 میں اضافیت کے عمومی نظریے کی تشكیل کی کچھ مدت بعد آئن سٹائن نے تجازی میدان کی ایک اہم خصوصیت دریافت کی، اس نظریے کی میدانی مساواتوں کے مطالعے سے اس نے موج نما تجازی اہتزاز کی پیش گوئی کی، اس تجازی موج کی رفتار خلاء میں روشنی کے برابر تھی، اگرچہ تجازی لہریں بھی تو انائی کی اچھی خاصی مقدار کی حامل ہوتی ہیں لیکن، برقرار مقناطیسی لہروں کے بر عکس، مادے کے ساتھ ان کا تعامل مختلف ہوتا ہے، ریڈیو لہریں تار کے جال میں بھی جذب ہو جاتی ہیں

لیکن تجاذبی موجود یا لہروں کا تعامل اتنا کمزور ہے کہ یہ زمین میں سے بھی گزر جائیں تو ان میں کوئی قابل ذکر تبدیلی نہیں آتی، اگر تجاذبی لہروں کی لیزر بنائی جاسکے تو پانی کی ایک کیتیلی ابالنے کے لیے ایک ٹریلین کلو وات شعاع کی ضرورت ہو گی، اتنا ہی کام ایک کو وات بجلی کے کوائل سے بھی کیا جاسکتا ہے، تجاذبی موجود کی اس تقابلی کمزوری کو اس حقیقت سے بھی منسلک کیا جاسکتا ہے کہ فطرت کی تمام معلوم قوتوں میں سے تجاذب کمزور ترین قوت ہے، ایک ایٹم میں برتنی اور تجاذبی قوت کی نسبت ایک اور<sup>40</sup> کی ہے، تجاذب کے منظر پر آنے کی وجہ اس کا مجتمع Cumulative ہونا ہے، چنانچہ سیاروں اور دوسرے بڑے اجسام میں یہ دوسری قوتوں پر غالب آ جاتی ہے۔

اصولی طور پر جب مادے کی کسی بھی حالت میں تبدیلی لائی جاتی ہے یعنی کہ اس میں حرکی حالت کا بگاڑ پیدا کیا جاتا ہے تو تجاذبی شعاعیں پیدا ہوتی ہیں، مثلاً زمین سورج کے گرد دورانِ گردش مسلسل تجاذبی لہروں پیدا کرتی ہے لیکن ان کی مجموعی طاقت ملی وات میں ہوتی ہے، تو انائی کا یہ اخراج زمین کے مدار میں زوال کا سبب بنتا ہے، ہر چند یہ زوال ناپید ہونے کی حد تک کم شرح سے ہوتا ہے یعنی کہ ہر دس سال کے بعد سینٹی میٹر کے ایک ہزار ٹریلین حصوں میں سے ایک۔

لیکن جب معاملہ بہت بھاری اجسام کا ہو جو روشنی کی رفتار یعنی کہ رفتارِ نور سے قابلِ تقابل رفتاروں سے حرکت کر رہے ہوں تو صورتحال ڈرامائی طور پر بدل جاتی ہے، دو طرح کے مظہر ہیں جو اہم تجاذبی اشعاع کاری اثرات لاسکتے ہیں، ان میں سے ایک اچانک اور پُر ہنگام (Violent) طور پر وقوع پذیر ہوتا ہے یعنی سپر نووا، اس میں کوئی ستارہ منہدم ہو کر بلیک ہوں کی شکل اختیار کر جاتا ہے، یوں تجاذبی موجود کی ایک لہر پیدا ہوتی ہے جو عام طور پر<sup>44</sup> 10 جول تو انائی کی حاصل ہوتی ہے اور صرف چند مائیکرو سینکڑ تک خارج ہوتی رہتی ہے، تقابل کی غرض سے سورج پر غور کریں جو  $3 \times 10^{26}$  جول فی سینکڑ خارج کرتا ہے، دوسرے مظہر ایک دوسرے کے گرد مداروں میں تیز رفتاری سے گردش کرنے والے بھاری اجسام ہیں، مثلاً دو ایسے ستاروں کا ایک نظام جسے ثانی نظام کہتے ہیں تجاذبی شعاعوں کا مسلسل دھارا خارج کرتا ہے، اس نظام کی کارکردگی اس وقت خصوصاً زیادہ ہوتی ہے جب گردش کرنے والے اجسام منہدم شدہ اجسام فلکی ہوں یعنی کہ نیوٹران ستارے یا بلیک ہوں ہوں، مجمع النجوم Aquila میں دو نیوٹران ستارے ایک دوسرے کے گرد گردش میں ہیں اور ان کا درمیانی فاصلہ محض چند ملیوں کلو میٹر ہے، ان کے تجاذبی میدان اتنے طاقتور ہیں کہ ہر ستارہ اپنا مداروی چکر صرف آٹھ گھنٹے کے اندر اندر کمل کر لیتا ہے، ان ستاروں کی مداروی رفتار کا رفتارِ نور یعنی روشنی کی رفتار سے تقابل کیا جاسکتا ہے، اس غیر معمولی رفتار کی وجہ سے تجاذبی لہروں کی شرح اخراج بڑھ جاتی ہے اور ان کے مدار کے انحطاط میں بھی قابل پیمائش کی آتی ہے، ہر ایک چکر کے

بعد ان کا دورانیہ 75 ماںکروں سینڈ کم ہو جاتا ہے، ان ستاروں کو تقریباً تین سو ملین سال کے بعد باہم مدغم ہو جانا ہے۔

ماہرین فلکیات کے حساب کے مطابق فی لاکھ سال فی کھلکھل ایسا ایک واقعہ رونما ہوتا ہے، یہ اجسام اتنے ٹھوس ہیں اور ان کے تجاذبی میدان اتنے شدید ہیں کہ ٹکرانے سے پہلے آخری لمحات میں یہ ایک دوسرے کے گرد فی سینڈ ہزاروں چکر لگاتے ہیں، تجاذبی لہروں کی فریکوپینسی تیزی سے بڑھتی ہے، یہ تیکھی تیزی اسی طرح کے واقعات کے ساتھ وابستہ ہے، آئن سائن کے فارمولے سے نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس آخری مرحلے میں طاقت کا اخراج بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور مدار میں تیزی سے زوال آتا ہے، اس باہمی تجاذبی کشش کے بہت زیادہ ہونے کا نتیجہ سیاروں کے بگاڑ کی شکل میں لکھ گا، دونوں ستارے دیو ہیکل سگاروں کی شکل اختیار کر جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے گرد چکر لگا رہے ہیں۔

یہ احترازات بھی تجاذبی شعاعوں کی خاص مقدار خارج کریں گے جو اس جسم سے تو انائی کو مزید نپھوڑنے کا سبب بنیں گے، حتیٰ کہ جسم ساکت ہو جائے گا اور ہر طرح کی سرگرمی ختم ہو جائے گی۔

ہر چند کہ تو انائی کی شرح اخراج بہت کم ہے لیکن تجاذبی لہروں کے اخراج کا کائناتی ساخت پر دور رس اثرات مرتب کرنے کا قوی امکان ہے، Aquila کے ثانی ستاروی نظام ([Binary Star System](#)) کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا مداروی انجام آئن سائن کے نظریے کے عین مطابق ہے، چنانچہ یہ نظام تجاذبی لہروں کے اخراج کی براہ راست شہادت مہیا کرتا ہے، لیکن زیادہ فیصلہ کن امتحان کے لیے ضروری ہے کہ ان لہروں کا سراغ زمین پر موجود کسی تجربہ گاہ میں لگایا جاسکے، محققین کے کئی گروہوں نے ایسے آلات بنائے ہیں جن کا مقصد مختصر وقفہ کے لیے گزرنے والی تجاذبی لہر کی اس دھار کا سراغ لگانا ہے، لیکن تعالیٰ کوئی بھی آله اتنا حساس ثابت نہیں ہوا کہ وہ یہ کام کر سکے، لگتا ہے کہ ان لہروں کا سراغ لگانے اور ان کے وجود کی تجربی تصدیق کے لیے ہمیں سراغ کندوں کی ایک نئی نسل کے معرض وجود میں آنے کا انتظار کرنا ہو گا۔

ذکورہ بالا ادغام سے یا تو زیادہ بڑا نیوٹران ستارہ بتتا ہے یا پھر بلیک ہول معرض وجود میں آتا ہے، لیکن اگر ادغام ایک نیوٹران ستارے اور بلیک ہول کا ہوتا ہے یا دو بلیک ہولوں کا ہوتا ہے تو ہر دو صورتوں میں ایک بلیک ہول ہی بتتا ہے، اس عمل میں تجاذبی موجی قوت کا اخراج ہوتا ہے، پھر Ringing اور Wobbling کا پیچیدہ عمل ہوتا ہے جو رفتہ رفتہ تجاذبی لہروں کے ذریعے سے ہونے والی تو انائی کے ضیاء کے ہاتھوں ختم ہو جاتا ہے۔

دو بلیک ہولوں کے ادغام سے تجاذبی تو انائی کے اخراج کی زیادہ ممکن مقدار کا نظریاتی مطالعہ دلچسپی سے خالی نہیں،

70 کی دہائی کے اوائل میں راجر پن روز (Roger Penrose)، سٹی芬 ہانگ (Stephen Hawking)، اور نیشنل کارٹر (Brandon Carter) نے ان عملوں پر نظریاتی کام کیا، ریمو روفینی (Remo Ruffini)، اور لیری سمار (Larry Smarr) نے ان عملوں پر نظریاتی کام کیا، اگر تو بلیک ہول گھماو میں نہیں اور ان کی کمیت یکساں ہے تو گل ساکن کمیت تو انائی کا 29 فیصد تو انائی کی صورت خارج ہو جائے گا، اگر کوئی ایسا طریقہ موجود ہو کہ ان بلیک ہولوں پر باہر سے اثر انداز ہوا جاسکے اور ان کے عمل میں مداخلت کی جاسکے تو لازم نہیں کہ ساری تو انائی تجاذبی قوت کی صورت خارج ہو، لیکن اپنی فطری حالت میں، جس میں مداخلت ابھی محض دور از کارِ تخیل ہے، زیادہ تر تو انائی اسی غیر واضح شکل میں ہوگی، لیکن اگر ستارے ایک دوسرے سے اٹھے گھماو کی حالت میں ہیں اور رفتار طبیعت کے قوانین کی حدود میں زیادہ سے زیادہ ہے یعنی کہ رفتارِ نور کے قریب ہے تو ان کی ساکن حالت کمیت کا پچاس فیصد تجاذبی لہروں کی صورت تو انائی بن کر خارج ہو جائے گا، لیکن تو انائی کے زیادہ سے زیادہ اخراج کی ایک نظریاتی حد تک جہاں تک مذکورہ بالا تو انائی ابھی تک نہیں پہنچی، بلیک ہول برقی چارج کا حامل بھی ہو سکتا ہے، چارج شدہ ہول برقی اور مقناطیسی دونوں میدانوں کا حامل ہو گا، ہر دو تو انائی کا ذخیرہ کر سکتے ہیں، اگر ثابت چارج کے حامل بلیک ہول کا ادغام پہنچی چارج کے بلیک ہول سے ہوتا ہے تو ایک "ڈسچارج" ہو گا اور برقی مقناطیسی اور تجاذبی دونوں صورتوں میں تو انائی خارج ہو گی۔

چونکہ بلیک ہول کے زیادہ سے زیادہ برقی چارج کی ایک حد ہے، اس لیے یہ ڈسچارج بھی لامحدود نہیں ہو گا، اگر ایک بلیک ہول گھماو کی حالت میں نہیں ہے تو اس کے چارج کی حد کا اندازہ لگانے کے لیے مندرجہ ذیل امور کو زیر غور لانا ہو گا، فرض کیجیے کہ دو بلیک ہولوں پر یکساں چارج ہے، ان کے تجاذبی میدان کشش باہمی کھنچاؤ پیدا کریں گے جبکہ برقی میدانوں کے باعث دافع قوت عمل میں آئے گی کیونکہ ایک جیسے چارج قوت دافع لگاتے ہیں، جب چارج کمیت کی نسبت ایک خاص حد تک پہنچتی ہے تو دونوں قوتیں متوازن ہو کر ایک دوسرے کو منسوخ کرتی ہیں اور کوئی حاصل قوت نہیں بچتی ہے، یہی وہ شرط ہے جو کسی بلیک ہول کے زیادہ سے زیادہ چارج کی حد متعین کرتی ہے، اگر بلیک ہول پر چارج اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کی جائے تو کیا ہو گا؟ چارج بڑھ جائے گا لیکن برقی دافع قوت پر قابو پانے کے لیے کام کرنا پڑے گا جس میں تو انائی گلے گی، یہ تو انائی بلیک ہول کو ملے گی اور اس کی کمیت میں اضافہ ہو جائے گا ( $E=mc^2$ ) چنانچہ بلیک ہول کی کمیت بھی بڑھے گی اور جم بھی، سادہ سا حساب کتاب ظاہر کرے گا کہ چارج میں جتنا اضافہ ہو گا اس سے زیادہ اضافہ کمیت میں ہو گا، چارج اور کمیت کی نسبت بجائے بڑھنے کے کم ہونا شروع ہو جائے گی، چنانچہ زیادہ سے زیادہ چارج کی حد سے بڑھنے کی کوشش ناکام ہو جائے گی۔

بلیک ہول پر موجود چارج کا اس کی کمیت میں بھی حصہ ہوتا ہے، اگر کسی بلیک ہول پر چارج زیادہ سے زیادہ حد تک موجود ہو تو اس کی گل کمیت کا نصف بر قی چارج کی وجہ سے ہوتا ہے، اگر بلیک ہول گھماو میں نہیں اور اس پر مختلف چارج ہیں تو ان کے درمیان قوتِ کشش تجاذبی اور بر قی مقنای طیسی دونوں قوتوں کا جمعی حاصل ہوگی، ان کے ملنے کی صورت میں بر قی چارج معتدل ہو جائے گا اور بر قی توانائی گل کا ساکن کمیت توانائی کے پچاس فیصد کے برابر ہوگی۔

اس طرح کے حصولِ توانائی کی مطلق آخری حد کی شرائط یہ ہیں کہ دونوں ہول گھماو میں ہوں اور ان پر مختلف چارج زیادہ سے زیادہ حد تک ہو، اس صورت میں خارج شدہ توانائی گل ساکن کمیت توانائی کے دو تھائی کے برابر ہوگی، بلاشبہ یہ تمام تر تفصیلات صرف نظری دلچسپی کے حامل ہیں کیونکہ عملی طور پر بلیک ہولوں پر اتنا چارج نہیں ہوتا اور نہ ہی بلیک ہول اس انداز میں مدغم ہوتے ہیں کہ زیادہ توانائی کے لیے درکار نمونے کا اتباع ہو سکے، ایسا تو صرف کوئی بہت ترقی یافتہ نسل کرو سکتی ہے، لیکن اگر ان کا یہ ادغام اتنے موثر انداز میں نہ ہو تو بھی ان کی گل ساکن کمیت توانائی کا قابل ذکر حصہ فوراً خارج ہو جائے گا، یہ توانائی مقدار میں ستاروں سے خارج ہونے والی توانائی سے کچھ کم نہیں ہوگی جو اپنی کئی بلین سال کی زندگی میں اپنی گل کمیت کا صرف ایک فیصد توانائی کی صورت خارج کرتے ہیں۔

ان تجاذبی عмلوں کی اہمیت یہ ہے کہ جلا ہوا ستارہ بطور منہدم Cinder کے اپنے تھر مو نیو کلیئر مرحلے سے زیادہ توانائی خارج کر سکتا ہے حالانکہ تب وہ گیس کا دہلتا ہوا گولہ تھا، جب کوئی بیس برس پہلے اس حقیقت کا اکٹشاف ہوا تو اصطلاح "بلیک ہول" کے خالق جان و ہیلر (John Archibald Wheeler) نے ایک فرضی تہذیب کی نقشہ کشی کی جو توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات کے ہاتھوں اپنے ستارے کو چھوڑ کر ایک گھومتے ہوئے بلیک ہول کے گرد آباد ہو گئے تھے، یہ آبادی ہر روز اپنا کوڑا کر کٹ گاڑیوں میں لاد کر احتیاط سے منتخب کیے گئے راستے پر بلیک ہول کی طرف روانہ کر دیتے ہیں، ہول کے نزدیک کوڑا کر کٹ ہول کی طرف انڈیل دیا جاتا ہے یعنی کہ اس سے ہمیشہ کے لیے چھکارا پالیا جاتا ہے، جب یہ کوڑا ہول کے گھماو کی الٹ سمت چکردار راستے پر گھومتا ہوا گرتا ہے تو اس پر ایک طرح کی بریک کا اثر ہوتا ہے، اس سے ستارے کی گھماو کی قوت خارج ہوتی ہے اور وہ آبادی اس توانائی کو قابو کر کے استفادہ کرتی ہے۔

اس عمل کا دھرا فائدہ ہوتا ہے، کوڑے سے بھی نجات مل جاتی ہے اور توانائی کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے، یوں بوقتِ ضرورت یہ آبادی مردہ ستارے سے اس سے بھی زیادہ توانائی حاصل کر سکتی ہے جتنی وہ زندہ حالت میں فراہم کر سکتا تھا۔

اگرچہ بلیک ہول سے خارج ہونے والی تو انائی قابو کرنا سائنس فشن کا منظر لگتا ہے لیکن بلیک ہول میں تمام مادہ بہر حال غائب ہو جاتا ہے، مردہ ستارے کے اپنے مادے کے علاوہ ہول کے قریب آنکھے والا کوئی ملبہ وغیرہ اس میں ہمیشہ کے لیے غائب ہو جاتا ہے، میں جب بھی بلیک ہول پر یکچھ دیتا ہوں تو لوگ ہمیشہ جانا چاہتے ہیں کہ اس مادے کے ساتھ بالآخر کیا ہوتا ہے، اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ ہم نہیں جانتے!! بلیک ہول پر ہمارا جتنا بھی اور جیسا بھی علم ہے سب نظری غور و فکر اور ریاضیاتی ماذلوں پر مبنی ہے، درحقیقت بلیک ہول کی جو تعریف کی جاتی ہے اس کی رو سے ہی ہم بلیک ہول کے اندر وہ م مشاہدہ نہیں کر سکتے، بفرضِ محل ہماری بلیک ہول تک مشاہداتی رسائی ہو بھی تو ہم دیکھ نہیں سکتے کہ اندر کیا ہو رہا ہے، تاہم نظریہ اضافت جو بلیک ہول کے وجود کی پیش گوئی کا ذمہ دار ہے، اس کے اندر گرنے والے خلاء نور پر گزرنے والی کیفیات پر کچھ روشنی ڈالتا ہے، ذیل میں نظریاتی استخراج کا ایک سادہ بیان دیا جا رہا ہے۔

بلیک ہول کی سطح کوئی حقیقی ساخت نہیں ہے بلکہ صرف ریاضیاتی ماذل ہے، وہاں محض خالی جگہ ہے، جب خلاء نور د اس سطح سے گزر کر بلیک ہول کے اندر وہ میں کی طرف بڑھتا ہے تو اسے کسی خاص فرق کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن اس سطح کی اپنی طبعی بلکہ ڈرامائی بھی اہمیت ہے، ہول کے اندر تجاذب اتنا شدید ہے کہ یہ روشنی کے فوٹون کو بھی پکڑ لیتا ہے اور باہر نہیں جانے دیتا، مطلب یہ ہوا کہ روشنی اس کے اندر سے باہر نہیں جاسکتی یہی وجہ ہے کہ یہ سیاہ نظر آتا ہے، چونکہ کوئی بھی جسم یا چیز رفتارِ نور سے زیادہ تیز نہیں ہو سکتی اس لیے جب کوئی جسم ایک مرتبہ اس میں پھنس جاتا ہے یعنی یہ حد عبور کر لیتا ہے تو کبھی باہر فرار نہیں ہو سکتا، بلیک ہول کے اندر رونما ہونے والے واقعات بیرونی دنیا کے علم میں کبھی نہیں آتے، یہی وجہ ہے کہ ہول کی سطح کو وقوعی افق ([Event Horizon](#)) کہتے ہیں، یہ سطح ہول کے بیرون اور اندر وہ میں ہونے والے واقعات کے ما بین حدِ فاصل کا کام کرتی ہے، بیرون میں ہونے والے واقعات اندر سے دیکھے جاسکتے ہیں، لیکن جو واقعات اس سطح کے اندر کی طرف ہوتے ہیں باہر سے نہیں دیکھے جاسکتے، چنانچہ جو خلاء نور د اس حدِ فاصل کے اندر ہول کی جانب موجود ہے بیرونی دنیا کو دیکھ سکتا ہے جبکہ باہر سے کوئی شخص اس خلاء نور د کو نہیں دیکھ سکتا۔

جوں جوں خلاء نور د اندر ہول کی طرف بڑھتا ہے اس پر قوتِ تجاذب بڑھتی چلی جاتی ہے، اس کا ایک اثر جسم کا ظاہری بگاڑ ہے اب اگر خلاء نور د پاؤں کے بل ہول میں گر رہا ہے تو سر کی نسبت پاؤں ہول کے نزدیک ہوں گے، اس لیے سر کی نسبت پاؤں پر زیادہ قوتِ تجاذب عمل کرتی ہے، نتیجہ کے طور پر جسم کھپتا ہے اور لمبائی میں بڑھ جاتا ہے، دونوں کندھوں پر لگنے والی دو قوتیں ایک نقطے یعنی کہ ہول پر ملتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ خلاء نور د کا جسم چوڑائی کے رخ سکڑے گا،

لمبائی میں اضافہ اور چوڑائی میں کمی کے اس عمل کو "سویاں بننے کا عمل" کہا جاسکتا ہے۔

نظریاتی حساب بتاتا ہے کہ بلیک ہول کے مرکز میں تجاذب لا انتہاء طور پر بڑھتا ہے، تجاذبی میدان اپنا اظہار ایک خمیدہ خط یا مکان و زمان کے بگاڑ کی صورت کرتا ہے، اس لیے تجاذبی میدان کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ زمان و مکان کا لپیٹ لا انتہاء طور پر بڑھتا ہے، ریاضی دان اس خصوصیت کو زمان و مکان کی یکجاں یا وحدانیت (Singularity) کہتے ہیں، یہی وہ حد یا کنارہ ہے جس سے آگے زمان و مکان کا روایتی تصور ختم ہو جاتا ہے، بہت سے طبیعت دانوں کا یقین ہے کہ بلیک ہول کے اندر یہ یکجاں یا وحدانیت زمان و مکان کے خاتمے کو ظاہر کرتی اور اس سے دوچار ہونے والا مادہ معدوم ہو جاتا ہے، اگر ایسا ہے تو پھر خلاء نورد کے جسم کے ایٹم تک اس وحدانیت میں معدوم ہو جائیں گے۔

اگر بلیک ہول کی کمیت دس ملین سورجوں کے برابر ہے، جیسا کہ ثریا یعنی ہماری کہشاں میں پائے جانے والے بلیک ہول کی ہے، اور یہ گھومتا نہیں تو خلاء نورد کو وقوعی افق سے نیست و نابود کر دینے والی وحدانیت تک سفر میں تین منٹ لگیں گے، یہ آخری تین منٹ بہت تکلیف دہ ہوں گے، یہاں تک جانے سے بہت پہلے بے چارہ خلاء نورد سویاں بننے کے عمل کے ہاتھوں مرچکا ہو گا، اس آخری مرحلے میں بھی خلاء نورد کسی طرح بھی اس مہلک وحدانیت کو دیکھ نہیں سکے گا کیونکہ وہاں سے روشنی باہر کی جانب نہیں آتی، اگر زیر بحث بلیک ہول کی کمیت سورج کے برابر ہے تو اس کا نصف قطر تین کلو میٹر ہو گا اور خلاء نورد کو وقوعی افق سے وحدانیت تک جانے میں محض چند مانگرو سینڈ لگیں گے۔

خلاء نورد کے حوالے کے فریم میں اس کی تباہی میں جتنا وقت صرف ہوتا ہے بہت تیزی سے گزرتا ہے لیکن ہول میں وقت کی لپیٹ اس نوعیت کی ہے کہ باہر سے دیکھنے پر یہ آخری وقت کی حرکت بہت سست نظر آتی ہے۔

خلاء نورد جیسے جیسے وقوعی افق کے قریب ہوتا جاتا ہے، دور دراز سے مشاہدہ کرنے والے کے لیے واقعات کی رفتار کم تر ہوتی چلی جاتی ہے، اصل میں تو خلاء نورد کو اس وقوعی افق تک پہنچ جانے میں لا انتہاء وقت لگے گا چنانچہ دور دراز سے جو حرکت ابدی نظر آئے گی وہی خلاء نورد کے لیے مانگرو سینڈ میں ختم ہو جائے گی، یوں بلیک ہول کائنات کے اختتام کی طرف ایک دروازہ ہے، چنانچہ بلیک ہول کائنات کا ایسا چھوٹا علاقہ ہے جہاں وقت ختم ہو جاتا ہے، جو کائنات کے انجمام پر مجسس ہے بلیک ہول میں چھلانگ کر خود براہ راست مشاہدہ کر سکتا ہے۔

اگرچہ تجاذب فطرت کی معلوم قوتوں میں سے کمزور ترین ہے لیکن اس کا مجموعی اثر نہ صرف اجرام فلکی بلکہ بحیثیتِ مجموعی

کائنات کے مقدار کا تعین کرنے میں فیصلہ کن کردار ادا کرے گا، وہی قوت جو ایک ستارے کو بھیج سکتی ہے وہ کائنات کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرے گی، اس کائناتی کشش کی مقدار اور ممکنہ کردار اور انحصار خود کائنات کے وزن پر ہے، چنانچہ ہمیں قوتِ تجاوز کے فیصلہ کن کردار کا تعین کرنے کے لیے کائنات کا وزن کرنا ہو گا۔

## کائنات کا وزن

کہتے ہیں کہ جو اوپر جاتا ہے اسے لازماً نچے آنا ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہر چیز کو تجاذب کی قوت کھینچتی ہے تاکہ اس کی پرواز کی رفتار کم کر کے اسے نیچے کھینچ لے، لیکن ایسا ہمہ نہیں ہوتا، اگر جسم ایک خاص حد سے زیادہ رفتار سے حرکت کرے تو زمین کی کشش سے مکمل طور پر آزاد ہو کر پھر کبھی واپس نہ آنے کے لیے خلاء میں نکل سکتا ہے۔

مصنوعی سیاروں کو خلاء میں پہنچانے والے راکٹ یہ رفتار حاصل کرنے کا اہتمام کر لیتے ہیں۔

یہ خلائی رفتار 11 کلو میٹر فی سینٹ لیٹنے یعنی 25000 میل فی گھنٹہ ہے جو کنکارڈ کی رفتار کے بیس گنا سے بھی زیادہ ہے، اس خاص رفتار کا انحصار زمین کی کمیت یعنی زمین میں مادے کی مقدار اور اس کے نصف قطر پر ہے، کسی جسم کی کمیت جتنی کم ہوگی اس کی سطح کی کشش اتنی بھی زیادہ ہوگی، نظام شمسی سے فرار کا مطلب اس کی کشش پر حاوی ہونا ہو گا جس کے لیے 618 کلو میٹر فی سینٹ کی رفتار درکار ہوگی، نیوٹران ستاروں جیسے انتہائی ٹھوس اجسام سے فرار کے لیے دسیوں ہزار کلو میٹر فی سینٹ کی توانائی کی ضرورت ہوگی جبکہ بلیک ہول کے لیے یہی رفتار روشنی کی رفتار یعنی 3 لاکھ کلو میٹر فی سینٹ ہوگی۔

کائنات سے فرار کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسا کہ باب دوئم میں بتایا گیا تھا کہ کائنات کا بظاہر کوئی کنارہ نہیں کہ اسے چھوڑا جائے یعنی اس سے فرار ہوا جائے، لیکن اگر ہم مان لیں کہ کنارہ موجود ہے اور ہماری حدِ مشاہدہ پر یعنی پندرہ بلین نوری سال کے فاصلے پر ہے تو پھر روشنی کی رفتار ہی رفتاری رفتار ہوگی، یہ نتیجہ بہت اہم ہے کیونکہ دور دراز کی کہکشاںیں ہم سے رفتارِ نور سے قریب رفتار سے پڑے ہٹ رہی ہیں اگر صرف یہ رفتار ہی دیکھی جائے تو اوپر اخذ شدہ نتیجہ کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ یہ کہکشاںیں کائنات سے یا کم از کم ایک دوسرے سے کبھی واپس نہ آنے کے لیے فرار ہو رہی ہیں۔

اگرچہ کائنات کی کوئی واضح حد بندی نہیں ہے لیکن لگتا ہے کہ پھیلیتی کائنات کا روایہ زمین پر سے اوپر پھینکنے گئے جسم کے رویے کے ساتھ گہری مماثلت رکھتا ہے، اگر کائناتی پھیلاوہ کی رفتار ایک خاص حد تک تیز ہو تو ہتھی کہکشاںیں کائنات کے دوسرے تمام مادے کی مجموعی تجاذبی قوت کشش پر غالب آکر فرار ہو جائیں گی، اور پھیلاوہ ہمیشہ جاری رہے گا، جبکہ بصورت دیگر اگر رفتار اس خاص حد سے کم ہے تو پھیلاوہ بالآخر رک جائے گا اور کائنات واپس سکرنے لگے گی، کہکشاںیں "ینچے" کے سفر کے آخر میں باہم متصادم ہوں گی اور کائنات منہدم ہو جائے گی۔

کون سا منظر و قوع پذیر ہو گا؟ جواب کا انحصار دو اعداد کے مقابل پر ہے، ایک تو پھیلاوہ کی رفتار ہے اور دوسری تمام کائنات کی مشترکہ تجاذبی کشش ہے جس کا انحصار کائناتی وزن پر ہے، یہ کشش جتنی زیادہ ہو گی اس پر غالب آنے کے لیے اتنی ہی زیادہ رفتار کی ضرورت ہو گی، شرح پھیلاوہ سرخ تبدل کے مشاہدے سے براہ راست مشاہدے سے معلوم کی جاسکتی ہے، لیکن اس پر ابھی تک کچھ اختلاف رائے پایا جاتا ہے، دوسری مقدار یعنی کہ کائنات کا وزن اور بھی زیادہ مسائل کا حامل ہے۔

آپ کائنات کا وزن کس طرح کریں گے؟ کام کافی مشکل ہے ظاہر ہے ہم یہ وزن براہ راست نہیں کر سکتے، تاہم نظریہ تجاذب کے اطلاق سے وزن کے بارے میں استخراج کیا جاسکتا ہے، اس کے کم از کم وزن کو سادہ سے طریقے سے معلوم کیا جاسکتا ہے، سیاروں پر سورج کی کشش سے اس کے وزن کا حساب لگایا جاسکتا ہے، اب ہم جانتے ہیں کہ ہماری کہکشاں میں اوسطاً سورج جتنا وزن رکھنے والے ستاروں کی تعداد تقریباً ایک سو ملین ہے، یوں ہم کہکشاں کے کم از کم وزن کا موٹا سا اندازہ لگا سکتے ہیں، اب ہم کائنات میں کہکشاوں کی گل تعداد شمار کریں گے، اندازے پر مبنی شماریات کے مطابق کوئی دس بلین کہکشاںیں کائنات میں موجود ہیں، ان کا گل وزن  $10^{21}$  شمسی اوزان کے برابر ہوا یعنی  $10^{48}$  ٹن، اگر کہکشاوں کے اس اجتماع کا نصف قطر دس بلین سال لیا جائے تو ہم کائنات سے فرار کی کم از کم رفتار کا حساب لگا سکتے ہیں، یہ رفتار نور کا ایک فیصد نکلتا ہے، چنانچہ اگر ہم کائنات کا وزن صرف نظر آنے والے ستاروں کے پیش نظر معلوم کریں تو پھر کائنات خود اپنی ہی تجاذبی کشش پر غالب آجائے گی اور لامحدود محور پر پھیلتی چلی جائے گی، کبھی واپس نہیں آئے گی یعنی سکونے کا عمل شروع نہیں ہو گا۔

بہت سے سائنسدان اس خیال کے حامی ہیں، لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو اس کے قائل نہیں اور کہتے ہیں کہ کائنات کا وزن درست طور پر حساب میں نہیں لایا گیا ہے، ایسے فلکی اجسام بھی موجود ہیں جو نظر نہیں آتے کیونکہ فلکی اجسام روشنی خارج نہیں کرتے، مدھم ستارے، سیارے اور بلیک ہول ہماری توجہ حاصل نہیں کر پاتے، اور پھر گیس اور غبار بھی ہے جس

کا زیادہ تر حصہ غیر مریٰ ہے، پھر کہشاوں کی درمیانی فضاء بھی مادے سے مکمل طور پر خالی نہیں ہے، ان جگہوں پر گیس بڑی مقدار میں موجود ہونے کا امکان ہے۔

پھر ایک اور دلچسپ امکان بھی ہے جس نے فلکیات دانوں کو ہمیشہ پر جوش رکھا ہے، کائنات کے آغاز یعنی بگ بینگ سے جہاں نظر آنے والا مادہ یعنی مریٰ مادہ بننا تھا وہاں نظر نہ آنے والا یعنی غیر مریٰ مادے کا آغاز بھی ہوا تھا، اگر کائنات کا آغاز انتہائی گرم مادے سے ہوا تھا اور اس سے ہمارے جانے پہچانے الیکٹران، پروٹان اور نیوٹران جیسے تحت ایٹھی (Subatomic) ذرات بننے تھے وہاں دوسری اشیاء کے ذرات نے بھی جنم لیا تھا جنہیں حالیہ برسوں میں تجربہ گاہوں میں دریافت اور شناخت کیا گیا ہے، ان کم شناسا ذرات میں سے زیادہ تر بہت غیر مستحکم ہیں اور پیدا ہوتے ہی ٹوٹ گئے ہوں گے لیکن آج بھی بگ بینگ کی باقیات کے طور پر موجود ہوں گے، ان باقیات میں سب سے زیادہ دلچسپی کے حامل نیوٹرینو ہیں جن کی سپرنووا میں سرگرمی پر باب چھارم میں روشنی ڈالی گئی تھی، ہمارے تازہ ترین علم کے مطابق نیوٹران ٹوٹ کر کسی اور ذرے یا ذرات میں نہیں بدلتے (دراصل نیوٹرینو کی تین اقسام ہیں جو ایک دوسرے میں بدل سکتی ہیں لیکن اس پیچیدگی میں ملوث ہونے کا بہاں موقع نہیں اور نہ ہی ضرورت) ہم اندازہ لگاسکتے ہیں کہ کائنات بگ بینگ کے وقت خارج ہونے والے نیوٹرینو کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہے، اگر مفروضہ قائم کیا جائے کہ تشکیل کائنات کے ابتدائی مرافق میں دستیاب تو انائی کی تمام ذرات پر جمہوری انداز میں تقسیم ہوئی تھی تو نیوٹرینو کی گل تعداد کا حساب لگایا جاسکتا ہے، فضاء کے ایک مکعب سینٹی میٹر میں ایک ملین نیوٹرینو موجود ہونے چاہئیں، یعنی کہ عام مادے کے ایک ذرے کے مقابلے میں ایک ملین نیوٹرینو!

ان حیران کن نتائج نے مجھے ہمیشہ ورطاء حیرت میں ڈال دیا ہے، آپ کے جسم میں ہر وقت تقریباً ایک سو ملین نیوٹرینو موجود ہوتے ہیں، تقریباً سب کے سب بگ بینگ کی باقیات ہیں اور تشکیل کائنات کے پہلے ملی سینکڑ کے بعد سے انہیں کسی نے نہیں چھیڑا، چونکہ یہ روشنی کی یا اس کے قریب رفتار سے حرکت کرتے ہیں اس لیے ایک سینکڑ میں تقریباً ایک سو ملین نیوٹرینو آپ کے جسم میں سے گزر جاتے ہیں، ہمیں اس نہ ختم ہونے والی مداخلت کی خبر نہیں ہوتی کیونکہ باقی مادے کے ساتھ ان کا تعامل اتنا کمزور ہے کہ پوری زندگی میں ان میں کسی ایک کے بھی جسم میں رک جانے کا امکان نہیں، تاہم ظاہر خالی فضاء میں ان ذرات کی اتنی بڑی تعداد میں موجودگی کائنات کے مقدار پر فیصلہ کن نتائج و عواقب مرتب کر سکتی ہے۔

نیوٹرینو کے بارے میں ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ ان کی ساکن حالت کیتھی ہوتی ہے، اور نہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی تینوں اقسام ایک سی کمیت کی حامل ہیں، نیوٹرینو کے بارے میں ہمارا نظریاتی علم اس کے ساکن حالت کمیت کو یکسر مسترد

نہیں کرتا، چنانچہ اس کمیت کی پیمائش صرف تجربی مسئلہ رہ جاتا ہے، جیسا کہ باب چھارم میں مذکور ہے اور ہم جانتے ہیں کہ اگر نیوٹرینو کمیت کے حامل ہیں تو یہ کسی بھی معلوم دوسرے ذرے کے مقابلے میں بہت کم ہے، لیکن نیوٹرینو کی تعداد کائنات میں بہت زیادہ ہے، اس لیے خواہ ان کی کمیت کتنی بھی کم ہو وہ کائنات کے کل وزن میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، اس سارے معاملے میں بہت نازک توازن پایا جاتا ہے، ہمارے شناسا ذرات میں سے الیکٹران کی کمیت سب سے کم ہے، نیوٹرینو واقعی اتنی مقدار میں موجود ہیں تو ان کی کمیت باقی ساری کائنات کے ستاروں سے زیادہ ہو گی۔

اتنی کم کمیت کے ذرے کا سراغ لگانا مشکل ہے اور تجربات سے متفاہ اور الجھن انگیز تائج سامنے آتے ہیں، سپر نووا 1987A سے آنے والے نیوٹرینو کے سراغ سے اہم تائج کی طرف رہنمائی ملتی ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اگر نیوٹرینو کی ساکن حالت کمیت صفر ہے تو تمام نیوٹرینو ذرات کو ایک سی رفتار یعنی روشنی کی رفتار پر حرکت کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ کمیت صفر نہیں ہے تو ان کی رفتاریں مختلف ہو سکتی ہیں، سپر نووا سے آنے والے نیوٹرینو بہت بلند توانائی کے حامل ہوتے ہیں اس لیے اگر کمیت صفر نہیں بھی ہے تو ان کی رفتار روشنی کے بہت قریب ہو گی، چونکہ ہم تک پہنچنے سے پہلے یہ خلاء میں بہت لمبا سفر کر چکے ہوتے ہیں اس لیے ان کی رفتاروں میں فرق زمین پر پہنچنے میں لگنے والے عرصوں کے فرق سے معلوم کیا جاسکتا ہے، سپر نووا 1987A سے خارج ہونے والے نیوٹرینو کے مطالعے سے نتیجہ نکلتا ہے کہ ان ذرات کی زیادہ کمیت الیکٹرانی کمیت کے تیس ہزاروں حصے کے برابر ہوتی ہے۔

نیوٹرینو کی ایک سے زیادہ اقسام ہیں، اس وجہ سے صورتحال اور بھی پیچیدہ ہو جاتی ہے، جس نیوٹرینو کی کمیت کا تعین کیا گیا ہے اس کے وجود کا مفروضہ پالی نے دیا تھا، لیکن اس دریافت کے بعد نیوٹرینو کی ایک اور قسم سامنے آچکی ہے اور تیسرا قسم کا ہونا استخراجی طریقے سے نظریاتی طور پر ثابت ہے، بگ بینگ میں یہ تینوں نسلیں واfr مقدار میں پیدا ہوئی ہوں گی، زیادہ سے زیادہ کمیت کی جو حد پہلی قسم کے لیے معین ہو چکی ہے دوسری اقسام کے لیے مشکل ہے۔

کائنات کے وزن کے تخمینے کے حوالے سے نیوٹرینو کے علاوہ دیگر کائناتی باقیات بھی نظر انداز نہیں کی جاسکتیں، بگ بینگ میں اور بھی ایسے ذرات پیدا ہوئے ہوں گے جن کا ادے کے ساتھ تعامل کمزور اور کمیت شاید نیوٹرینو سے زیادہ ہو، لیکن اگر ساکن حالت کمیت بڑھ جائے تو یہ ذرات دوسرے ذرات کے مقابلے میں کم تعداد میں پیدا ہوں گے کیونکہ زیادہ کمیت کے ذرات کے لیے زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے اور مختلف ذرات کی تعداد میں توازن ہونا ضروری ہے، ان ذرات کو ایک مشترکہ نام WIMPs دیا جاتا ہے جو کمزور تعامل کے حامل وزنی ذرات کے [Weakly Interacting Massive Particles](#) کا

محض ہے، نظری سائنسدانوں نے ان ذرات کو گریوپلینوز (Gravitinos)، گلیسینوز (Higgsinos) اور فوٹینوز (Photinos) کے نام دیے ہیں، حقیقت میں ان کے موجود ہونے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، اگر یہ موجود ہیں تو کائناتی وزن کے تخمینے میں انہیں بھی شمار کرنا ہو گا۔

ان ذرات کے ساتھ مادے سے تعامل کی جو خصوصیات نظری سائنسدانوں نے والبستہ کی ہیں ان کی رو سے WIMPs کے وجود کی ٹیسٹ میں براہ راست شہادت ملنی چاہیے، ریاضیاتی پیش گوئی کی رو سے ان کا تعامل بھی بہت کمزور ہو گا لیکن ان کی زیادہ کمیت کے باعث تصادم اتنا زور دار ہو سکتا ہے کہ اس کا سراغ لگایا جاسکے، شمال مشرقی انگلینڈ میں نمک کی کان اور سان فرانسکو میں ایک بند کے نیچے ان ذرات کے گزرنے کا سراغ لگانے کے لیے تجربات کیے گئے ہیں، اگر ان کی تعداد مفروضہ کے مطابق ہے تو پھر ان کی بہت زیادہ تعداد ہر وقت تمام اجسام سے گزر رہی ہوتی ہے، یہ تجربات ششدر کن اصول پر مبنی ہیں، تجربات میں اس آواز کا سراغ لگانے کے انتظامات کیے گئے ہیں جو یہ ذرات نیو گلیس کے ساتھ ٹکرا کر امکانی طور پر پیدا کریں گے۔

اس تجربے کا آلہ جرمینیم (Germanium) سیلیکان کی کریسٹل پر مشتمل ہے جس کے گرد ٹھنڈا رکھنے والا نظام ہے، اب اگر کوئی WIMPs کسی نیو گلیس سے ٹکراتا ہے تو اس کے مومنٹم کی وجہ سے نیو گلیس دفعتاً پیچھے ہٹ کر واپس اپنی جگہ پر آتا ہے، یہ اچانک چوت آواز کی ننھی سی لہر پیدا کرتی ہے، یہ لہر کریسٹل میں سفر کرتی ہے، جب کریسٹل کی جالی یا Lattice اس لہر کو جذب کرتی ہے تو توانائی حرارت میں بدل جاتی ہے، چونکہ کریسٹل کو تقریباً مطلق صفر تک ٹھنڈا کیا گیا ہوتا ہے اس لیے یہ حرارت کی بہت کم مقدار کے لیے بھی بہت حساس ہوتا ہے، یوں جب مذکورہ بالا عمل میں آواز کم ہو کر حرارت میں بدلتی ہے اس کا سراغ لگا لیا جاتا ہے۔

نظری سائنسدانوں نے استنباط کیا ہے کہ کائنات کی کہکشاں میں قدرے کم رفتار سے حرکت کرتے ہوئے WIMPs کے سمندر میں ڈوبی ہوئی ہیں، ان کی کمیت ایک سے ایک ہزار پروٹان کمیت کے درمیان کچھ بھی ہو سکتی ہے، ان کی فتار چند ہزار کلو میٹر فی سینٹ ہونا چاہیے، ہماری زمین نظام شمسی میں سورج کے گرد اپنی گردش کے دوران ان ذرات کے سمندر میں سے گزرتی ہے، زمین کی کمیت کا ہر کلو گرام ایک ہزار WIMPs کو منتشر کرتا ہے، وقوعہ کی اس شرح کے پیش نظر ان ذرات کا براہ راست سراغ لگانا عین ممکن ہے۔

ان ذرات کی تلاش کے ساتھ ساتھ ماہرین فلکیات کائنات کے وزن کا مسئلہ بھی حل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، اگر کوئی جسم غیر مریٰ ہے یعنی بظاہر دیکھا نہیں جاسکتا تب بھی اس کی تجاذبی کشش کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں، مثلاً سیارہ نیپچون (Neptune) کی دریافت اس طرح ہوئی تھی کہ ماہرین فلکیات نے یورانوز (Uranus) کے مدار میں کسی دوسرے نامعلوم جسم کی تجاذبی قوت سے ہونے والی گڑبرڑ کی حقیقت جانے کی کوشش کی تھی، روشن ستارے سارے سارے (Sirius) کے گرد گردش کرنے والے مدھم ستارے سارے سارے (B-Sirius) کی دریافت بھی اس طرح سے ہوئی تھی، چنانچہ نظر آنے والے یعنی مریٰ مادے کے مشاہدے سے فلکیات دان غیر مریٰ مادے کی تصویر کشی کر سکتے ہیں، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس طریقہ کار کے نتیجے میں کیسے شک ہوا تھا کہ سگنوس X-1 Cygnus میں بلیک ہول موجود ہو سکتا ہے۔

پچھلی ایک دو دہائیوں میں کہشاوں میں ستاروں کی حرکت کے انداز کا بغور مطالعہ کیا گیا ہے، ہماری کہشاں یعنی ثریا میں ستارے اس کے مرکز کے گرد گردش کرتے ہیں، ان کی گردش کا دورانیہ عام طور پر دو سو ملین سال سے زیادہ ہوتا ہے، یہ کہشاں شکل میں تھامی کی سی ہے جس کے مرکز میں ستاروں کا بہت بڑا ڈھیلا نما اجتماع ہے، اس طرح یہاں نظام شمسی سے ایک بُلکی سی مماثلت ملتی ہے، لیکن نظام شمسی میں مرخ اور وینس جیسے سورج کے نزدیکی سیارے یورانوز اور نیپچون جیسے دور ستاروں کی نسبت زیادہ تیزی سے گردش کرتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ نزدیکی سیاروں پر سورج زیادہ قوتِ تجاذب لگاتا ہے، توقع کی جاسکتی ہے کہ جو ستارے کہشاں کی بیرونی حد پر ہیں وہ مرکز کے نزدیکی ستاروں کی نسبت بہت سست روی سے حرکت کرتے ہیں۔

لیکن مشاہدہ اس کے برکس ہے، ستارے اس ساری پلیٹ یعنی کہشاں میں یکساں رفتار سے حرکت کرتے ہیں، اس مظہر کی ممکنہ وضاحت یہی ہو سکتی ہے کہ کہشاں کی کمیت اس کے مرکز میں مر تکر نہیں ہے بلکہ یکساں طور پر منقسم ہے، بظاہر درمیان میں مادے کے ارتکاز کی یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ روشن مادہ کل موجود مادے کا صرف ایک حصہ ہے، ظاہر ہے کہ بہت سا غیر مریٰ مادہ موجود ہے اور اس کا زیادہ تر حصہ کہشاں کے کناروں میں پایا جاتا ہے جس کی وجہ سے وہاں موجود ستاروں کی رفتار میں تیزی آتی ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ غیر روشن مادے کی قابلی ذکر مقدار خود کہشاں کے مریٰ کناروں سے بھی باہر موجود ہو، کہشاوں کی تابناکی سے بھی ان کی کمیت کا حساب لگایا جاتا ہے، لیکن کہشاوں کی اصل کمیت تابناکی سے نکالی گئی کمیت کے مقابلے میں اوسطًا دس گنا زیادہ ہے، کہشاوں کے کناروں کے لیے اس نسبت کی قیمت پانچ ہزار تک پہنچ جاتی ہے، یعنی کہ ان کے کناروں پر موجود مادے کی جو کمیت ریاضی کی رو سے نکلتی ہے وہ تابناکی سے اخذ کی گئی کمیت

سے پانچ ہزار گنا زیادہ ہوتی ہے۔


کہکشاوں کے جھرمٹ میں ان کی حرکت کا مطالعہ بھی اس طرح کے نتائج دیتا ہے، اگر کسی کہکشاں کی رفتار ایک خاص قیمت تک پہنچ جائے تو وہ جھرمٹ سے باہر نکل سکتی ہے، اور اگر ساری کہکشاں میں یہ رفتار حاصل کر لیں تو جھرمٹ ٹوٹ جائے گا، کئی سو کہکشاوں کا ایک جھرمٹ مجمع النجوم کوما ([Constellation of Coma](#)) میں پایا جاتا ہے، اس کا تفصیلی مطالعہ کیا گیا ہے، کوما کہکشاوں کی اوسط رفتار اتنی زیادہ ہے کہ اگر اس میں نظر آنے والے مادے سے تین سو گنا نظر نہ آنے والا مادہ موجود نہ ہو تو یہ جھرمٹ بکھر جائے گا، چونکہ کوما جھرمٹ میں ایک عام کہکشاں اپنا چکر کمکل کرنے میں صرف ایک بلین سال لیتی ہے اس لیے اس جھرمٹ کے پاس بکھرنے کے لیے مناسب سے زیادہ مدت موجود تھی، اس کے باوجود ایسا نہیں ہوا اور جھرمٹ کی ساخت سے ایک مضبوط تجاذبی بندھن کا تاثر ملتا ہے، لگتا ہے کہ غیر روشن مادے کی کافی مقدار وہاں موجود ہے جو کہکشاوں کی حرکت پر اثر انداز ہو رہی ہے۔

کائنات کا بطور ایک کمیت کے بھی مشاہدہ اور مطالعہ کیا جائے تو غیر مرئی مادے کے شواہد سامنے آتے ہیں، کہکشاوں کے جھرمٹ اور سپر جھرمٹ ایک دوسرے سے جس طرح تجاذبی قوت کے واسطے سے منسلک ہیں وہ ان شواہد میں سے ایک ہے، جیسا کہ تیسرا باب میں بیان کیا جا چکا ہے کہکشاں کائنات میں اس طرح پھیلی ہوئی ہیں جیسے بیٹھی ہوئی جھاگ ہوتی ہے، یعنی کہ بلبلوں کا اندر وون خلاء کو ظاہر کرتے ہے جن کے گرد کی جھلی گویا کہکشاوں سے بنی ہوئی ہے، بگ پینگ کے بعد سے اب تک جتنا وقت گزرا ہے اس میں صرف اس طرح کی گنجان اور جھاگ دار ساخت کا وجود میں آنا ممکن نہیں، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہو سکتا ہے اگر اس میں نظر نہ آنے والے یعنی غیر مرئی مادے کی کافی مقدار موجود ہو، معلوم حقائق اور ان مفروضہ جات کی مدد سے کمپیوٹر تاحال ایسی جھاگ دار کائناتی تصویر کی تصدیق نہیں کرتا، ممکن ہے کچھ اور تفصیلات شامل کرنے پر یہ ممکن ہو جائے۔

غیر مرئی یا نظر نہ آنے والے مادے پر جو جدید تحقیقی کام ہوا ہے اس میں ایسے فرضی ذرات کو بروئے کار لایا گیا ہے جو مادے کی زیادہ شناساً شکل میں موجود ہو سکتے ہیں، کائنات میں یہ سیاروں یا مدھم ستاروں کی صورت موجود ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ یہ مادہ ہمارے ارد گرد ہی منڈلا رہا ہو اور ہم اس کی موجودگی سے بے خبر ہوں، یعنی کچھ غیر مرئی مادہ ایسا ہے جو مرئی کے ساتھ تجاذبی بندھن میں نہیں بندھا ہوا، ایسے مادے کا سراغ لگانے کے لیے فلکیات دانوں نے نئے طریقے وضع کیے ہیں، ان طریقوں میں آئن سائنس کے عمومی نظریہ اضافت کے اس نتیجے کو استعمال کیا گیا ہے جسے تجاذبی عدسیت یا

## Gravitational Lensing کہتے ہیں۔

ان طریقوں کا بنیادی اصول یہ ہے کہ تجاذب روشنی کی شعاع میں خم پیدا کر سکتی ہے، آئن ٹائن نے پیش گوئی کی تھی کہ کسی ستارے سے آنے والی شعاع جب سورج کے پاس سے گزرے گی تو اس میں کبھی آجائے گی اور اس وجہ سے ستارہ اپنی اصل جگہ سے ہٹا ہوا نظر آئے گا، سورج کی اس کے قرب میں موجودگی اور عدم موجودگی سے اس کے محل و قوع کا تعین کر کے اس پیش گوئی کو آزمایا جاسکتا ہے، یہ آزمائش سب سے پہلے برطانوی ماہر فلکیات سر آرٹھر ایڈنگٹن (Sir Arthur Eddington) نے 1919 میں کی اور نتائج نے آئن ٹائن کے نظریے کے سو فیصد درست ہونے کی تصدیق کی۔



تجاذبی عدسہ، جسم کی تجاذب دور دراز منبع S سے آنے والی روشنی کی شعاع کو موڑتی ہے، حالات سازگار ہونے کی صورت میں یہ اثر عام عدسے کی طرح روشنی کو ایک نقطے پر اکٹھا کر دے گا، اس نقطے پر موجود شخص کو اس جسم کے گرد روشنی کا ہالہ نظر آئے گا۔

شکل 6.1

عدسے بھی روشنی کی شعاعوں کو موڑتے اور انہیں ایک نقطے پر مرکز کرتے ہیں، اگر کوئی بہت بڑی کمیت کا حامل جسم باقاعدہ شکل کا حامل ہے تو وہ ایک عدسے کی طرح عمل کرتے ہوئے کسی دور دراز ستارے سے آنے والی روشنی کو ایک نقطے پر لاسکتا ہے، شکل 6.1 میں دکھایا گیا ہے کہ کیسے منبع S سے آتی روشنی ایک کرے پر پڑتی ہے اور وہ قوتِ تجاذب سے شعاعوں کو خمیدہ کر کے دوسری جانب ایک نقطے پر مرکز کرتا ہے، اگرچہ زیادہ تر اجسام بہت کم خمیدگی پیدا کر سکتے ہیں لیکن فلکیاتی فاصلے اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ شعاعی راستے کی ذرا سی خمیدگی بھی بالآخر اسے ایک نقطے پر مرکز کر دیتی ہے، اگر

خمیدگی پیدا کرنے والا یہ جسم منع S اور زمین کے درمیان ہے تو S کا ایک روشن عکس حاصل ہوتا ہے، اگر خط نگاہ Line of Sight مثالی حد تک درست ہے جو کہ استثنائی حالتوں ہی میں ہوتا ہے، تو S ایک روشن دائرے کی صورت حاصل ہو گا جسے آئن سٹائن کا چھلہ کہتے ہیں، اگر تجاذبی خمیدگی کے ذمہ دار جسم کی شکل سادہ کروی نہیں ہے تو حاصل ہونے والے عکس تعداد میں ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ماہرین فلکیات نے کائناتی پیمانے پر بہت سے تجاذبی عدسه دریافت کیے ہیں، جب دور دراز کے کوسار درمیانی کہکشاں میں اور زمین ایک ہی سیدھ میں آتی ہیں تو ان کو اسار کے متعدد عکس حاصل ہوتے ہیں، یہ عکس بیشتر اوقات قوسی صورت میں ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھار مکمل دائروں کی صورت میں بھی ہوتے ہیں۔

اس تجاذبی اثر کو سائنسدان غیر روشن مادے یا مدهم ستاروں کی تلاش کے لیے استعمال کرتے ہیں، جب کوئی دور دراز ستارہ اپنی جگہ سے کبھی کبھار ہٹا ہوا نظر آ رہا ہو یا اس کا کسی طرح کا عدسی عکس حاصل ہو رہا ہو تو زمین اور اس ستارے کے درمیان غیر روشن مادے یا مدهم ستارے کا ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اس ستارے کے عکس کی تابانی بڑھتی کم ہوتی رہتی ہے کیونکہ غیر روشن مادہ تینوں اجسام کے خط نگاہ پر آگے پیچھے حرکت کرتا ہے، اگرچہ یہ غیر روشن جسم نظر نہیں آتا لیکن عدسی اثر سے اس کی موجودگی اخذ کی جاسکتی ہے، کچھ ماہرین فلکیات ہماری کہکشاں میں یعنی کہ ٹریاکے ہالے میں غیر روشن مادے کی تلاش کے لیے اس طریقے کو استعمال کر رہے ہیں، ان اجسام کے کسی دور دراز ستارے کی مکمل سیدھ میں ہونے کا امکان ناقابل یقین حد تک کم ہے، لیکن چونکہ یہ اجسام کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں اس لیے ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، اوآخر 1993 میں نیو ساؤ تھہ ولیز کی ماونٹ سٹرولو رصدگاہ ([Stromlo Observatory](#)) میں کام کرنے والی آسٹریلوی-امریکی ٹیم نے لارج میگلیلنی بادل کے ستاروں کے مشابہے کے دوران ہماری کہکشاں کے ہالے کے ایک بونے (Dwarf) کی تجاذبی عدسیت کی پہلی قطعی شہادت دی۔

بلیک ہول بھی تجاذبی عدسوں کی طرح عمل کرتے ہیں، ان کی تلاش کے لیے کی جانے والی تحقیقات میں دور دراز کی کہکشاوں سے آنے والی ریڈیائی لہروں (Radio Waves) کی خمیدگی کا مطالعہ کیا جاتا ہے، ان تحقیقات سے نتیجہ نکلا ہے کہ نظر آنے والے مادے کا بہت تھوڑا حصہ بلیک ہولوں اور مدهم ستاروں پر مشتمل ہے۔

عدسیت پر بنی تلاش میں بہت تھوڑے بلیک ہول اپنا آپ ظاہر کرتے ہیں، عین ممکن ہے کہ بگ بینگ کے وقت جو شدید صور تھاں غالب تھی اس میں صرف بہت چھوٹے بلیک ہول بن پائے ہوں جن میں سے اکثریت کا مجسم ایٹمی مرکزے سے زیادہ نہ ہو، ان میں مادے کی مقدار شہابِ ناقب ([Asteroid](#)) سے زیادہ نہیں ہوگی، اس صورت میں بھی مادے کی کافی

مقدار ان ہولوں میں چھپی ہوئی ہوگی اور یہ پوری کائنات میں بکھرے ہوئے ہوں گے، جیران کن امر یہ ہے کہ ان عجیب وغیری اجسام کے مشاہدے کی اپنی حدود ہیں، ان حدود میں کار فرما وجہات کو ہاکنگ اثر (Hawking Effect) کا نام دیا جاتا ہے جسے باب ہفتم میں تفصیلًا بیان کیا جائے گا، سر دست اتنا بیان کافی ہو گا کہ یہ اجسام پھٹ کر چارج شدہ ذرات کی بوچھاڑ کی صورت بکھر جاتے ہیں، مختلف جسم کے حامل اجسام مختلف مدتوں کے بعد پھٹتے ہیں، جسم جتنا چھوٹا ہو گا اتنی جلدی پھٹ جائے گا، شہابِ ثاقب کے برابر کمیت کا حامل جسم پھٹنے کے لیے تقریباً دس بلین سال لے گا یعنی کہ تقریباً آج کل کے دور میں اس کے پھٹنے کے امکانات ہیں، اس کا ایک اثر ریڈیو لہروں کا اخراج ہو گا، ریڈیو ماہرین فلکیات نے اس مشاہدے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ناکام رہے ہیں، اس لیے حساب لگایا گیا ہے کہ خلاء کے ایک مکعب نوری سال کے علاقے میں ہر تین بلین سال کے بعد اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ کائنات کے گُل مادے کی مقدار کا نہایت ہی معمولی حصہ خورد بینی بلیک ہولوں کی شکل میں ہے۔

فلکیات دانوں کا غیر روشن مادے کی مقدار پر اختلاف ہے، کچھ کے نزدیک غیر روشن اور روشن مادے میں دس اور ایک کی نسبت ہے جبکہ بعض اسے سوا اور ایک بتاتے ہیں، جیران کن حقیقت یہ ہے کہ ماہرین کائنات ان کے ساختی اجسام سے لا عالم ہیں، لمبے عرصے تک جن ستاروں کو وہ کائنات کے زیادہ تر وزن کا ذمہ دار خیال کرتے رہے ہیں وہ گُل کمیت کا صرف ایک حصہ ہیں۔

کائناتی نقطہ نظر سے اہمیت اس امر کو حاصل ہے آیا روشن مادے کی اتنی مقدار موجود ہے جو کائناتی پھیلاو روك سکے، کائناتی کثافت (Density) کی وہ قیمت جس میں ذرا سا اضافہ پھیلاو روك سکتا ہے فاصل کثافت کہلاتی ہے، اس خاص کثافت کی جو قیمت ریاضی بتاتی ہے وہ مریٰ مادے کی کثافت سے سو گنا زیادہ ہے، مریٰ اور غیر مریٰ مادہ مل کر فاصل کثافت پر منتج ہوتے ہیں۔

امید ہے کہ غیر روشن یا غیر مریٰ مادے کی جاری تلاش سے جلد ہی ہاں یا نہ میں جواب مل جائے گا جو دراصل کائنات کے مقدار کے فیصلے کے مترادف ہو گا۔

اپنے موجودہ علم کی بنیاد پر ہم یہ فیصلہ نہیں کر سکتے کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی رہے گی یا نہیں، اگر اسے بالآخر سکرنا ہے تو اس کا آغاز کب ہو گا، اس کے درست جواب کا انحصار اس امر پر ہے کہ کائنات کی کمیت فاصل کمیت سے کتنی زیادہ ہے، اگر ایک

فیصلہ زیادہ ہے تو کائنات تقریباً ایک ٹریلیون سال میں سکڑنا شروع ہو جائے گی، اگر دس فیصلہ زیادہ ہے تو اب سے ایک بلین سال بعد سکڑاً شروع ہو جائے گا۔

کچھ نظری سائنسدان (Theorists) کا خیال ہے کہ کائناتی وزن ریاضیاتی عمل سے حساب میں لایا جا سکتا ہے اور براہ راست مشکل مشاہدات غیر ضروری ہیں، محض ریاضیاتی عمل اور دلائل سے کائناتی علم کے ممکن الحصول ہونے کے لیفین کی جڑیں یونانی فلاسفروں کے طرزِ فکر میں ہیں، سائنسی دور میں کئی ماہرین کائنات نے ایسی ریاضیاتی سکیمیں تشکیل دینے کی کوشش کی ہے جو کائناتی وزن کی ایک متعین مقدار کا نیادوں کے اصول کی روشنی میں منصہ شہود پر لا سکیں، خصوصاً وہ سکیمیں (Schemes) زیادہ گراہ کن ہیں جن میں کسی عددی فارمولے کی زبان میں کائنات میں موجود گل ذرات کی تعداد بتانے کی کوشش کی گئی ہے، اگرچہ ایسی سکیمیں خاصی دلچسپ ہیں لیکن سائنسدانوں کی اکثریت کو قائل کرنے میں ناکام رہی ہیں، تاہم کائنات کا متعین وزن بتانے کی ایک سکیم جو حالیہ برسوں میں پیش کی گئی ہے خاصاً وزن رکھتی ہے اور قائل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، یہ پھیلاو کا نظریہ ہے جسے باب سوم میں بیان کیا گیا تھا، پھیلاو کے نظریے کی پیش گوئیوں میں سے ایک کائنات میں مادے کی مقدار کے بارے میں ہے۔

نظریہ پھیلاو کی پیش گوئیوں میں سے ایک کا تعلق کائنات میں مادے کی مقدار سے ہے، فرض کریں کہ کائنات کا آغاز ہوا تو مادے کی کثافت فاصل کثافت سے بہت زیادہ یا بہت کم تھی، یاد رہے کہ فاصل کمیت مادے کی وہ مقدار ہے جس میں ذرا سی کمی پر کائنات بالآخر منہدم ہو جائے گی، جو کائنات پھیلاو کے مرحلے میں داخل ہوتی ہے تو اس کی کثافت میں دفعتاً اور ڈرامائی تبدیلی آتی ہے، اور فوراً ہی فاصل کمیت تک پہنچ جاتی ہے، پھیلاو کا مرحلہ جتنا طویل ہوتا چلا جائے گا کثافت فاصلیت کے اتنا ہی قریب ہوتی چلی جائے گی، اس نظریے کی معیاری صورت کی رو سے پھیلاو کا مرحلہ انتہائی مختصر ہوتا ہے، چنانچہ جب تک ایسا مجذہ نہ ہو کہ کائنات کا آغاز عین فاصل کثافت سے نہ ہو، پھیلاو کے مرحلے کے بعد اس کی کثافت فاصلیت سے قدرے زیادہ ہو گی یا قدرے کم۔

تاہم پھیلاو کے مرحلے میں فاصل کثافت کی طرف بڑھنے کی رفتار قوت نمایانہ (Exponential) ہوتی ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اگر پھیلاو کا دورانیہ ایک سینٹ سے بھی کم ہو تو حتیٰ کثافت کے نزدیک تر ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، یہاں قوت نمایانہ انداز میں بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ پھیلاو کے ہر اگلے "ٹک" کے ساتھ بگ بینگ اور اختتام کائنات کے آغاز یعنی سکڑاً کا درمیانی وقفہ دو گنا ہو جاتا ہے، اگر پھیلاو سو ٹک تک ہوتا رہتا ہے اور کائنات کی عمر بگ بینگ اور سکڑاً کا درمیانی

وقفہ سو بلین سال ہے تو ایک سو ایک ٹک طویل پھلاوہ کا مطلب دو سو بلین سال کا طویل وقف ہو گا، پھلاوہ کتنی دیر جاری رہے گا؟ کوئی نہیں جانتا! لیکن اگر اس کتاب میں بیان کردہ مختلف معماں جات کا کوئی قابل قبول حل ہے تو ہمیں ان "ٹکوں" (Ticks) سے کوئی عدد والپستہ کرنا ہو گا، سو ٹک کا عرصہ مناسب ہے اگرچہ اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، تاہم اس عدد کی کوئی بالائی حد نہیں، اگر کسی نادر و نایاب انطباق نے باعث پھلاوہ صرف اتنا ہی جتنا ہمارے آج کے مشاہدات کی توضیح کے لیے ناگزیر ہے تو بھی پھلاوہ کے بعد کی کثافت فاصلیت سے قابل ذکر حد تک کم یا زیادہ ہو گی، اگر تو کثافت فاصلیت سے زیادہ ہے تو مشاہدات سے سکڑاؤ کی آمد کا تعین کیا جاسکے گا بصورتِ دیگر سکڑاؤ ہو گا ہی نہیں، بہت زیادہ امکان یہی ہے کہ کم از کم وقت سے کافی زیادہ ٹک تک پھلاوہ جاری رہا، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کثافت فاصل قدر کے بہت قریب ہو گئی، چنانچہ اگر کائنات کو سکڑنا ہی ہے تو یہ عمل ابھی بہت لمبے عرصے تک نہیں ہو گا، اس میں کائنات کی موجودہ عمر سے کئی گنا زیادہ وقت لگ سکتا ہے، اس صورت میں انسان کبھی کائنات کا انجام نہ دیکھ سکے گا.

## ابدیت ایک طویل وقف ہے

غیر محدود یا لا انتہاء کے بارے میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ یہ محض بہت بڑا عدد نہیں ہے، غیر محدود اور کسی بعد از قیاس طور پر بڑی چیز میں کیفیتی فرق ہے، فرض کریں کہ کائنات کو ہمیشہ کے لیے چھلتے ہی چلے جانا ہے جس کا کبھی خاتمه نہیں ہو گا، اگر مادے کو اس ساری لامحدودیت سے گزرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ وقت بھی لامحدود ہے، اگر ایسا ہے تو پھر کوئی بھی واقعہ، چاہے وہ کتنا ہی انہوں ہو، کسی نہ کسی وقت ضرور ہو گا، جیسے اگر ایک بندر لامحدود عرصے کے لیے ٹائپ رائیٹر پر انگلیاں مارتا رہے تو وہ کبھی نہ کبھی شیکسپیر کا ادبی کام ٹائپ کر ڈالے گا۔

تجاذبی لہروں کے اخراج، جس پر باب پنجم میں بات ہوئی تھی، کا مظہر اس کی کافی اچھی مثال ہے، صرف کسی بہت ہی ہنگامہ خیز قسم کے فلکیاتی عمل میں تو انائی کا قابل ذکر اخراج تجاذبی لہروں کی صورت ہو گا، زمین کی چاند کے گرد گردش سے جو ملی واث اخراج تجاذبی لہروں کی صورت ہوتا ہے زمین کی حرکت پر نہ ہونے کے برابر اثرات مرتب کرتا ہے، اپنی اس تمام تر حکیر تو انائی کے باوجود اگر تجاذبی لہر کا اخراج کئی ٹریلیوں سال ہوتا رہے تو زمین چھوٹے ہوتے مدار پر گردش کرتی بالآخر سورج میں جا گرے گی، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے بہت پہلے سورج زمین کو نگل جائے گا لیکن اس مثال سے اصل مقصد واضح کرنا مقصود ہے کہ جو عمل وقت کے انسانی پیمانے پر قابل نظر انداز لگتے ہیں وہی عمل اگر مستقل ہوتے رہیں تو بالآخر غالب آجاتے ہیں اور طبعی ظاموں کے انجام کے تعین میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔

مستقبل میں بہت آگے مثلاً ایک ٹریلیوں سال بعد کائنات کے حالات پر غور کریں، ستارے جل بجھتے ہیں اور کائنات تاریک ہو چکی ہے، لیکن یہ خالی نہیں ہے، خلاء کی سیاہ و سعتوں میں گھومتے بلیک ہول آوارہ نیوٹران ستارے اور سیاہ ہونے حتیٰ کہ کچھ سیارے بھی لڑھکتے پھر رہے ہیں، کائنات حال کے مقابلے میں دس ہزار ٹریلیوں گناہ پھیل چکی ہے اور اس کی اوست

کثافت بہت کم ہو گئی ہے۔

قوتِ تجاذب عجیب لڑائی میں مصروف ہو گی، پھیلیٰ کائنات تمام اجسام کو ایک دوسرے سے دور کرنے کے لیے کوشش ہو گی، کہکشاوں کے جھر مٹوں کی طرح کے گروہوں میں اجسام قوتِ تجاذب کے باعث باہم حلقة کشش میں ہوں گے لیکن یہ جھرمٹ ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہوں گے، اس ساری کھینچاتانی کے آخری نتیجے کا انحصار اس بات پر ہے کہ کائناتی پھیلاؤ کی رفتار کس شرح سے کم ہو رہی ہے، کائنات کی کثافت جیسے عیسے کم ہوتی جائے گی ان جھر مٹوں کی ایک دوسرے پر قوتِ کشش کم ہوتی جائے گی اور وہ زیادہ آزادی سے ہاہم فاصلے کو بڑھا سکیں گے۔

تجاذبی بندھن کے باعث مربوط اور منضبط نظاموں میں تجاذبی قوت آہستہ غالب آجائی ہے، اپنی تمام توانوں کے باوجود تجاذبی اخراج ان کی توانائی غیر محسوس طور پر چوستی رہتی ہے اور وہ ایک چکر دار سست رفتار موت کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں، نہایت سست روی کے ساتھ مردہ ستارے مردہ ستاروں یا بلیک ہولوں کی طرف بڑھتے ہیں اور مدغم ہوتے چلے جاتے ہیں، سورج اس وقت تک ایک جلے ہوئے سیاہ ہونے کی شکل میں ہو گا، تجاذبی شعاعوں کے اخراج کے ہاتھوں ایک ٹریلین ٹریلین سال میں سورج کا مدار ختم ہو جائے گا اور ثریا یا ہماری کہکشاں کے مرکز میں موجود بلیک ہول اسے نگل جائے گا۔

لیکن لازم نہیں کہ سورج اپنے انعام سے عین اسی رستے پر چلتا دوچار ہو گا کیونکہ کہکشاں کے مرکز کی طرف اپنے اس سفر میں دوسرے کئی ستاروں سے اس کا تصادم ہو گا، یہ بھی ہو گا کہ اس کا گزر ستاروں کے ثانی نظام کے پاس سے ہو، ستاروں کے ثانی نظام میں دو ستارے باہم تجاذبی قوت سے بندھے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں اس دلچسب طبعی مظہر کی تیاری شروع ہوتی ہے جسے غلیل کا نام دیا جاتا ہے، ایک دوسرے کے گرد گردش کرتے دو اجسام سائنس کے کلاسیک مسئلے میں سے ایک ہے، یہ مسئلہ کپلر اور نیوٹن کے زیرِ غور بھی رہا اور جدید سائنس کی طرف سفر کا آغاز ہوا، ایک مثالی صورتِ حال میں، اگر تجاذبی اخراج کو نظر انداز کر دیا جائے تو ستارے کی گردش میں خاصی باقاعدگی ہوتی ہے، کتنا بھی لمبا عرصہ گزر جائے یہ اجسام اسی طرح حرکت کرتے رہیں گے، سادہ اور دوری نہیں رہتی، تین اجسام کے ما بین قوت کا ڈیزائن پیچیدہ طور پر بدلتا رہتا ہے، اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر اجسام متماثل بھی ہیں تو نظام کی توانائی تینوں پر یکساں تقسیم نہیں ہوتی، اس کی بجائے ایک پیچیدہ رقص شروع ہو جاتا ہے جس میں زیادہ توانائی کبھی ایک ستارے کے پاس ہوتی ہے اور کبھی دوسرے کے پاس، اگر وقت کا وقفہ بہت بڑا ہے تو نظام کا رویہ لازماً بے قاعدہ ہو جاتا ہے، تجاذبی حرکیات میں تین جسمی مسئلہ میں رویے کے

غیر متعین اور ناقابل پیش گوئی ہونے کی اچھی مثال ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ تین میں سے دو مل جائیں اور دستیاب تو انائی میں سے اتنی زیادہ تو انائی تیسرے جسم کو فراہم کر دیں کہ وہ نظام ہی سے باہر ہو جائے، جیسے غلیل میں سے غلہ پھینکا جاتا ہے، اسی وجہ سے یہاں تجاذبی غلہ کی اصطلاح برتبی جاتی ہے۔

تجاذبی غلہ کا ایک عمل ستارے کو جھرمٹ حتیٰ کہ کہکشاں سے بھی نکال سکتا ہے، مستقبل بعید میں مردہ ستارے، ستارے اور بلیک ہول اسی طرح لمبے لمبے راستے پر کہکشاوں کے درمیان وسیع خلاوں میں گھوم رہے ہوں گے، اس عمل کے دوران ان کا تصادم دوسری کہکشاوں سے بھی ہو سکتا ہے، وگرنہ وہ پھیلتی و سعتوں میں ہمیشہ آوارہ گرد بنے پھرتے رہیں گے، لیکن یہ عمل بہت سست ہو گا، اس مرحلے تک پہنچنے میں کائنات کی موجودہ عمر سے ایک بیلین زیادہ وقت لگے گا، جو چند فیصد اجسام باقی پہنچیں گے، کہکشاں کے مرکز کی طرف ہجرت کر جائیں گے اور باہم مدغم ہو کر بڑے بڑے بلیک ہول بنائیں گے۔

جیسا کہ باب پنجم میں بیان ہو چکا ہے، فلکیات دنوں کے پاس بعض کہکشاوں کے مرکز میں بڑے بڑے بلیک ہولوں کی موجودگی کے شواہد موجود ہیں جو چکراتی ہوئی گیس نگلے ہیں اور اس عمل میں بہت زیادہ تو انائی خارج ہوتی رہتی ہے، اس طرح کا انجام پیشتر کہکشاوں کا منتظر ہے، یہ عمل جاری رہے گا حتیٰ کہ سارا مادہ یا تو نگل لیا جائے گا یہ پھر کہکشاوں کے درمیان بسیط خلاء میں گردش کرتے رہنے کے لیے پھینک دیا جائے گا، پھر یہ پھولے ہوئے بلیک ہول ساکت ہو جائیں گے، بس کبھی کبھار کوئی آوارہ نیوٹران ستارہ یا چھوٹا بلیک ہول اس میں آکر گرا کرے گا، تاہم یہ بلیک ہول کی کہانی کا اختتام نہیں ہے، 1974 میں سٹیفن هاکنگ نے دریافت کیا کہ بلیک ہول اتنے "بلیک" بھی نہیں ہیں، اس کی بجائے اس میں سے حرارت کی قلیل سی مقدار خارج ہوتی رہتی ہے۔

ہاگنگ اثر (Hawking Effect) کو مناسب طور پر صرف فیلڈ کے کو انٹم نظریے کی مدد سے سمجھا جاسکتا ہے، یہ طبیعت کی ایک مشکل شاخ ہے جس کی طرف میں نے کائناتی پھلاو کے نظریے کی ذیل میں بھی اشارہ کیا تھا، آپ کو یاد ہو گا کہ کو انٹم فزکس یا قدری طبیعت کا بنیادی اصول، اصول عدم تیقین ہے، ہیزن برگ کے اس اصول کی رو سے تحت ایسی ذرات کے تمام خصائص کا بلیک وقت یکساں قطعیت کے ساتھ تعین نہیں کیا جاسکتا، مثلاً کے طور پر وقت کے کسی ایک لمحے میں کسی فوٹوں یا الیکٹران کے ساتھ تو انائی کی مخصوص مقدار قطعیت کے ساتھ وابستہ نہیں کی جاسکتی، دراصل تحت ایسی ذرات تو انائی "ادھار" بھی لے سکتے ہیں ہر چند یہ انہیں فوراً واپس کرنا پڑتی ہے۔

جیسا کہ ہم نے باب سوم میں دیکھا تھا، تو انائی کا یہ عدم تینکن کچھ انوکھے نتائج سامنے لاتا ہے جن میں سے ایک بظاہر خالی فضاء میں مختصر زندگی کے حامل غیر حقیقی ذرات کا لمحاتی ظہور ہے، اسی سے قدری خلاء (Quantum Vacuum) کا تصور جنم لیتا ہے جس میں غالباً پن کی جگہ بلکہ اس کے برعکس بے چین غیر حقیقی بے شمار ذروں کی ختم نہ ہونے والی سرگرمی جاری رہتی ہے اگرچہ بیشتر اوقات اس سرگرمی پر توجہ نہیں دی جاسکتی لیکن یہ طبعی اثرات پیدا کر سکتی ہے، ان اثرات میں سے ایک ایسا ہے جو تجاذبی میدان کی موجودگی میں وقوع پذیر ہوتا ہے۔

اسی نوعیت کا لیکن زیادہ شدید وقوع بلیک ہول کے سرحدی افق پر بھی ظاہر ہوتا ہے، غیر حقیقی ذرہ ادھار کی تو انائی پر بہت کم عرصے کے لیے زندہ رہتا ہے جس کے بعد تو انائی واپس کرنا اور ذرے کو غائب ہونا پڑتا ہے، لیکن اگر کسی طرح ایسا ہو جائے کہ اپنی مختصر زندگی میں غیر حقیقی ذرے کو کسی بیرونی منع سے اتنی تو انائی مل جائے کہ وہ اپنے ذمے ادھار چکا سکے تو پھر اس ذرے کے لیے معدوم ہونا لازم نہیں، نتیجہ کے طور پر اسے غیر حقیقی ذرے کا مرتبہ حاصل ہو جاتا ہے اور وہ کم و بیش مستقل وجود حاصل کر لیتا ہے۔

ہاگنگ کے مطابق غیر حقیقی ذرہ اپنا تو انائی کا قرض ادا کرنے کے عمل سے حقیقی ذرے کا جو مرتبہ حاصل کرتا ہے وہ بلیک ہول کے قرب میں اور اس کی مدد سے ہوتا ہے، مطلوبہ تو انائی اس بلیک ہول کا تجاذبی میدان مہیا کرتا ہے، عموماً غیر حقیقی ذرات کا جوڑا پیدا ہوتا ہے جو متصاد سمتوں میں روانہ ہوتے ہیں، فرض کریں کہ ایسا ہی ایک جوڑا بلیک ہول کے وقوعی افق کے بالکل قریب اور بیرونی طرف پیدا ہوا ہے، اب فرض کریں کہ ذرات میں سے ایک اس افق کو عبور کر کے ہول کی طرف چلا جاتا ہے، یہ ہول کے شدید تجاذب سے تو انائی حاصل کرتا ہے، ہاگنگ نے دریافت کیا کہ یہی تو انائی، افق کے اندر وہ اور بیرون میں موجود دونوں ذرات کا تو انائی کا قرض بیباک کرتی ہے اور یوں انہیں حقیقی ذرات کے مرتبے تک لے جاتی ہے، ہو سکتا ہے کہ بیرونی ذرے کو بھی بلیک ہول کھینچ کر جذب کرے اور وہ ہمیشہ کے لیے غائب ہو جائے، اگر اس کی رفتار مناسب حد تک تیز ہے تو وہ بلیک ہول سے فرار بھی ہو سکتا ہے، چنانچہ ہاگنگ کی پیش گوئی ہے کہ ہول کے قریب ایسے مفرور ذرات کی خلاء میں بوچھاڑ ہونا چاہیے، اس اشعاع کاری کو ہاگنگ ریڈی ایشن (Hawking Radiation) کا نام دیا جاتا ہے۔

خورد بینی بلیک ہولوں کی صورت میں ہاگنگ اشعاع کاری شدید ترین ہونا چاہیے، معمول کے حالات میں ایک غیر حقیقی الکٹران قرض واپس طلب کیے جانے سے پہلے پہلے <sup>11</sup> 10 سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرتا ہے، اس جسامت سے چھوٹا (یعنی

کم و بیش نیو گلیئس کی جسامت کا) بلیک ہول ہی الیکٹرانوں کا مسلسل دھارہ پیدا کر سکتا ہے، اگر ہول کی جسامت اس سے زیادہ ہے تو زیادہ تر غیر حقیقی الیکٹرانوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہو گا کہ وہ وقوعی افق (Event Horizon) کو عبور کر کے دوسری طرف جا سکیں تاکہ ان کا قرض ادا ہو۔

کوئی حقیقی ذرہ کتنا فاصلہ طے کرتا ہے اس کا انحصار اس کی زندگی کی طوال پر ہے جس کا تعین - ہیزن برگ کے عدم تیقین کے اصول کے مطابق - توانائی قرض کی مقدار پر ہے، قرض جتنا زیادہ ہو گا زندگی اتنی ہی مختصر ہو گی، توانائی قرض کا ایک بڑا حصہ ذرے کی ساکن حالت کیمیت پر مشتمل ہوتا ہے، اگر ذرہ الیکٹران ہے تو توانائی قرض کی کم از کم مقدار الیکٹران کی ساکن حالت کیمیت کے مساوی توانائی کے برابر ہو گی، لیکن اگر ذرہ الیکٹران سے بڑا ہے مثلاً پروٹان ہے تو ظاہر ہے کہ ساکن حالت کیمیت توانائی بھی زیادہ ہو گی اور قرض مختصر عرصے کے لیے ہو گا، اس لیے ذرے کی زندگی بھی مختصر ہو گی، اس کے برعکس اگر ذرے کی ساکن حالت کیمیت کم ہے، مثلاً نیوٹرینو تو انہیں نیوکلیائی جسامت سے بڑے بلیک ہول بھی پیدا کر سکیں گے، فوٹون کی ساکن حالت کیمیت صفر ہے اس لیے کسی بھی جسامت کا بلیک ہول انہیں پیدا کر سکتا ہے، چنانچہ ایک سورج کی کمیت کا حامل بلیک ہول بھی فوٹون کا، اور ممکنہ طور پر نیوٹرینو کا بھی، دھارا پیدا کر سکتا ہے، لیکن اس صورت میں اس دھار کی شدت بہت ہی کم ہو گی۔

”بہت ہی کم“ کا استعمال کوئی مبالغہ آرائی نہیں، ہاگنگ کے حساب کے مطابق بلیک ہول سے خارج ہونے والی توانائی کا طیف گرم جسم کی اشعاع کاری سے مشابہ ہے، چنانچہ ہاگنگ اشعاع کاری کو بیان کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اسے درجہ حرارت کی اصطلاحات میں بیان کیا جائے، نیوکلیائی جسامت کے ایک ہول (یعنی قطر میں  $10^{-13}$  سینٹی میٹر کا) کا درجہ حرارت بہت اونچا ہوتا ہے یعنی تقریباً دس بلین ڈگری، جبکہ اس کے برعکس ایک سورج کی کمیت کا بلیک ہول ایک کلو میٹر قطر کا ہوتا ہے اور اس کا درجہ حرارت مطلق صفر سے صرف ایک ڈگری کا ایک کروڑواں حصہ زیادہ ہوتا ہے، یہ پورا جسم ہاگنگ اشعاع کاری کی صورت واث کے بلین بلین حصوں میں سے صرف ایک حصہ خارج کرے گا۔

ہاگنگ اثر (Hawking Effect) سے وابستہ عجوبوں میں سے ایک یہ ہے کہ بلیک ہول کی جسامت کم ہونے کے ساتھ ساتھ اس کا درجہ حرارت بھی بڑھتا ہے، مطلب یہ کہ چھوٹے ہول بڑوں کی نسبت زیادہ گرم ہوتے ہیں، توانائی کے اخراج کی صورت میں ان کی توانائی اور نتیجہ کے طور پر کمیت میں کمی ہوتی ہے، یوں بلیک ہول سکڑتا ہے، اس طرح توانائی کے اخراج کی شرح اور جنم میں کمی کی رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے، عدم استحکام اس عمل کی بنیادی ساخت میں شامل ہے، کمیت اور جسامت

کی یہ کمی روز افزوں شرح سے جاری رہتی ہے۔

ہاگنگ اثر سے پیش گوئی کی جاسکتی ہے کہ تمام بلیک ہول بالآخر اشاعع کاری میں خرچ ہو کر غائب ہو جائیں گے، آخری لمحات رنگارنگ نظارہ دیں گے، نیوکلیائی دھاکے کا ساتوانی کا اچانک اخراج ہو گا جس کے بعد کچھ باقی نہیں بچے گا، نظریہ کم از کم بھی بتاتا ہے، لیکن کچھ طبیعت دنوں کے لیے یہ نتیجہ کچھ خوش کن نہیں کہ ایک مادی جسم جو منہدم ہو کر بلیک ہول بتا ہے وہ بھی بالآخر صرف حرارت باقی چھوڑ کر معدوم ہو جائے گا، ان کا مسئلہ یہ ہے کہ دو بالکل مختلف اجسام اپنے آخری لمحات میں معدوم ہونے سے قبل ایک سی حرارت خارج کریں گے اور اپنے اصل کی نشان دہی کرنے والا کوئی سراغ نہیں چھوڑیں گے، اس طرح معدوم ہونا طبیعت کے تمام قوانین بقاء کی خلاف ورزی ہے، ایک تبادل منظر نامہ یوں ہے کہ معدوم ہوتے ہوئے اجسام اپنے پیچھے قلیل سی باقیات چھوڑیں گے جن میں کسی نہ کسی صورت معلومات کا وسیع ذخیرہ موجود ہو گا، ہر دو طریقوں میں ان ہولوں کی کمیت کا غالب حصہ روشنی اور حرارت کی صورت فرار ہو جائے گا۔

ہاگنگ اثر اتناست رفتار ہے کہ تقریباً غیر محسوس ہے، سورج کی کمیت کا ایک بلیک ہول معدوم ہونے میں تقریباً<sup>66</sup> 10 سال لے گا جبکہ سپر کمیت کے حامل جسم کے لیے یہی عرصہ<sup>93</sup> 10 سالوں کے برابر ہو گا، اس عرصے کے بارے میں یہ تخمینہ بھی صرف اس صورت کا رگر ہو گا جب بلیک ہول کا درجہ حرارت کائناتی پس منظری شعاعوں (Background Radiation) کے درجہ حرارت سے زیادہ نہ ہو، بصورت دیگر بلیک ہول جتنی تووانی خارج کرے گا اس سے زیادہ جذب کر لے گا، بگ بینگ کے وقت خارج ہونے والی ان شعاعوں کا درجہ حرارت آج مطلق صفر سے تین درجے زیادہ ہے، بلیک ہول اپنی تووانی خارج کرنے کے ساتھ ان شعاعوں کو جذب بھی کرتے ہیں،<sup>22</sup> 10 سال کے بعد ان شعاعوں کا درجہ حرارت اتنا کم ہو گا کہ بلیک ہول سے خارج ہونے والی تووانی جذب ہونے والی سے بڑھ جائے گی، یعنی کہ ہاگنگ اثر ایسا نہیں کہ آپ اس کے اثرات کا نتیجہ نکلتا دیکھ سکیں۔

بیشگی وقت کا بہت لمبا وقفہ ہے، اگر یہ پیشگی میسر ہو تو بالآخر سارے بلیک ہول حتیٰ کہ سپر نووا سے بنے ہوئے بھی، بالآخر غائب ہو جائیں گے، ابدي کائناتی رات کی سیاہی میں بس روشنی کا ایک لمحاتی شرارہ سما ہوا کرے گا جسے دراصل کبھی موجود تابناک ستاروں کا کتبہ کہا جاسکتا ہے۔

تو پھر باقی کیا بچا؟

تمام مادہ بلیک ہولوں میں نہیں گرتا، ہمیں نیوٹران ستاروں، سیاہ بونوں، کہکشاوں کے درمیان بسیط خلاء میں سرگردان آوارہ ستاروں کے ساتھ بہت زیادہ گیس اور گرد و غبار جو کبھی ستارے نہیں بنی، سیارچوں، دم دار ستاروں اور شہاب ثاقبوں کو بھی زیر غور لانا ہو گا، کیا یہ سب کبھی تباہ نہیں ہو گا؟

یہاں ہمیں نظری مشکلات سے واسطہ پڑتا ہے، ہمیں علم ہونا چاہیے کہ عام مادہ، جس سے ہم اور آپ بھی مرکب ہیں، مطلقاً مستحکم ہے، مستقبل کے بارے میں کوئی حقیقتی اور آخری فیصلہ صرف قدری میکانیات کے علم ہی سے کیا جاسکتا ہے، اگرچہ عام طور پر قدری میکانیات ایٹمی اور تحت ایٹمی (Sub-Atomic) سطح کے معاملات میں بروئے کار لائی جاتی ہے لیکن اس کا اطلاق بڑے اجسام پر بھی ہونا چاہیے، بڑے اجسام کی صورت میں قدری اثرات غیر محسوس حد تک تھوڑے ہوتے ہیں لیکن بہت لمبے عرصے میں یہی بڑی تبدیلیوں کا سبب بن سکتے ہیں۔

اصول عدد تیقین اور امکانیات قدری میکانیات کی شناخت ہیں، قدری دنیا میں کچھ بھی یقینی اور متعین نہیں، صرف امکانات کی بات کی جاسکتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی امر کے وقوع پذیر ہونے کا امکان خواہ کتنا ہی کم کیوں نہ ہو وقت کا مناسب طویل وقفہ دستیاب ہونے کی صورت میں اسے وقوع پذیر ہونا ہی ہے، ہم تابکاری میں اس اصول کو کار فرمادیکھ سکتے ہیں، یورینیم 238 کا نیوکلیئس تقریباً مستحکم ہوتا ہے، بہت تھوڑا سا امکان ہوتا ہے کہ یہ ایک الفا ذرہ (Alpha Particle) خارج کرے اور تھوڑی میں تبدیل ہو جائے، تکنیکی انداز میں بات کی جائے تو یوں ہے کہ ایک اکائی وقت میں کسی ایک خاص یورینیم ایٹم کے انحطاط کا بہت ہی کم امکان ہے، اوسطاً اس میں ساڑھے چار بلین سال لگ سکتے ہیں، لیکن چونکہ طبیعت کے قوانین فی اکائی وقت ایک خاص اور متعین امکان کے مقاضی ہیں اس لیے کسی بھی، زیر غور، یورینیم نیوکلیئس کا بالآخر انحطاط ہو جانا ہے۔

الفاتابکار انحطاط کیوں ہوتا ہے؟ دراصل یورینیم نیوکلیئس میں موجود نیوٹرانوں اور پروٹانوں کے محل وقوع میں ہمیشہ تھوڑا سا عدم تیقین ہوتا ہے، چنانچہ اس امر کا ہمیشہ بہت تھوڑا سا امکان ہوتا ہے کہ ان نیوکلیائی ذرات کا ایک گروہ بہت قلیل وقفہ کے لیے نیوکلیئس سے باہر موجود ہو جہاں سے انہیں دھکیل کر نیوکلیئس سے دور کر دیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح ایٹم کے ٹھوس اور درست محل وقوع پر بھی عدم تیقین ہوتا ہے جو اگرچہ بہت کم ہوتا ہے لیکن صفر بہر حال نہیں ہوتا، ہیرے کی کریسل جالی پر غور کریں، اس میں کسی بھی موجود کاربن ایٹم کا محل وقوع معلوم ہوتا ہے اور بیان کیا جاسکتا ہے، اور کائنات کے دور دراز مقامات پر، جہاں درجہ حرارت مطلق صفر کے قریب ہوتا ہے، اس کا یہ محل وقوع خاصہ مستحکم ہوتا ہے، لیکن

اس کے اس مقام کے بارے میں، بہت کم سہی، عدم تیقین ہمیشہ موجود ہوتا ہے جس کے مضرات میں سے ایک یہ ہے کہ ابٹم اپنی اس جانی سے باہر چھلانگ لگا کر کہیں اور نمودار ہو جائے، ہجرت کے اس مکملہ عمل کا نتیجہ ہے کہ کوئی بھی ٹھوس، حتیٰ کہ ہیرے جیسی سخت چیز بھی، سچی ٹھوس نہیں، اس کے بر عکس ہر ٹھوس شے دراصل انہائی زیادہ نزوجت کی حامل مائع ہے جسے اگر وقت کا مناسب طور پر بہت لمبا عرصہ دیا جائے تو وہ قدری اثرات کے تحت مائع کی طرح بہہ سکتی ہے، نظری طبیعات دان فری میں ڈائی سن کے حساب کے مطابق<sup>65</sup> 10 سال کے بعد احتیاط سے تراشا گیا ہیرا کروی دانہ اور چٹان کا ٹکڑا ایک ہموار گیند کی شکل اختیار کر جائے گا۔

محل و قوع کا عدم تیقین نیوکلیائی تقلیب یعنی کہ ایک عصر کے نیوکلیئس کی دوسرے میں تبدیلی کا سبب بن سکتا ہے، ہیرے کی قلم میں دو ہمسایہ ابٹموں پر غور کریں، اگرچہ یہ بہت کمیاب اور نادر واقعہ ہے لیکن عین ممکن ہے کہ ایک ابٹم کا محل و قوع اچانک تبدیل ہو اور اس کا نیوکلیئس اپنے ہمسائے کے نیوکلیئس کے عین سامنے جانمودار ہو اور دونوں باہم مل کر میگنیشیم کا ابٹم بنادیں، اس نوعیت کے نیوکلیائی ادغام (Fusion) کے لیے بہت بلند درجہ حرارت کی بھی ضرورت نہیں، ٹھنڈا ادغام ممکن ہے، لیکن اس کے لیے درکار وقت بڑا ہے، ڈائی سن نے حساب لگایا کہ<sup>15000</sup> 10 سال کا عرصہ دستیاب ہو تو اس طریقے سے سارا ماہ مسٹکم ترین نیوکلیئس یعنی لوہے میں بدل جائے گا۔

تاہم اس کا امکان بھی موجود ہے کہ نیوکلیائی ماہ اتنے لمبے عرصے تک اپنی بقاء برقرار نہ رکھ سکے، نیوکلیائی ماہ اس سے قدرے تیز لیکن پھر بھی ناقابل قیاس ست رفتاری سے اپنی ماہیت تبدیل کر سکتا ہے، ڈائی سن کے تجھیں کی بنیاد اس امر پر ہے کہ نیوکلیئس کے اندر موجود نیوٹران اور پروٹان تقریباً مطلق حد تک مسٹکم ہیں، دوسرے الفاظ میں اگر پروٹان بلکہ ہول میں نہ گرے تو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے تو یہ ہمیشہ موجود رہے گا، مگر کیا ہم یقین کر لیں کہ یہ سب ایسا ہی ہے؟ میرے دور طالب علمی میں اس پر کسی کوشک نہیں تھا، مفروضہ تھا کہ پروٹان ابد سے ہے، انہیں مطلقاً مسٹکم ذرات خیال کیا جاتا تھا، لیکن اس کے نکتہ چین بھی تھے جو اس خیال کے ناقد تھے، ان شکوک کا تعلق ایک ذرے سے ہے جسے پازٹریان (Positron) یا ثابت الیکٹران کہتے ہیں، یہ پازٹریان پروٹان کے مقابلے میں بہت ہلکے ہیں، چنانچہ اگر باقی تمام حالات یکساں ہوں تو پروٹان ترجیحی طور پر پازٹریانوں میں تقلیب ہونے یعنی بدلنے کو ترجیح دے گا، وجہ یہ ہے کہ طبعی نظام تبدیلیوں کے انتخاب میں اس راستے کو ترجیح دے گا جہاں یہ تو انائی کی کم از کم حالت میں ہوں، اور کم تو انائی کا مطلب کم کمیت ہو گا، اب کوئی بھی کہہ سکتا ہے کہ پھر پروٹان ایسا کیوں نہیں کرتے ہیں، طبیعات دانوں نے مفروضہ قائم کیا کہ لازماً

طبيعت کا کوئی قانون ہو گا جو اس عمل کے آڑے آتا ہو گا، سالوں تک یہ معہ لا بخل رہا، کہیں ستر کی دھائی میں ایک واضح تصویر سامنے آئی کہ کیسے ایک نیو کلینس کے اندر پروٹان اور نیوٹران قدری میکانی (Quantum Mechanically) طور پر ایک دوسرے میں تیزی سے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، جدید ترین نظریات میں وہ قانون فطری طور پر، یعنی خود بخود دوسرے قوانین سے مانوذ ہو کر موجود ہے جو پروٹان کے انحطاط کی لغتی کرتا ہے، لیکن یہ قانون سو فیصدی موثر نہیں ہے، بہت ہی کم امکان یہ بھی ہے کہ پروٹان انحطاط کا شکار ہو کر پازیٹران خارج کرے، پروٹان کی باقی کمیت جزوی طور پر ایک ایسے ذرے کی صورت میں ظاہر ہو گی جس پر کوئی چارج نہیں، اسے پائیون (Pion) کہتے ہیں، مادے کی جو مقدار پازیٹران اور پائیون کے بعد باقی پہنچتی ہے وہ ان دو ذرات کو ملنے والی توانائی میں منتقل ہو جاتی ہے، یہ دونوں ذرات وجود میں آنے کے بعد بہت تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔

سادہ ترین نظریاتی ماذل یا خاکے کی رو سے ایک پروٹان کو انحطاط کے لیے اوسط<sup>28</sup> 10 سال کی ضرورت ہے جو کائنات کی موجودہ عمر سے ایک بلین بلین گناہ مبارعہ ہے، آپ کے ذہن میں خیال آیا ہو گا کہ مندرجہ بالا وجوہات کی بناء پر پروٹان کا انحطاط خالصتاً علمی اور درسگاہی دلچسپی کا حامل مسئلہ ہے، لیکن یہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ انحطاطی عمل قدری میکانی (Quantum Mechanical) ہے اور اپنی ماہیت میں امکانی ہے، چنانچہ<sup>29</sup> 10 اوسط عمر ہے جس کی نظریاتی پیش گوئی کی گئی ہے، یہ پروٹان کی انفرادی اصل عمل نہیں ہے، دراصل اگر<sup>30</sup> 10 پروٹان لیے جائیں تو ہر سال ایک پروٹان کے انحطاط کی توقع کی جانا چاہیے، محض 10 کلو گرام مادے میں پروٹانوں کی یہ مقدار موجود ہوتی ہے۔

لیکن، جیسا کہ ہوتا ہے، اس نظریے کے مقبول ہونے سے پہلے ہی تجربی بنیادوں پر پروٹان کی اس عمر کو خارج از امکان قرار دیا جا چکا تھا، اس نظریے کی مختلف شکلیں یہ عمر<sup>31</sup> 10 اور<sup>32</sup> 10 سال بھی بتاتی ہیں، (کچھ نظریوں نے تو اس عمر کو 10 سال قرار دیا ہے) اس کی جو کم قیمتیں ہیں وہ تجرباتی قیمتیں کے قریب ہیں،<sup>33</sup> 10 سال کے انحطاطِ عمل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جسم میں پوری زندگی کے دوران ایک یا دو پروٹان اس طریقے سے ختم ہوں گے، لیکن اس قدر کمیاب واقعات کا سراغ کس طرح لگایا جائے؟

اس مقصد کے لیے وضع کیے گئے تجربی طریقے میں ہزاروں ٹن مادہ جمع کیا گیا اور اسے بہت ہی حساس آلات کی مدد سے زیر مشاہدہ رکھا گیا، ان آلات کو پروٹان کے انحطاط سے بننے والے ذرات پر چلنے کے لیے تیار حالت میں رکھا گیا تھا، بد قسمتی سے پروٹان انحطاط کی تلاش بھوسے کے ڈھیر سے سوئی ڈھونڈنے کے مترادف ہے، کائناتی شعاعیں اس سے ملتے جلتے واقعات

کا سبب بنتی ہیں جن سے نکلنے والے ذرات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جو تحت ایٹھی ملے کی پس منظری شعاع ہر وقت دیتے رہتے ہیں، اس مداخلت کو کم کرنے کے لیے تجربات کا زیر زمین کیا جانا ضروری تھا، ایسا ہی ایک تجربہ کلیو لینڈ (Cleveland) امریکہ میں زیر زمین نصف میل کی گہرائی پر نمک کی ایک کان میں کیا گیا تھا، تجرباتی آلة دس ہزار ٹن انہائی خالص پانی پر مشتمل تھا جسے ایک مکعب نماٹینک میں رکھا گیا تھا جسے کے گرد حساس سراغ رسائی یا شناخت کنندہ (Detector) لگے ہوئے تھے، پانی کو اس کی شفافیت کی بناء پر چنانگی تھا تاکہ سراغ رسائی ایک وقت میں جتنے زیادہ ممکن ہو فوٹون "دیکھ" سکیں، یہ تجربہ اس اصول پر مبنی تھا کہ اگر تو پروٹان کا اختطاط مروجہ نظریہ کے مطابق ہوتا ہے تو اسے ٹوٹ کر ایک پائیون (Pion) اور ایک پازیٹران بنانا چاہیے جس میں سے اول الذکر چارج کے بغیر ہے، پائیون بعد ازاں اوپھی تووانائی کے حامل فوٹون یعنی گیما ریز میں بدل جاتے ہیں، سب سے آخر میں گیما ریز یا شعاعیں نیوکلیئس سے ٹکرا کر پازیٹران اور الیکٹران کے جوڑے سے بدل جاتے ہیں جو خود کافی تووانائی کے حامل ذرات ہیں، دراصل یہ ثانوی الیکٹران اور پازیٹران اتنے طاقتور ہوں گے کہ پانی میں بھی روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کریں گے۔

روشنی خلاء میں 3 لاکھ کلو میٹر فی سینٹی کی رفتار سے چلتی ہے اور کسی بھی ذرے کے لیے یہ رفتار کی آخری حد ہے، پانی میں روشنی کی رفتار قدرے کم ہو کر 2 لاکھ تیس ہزار کلو میٹر فی سینٹی رہ جاتی ہے، اب اگر کچھ ذرات پانی میں روشنی کی رفتار کے قریب حرکت کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ ان کی رفتار پانی میں روشنی کی رفتار سے زیادہ ہے، جب کوئی طیارہ ہوا میں آواز کی رفتار سے تیز چلتا ہے تو وہ صوتی بوم پیدا کرتا ہے، اسی طرح جب کسی برقی چارج کے حامل ذرے کی رفتار کسی واسطے میں روشنی کی رفتار سے بڑھ جاتی ہے تو یہ ایک خاص برقی مقناطیسی موج خارج کرتا ہے، جسے اس کے دریافت کرنے والے کے نام پر سیرنکوف اشعاں (Cerenkov Radiation) کہا جاتا ہے، مذکورہ بالا تجربہ اسی سیرنکوف شعاعوں کا سراغ لگانے کی غرض سے کیا گیا تھا، بدشتمی سے اوہایو میں برسوں جاری رہنے والا یہ تجربہ پروٹان کے اختطاط کی کوئی مسکت شہادت نہ ڈھونڈ سکا، تاہم - جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے - اس نے سپر نووا 1987A سے خارج ہونے والے نیوٹرینو ضرور شناخت کر لیے، سائنس میں اکثر ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی چیز کی تلاش کرنے کے عمل میں کوئی اور چیز دریافت ہو جاتی ہے، تادم تحریر دوسری جگہوں پر ہونے والے تجربات سے بھی کوئی ثابت جواب نہیں ملا ہے، اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پروٹان کا اختطاط نہیں ہوتا، اور اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی زندگی کا دورانیہ <sup>32</sup> 10 سالوں سے زیادہ ہے، اس سے سست رفتار اختطاط کا سراغ ہماری موجودہ تجربی صلاحیتوں سے زیادہ ہے، چنانچہ امکان یہی ہے کہ مستقبل میں جہاں تک نظر جاتی ہے پروٹان کے اس مسئلے کا حل ملتا نظر نہیں آتا۔

پروٹان اخاطاط پر اس کام کی تحریک مختلف گرانڈ یونی فائنڈ نظریات پر ہونے والے کام سے ملی تھی، ان نظریاتی تحقیقات کا مقصد طاقتوں نیوکلیئی قوت کا کمزور نیوکلیئی قوت اور برقی مقناطیس قوت سے اتحاد تھا، طاقتوں نیوکلیئی قوت نیوکلیئس میں پروٹانوں اور نیوٹرونوں کو باہم پیوست رکھتی ہے جبکہ کمزور نیوکلیئی قوت بیٹھا اخاطاط (Beta Decay) کی ذمہ دار ہے، تحقیقات کی رو سے پروٹان کا اخاطاط اس وقت ممکن ہو گا جب یہ وقتیں بہت تھوڑے وقت کے لیے اہم اختلاط کریں گی، لیکن اگر گرانڈ یونی فلکیشن (Grand Unification) کے یہ نظریات غلط ثابت ہو جاتے ہیں تو بھی پروٹان کے اخاطاط کا امکان ایک دوسرے نظریے کے واسطے سے بھی ممکن ہے یعنی کہ تجاذب کے واسطے سے جو فطرت کی چوتھی بنیادی قوت ہے۔

یہ سمجھنے کے لیے کہ تجاذب کس طرح پروٹان کے اخاطاط کا سبب بن سکتا ہے اس حقیقت کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ پروٹان کسی نقطے کا سا بنیادہ ذرہ نہیں ہے، یہ تین اور ذرات سے مل کر بناتے ہیں جنہیں کوارک (Quark) کہتے ہیں، پروٹان کا قطر عام حالات میں سینٹی میٹر کے دس ٹریلیون حصوں میں سے ایک ہے، کوارکوں کا درمیانی فاصلہ بھی یہی ہے، لیکن پروٹان کے اندر کوارک ساکن نہیں رہتے بلکہ قدری میکانی عدم تیقین (Quantum Mechanical Uncertainty) کے باعث اپنی جگہیں تبدیل کرتے رہتے ہیں، وہاً فوتاً کوارکوں میں سے دو ایک دوسرے کے بہت قریب آجاتے ہیں، بہت ہی کم ایسا ہوتا ہے کہ تینوں کوارک یکساں طور پر باہم بہت قریب ہوں، عین ممکن ہے کہ کبھی یہ ایک دوسرے کے اتنے قریب آجائیں کہ ان کے مابین تجاذبی قوت، جو عام حالات میں بہت کمزور ہوتی ہے، دوسری تمام قوتوں پر غالب آجائے، اس صورت میں کوارک باہم مل کر ایک نہایت سا بلیک ہول بنادیتے ہیں، در حقیقت قدری میکانی ٹنلینگ (Quantum Mechanical Tunneling) کے تحت یہ اپنی ہی تجاذبی قوت کے اندر پس جاتا ہے، اس طرح جو بلیک ہول بنتا ہے بہت زیادہ غیر مستحکم ہوتا ہے اور تقریباً فوراً ہی معدوم ہو جاتا ہے، نتیجہ کے طور پر ایک پازیٹران پیدا ہوتا ہے اس واسطے سے پروٹان کا اخاطاط انتہائی غیر متقین ہوتا ہے اور اس میں  $10^{45}$  سالوں سے لے کر  $10^{220}$  سال لگ سکتے ہیں۔

اگر پروٹان کے اخاطاط کو اتنا بہت لمبا عرصہ لگتا ہے تو بھی اس کے کائنات کے مستقبل بعید پر اہم اثرات مرتب ہوتے ہیں، یوں تمام مادہ غیر مستحکم ثابت ہوتا ہے اور اسے بالآخر معدوم ہو جانا ہے، سیارے جیسے اجسام بھی جو بلیک ہول میں نہیں گرتے وہ بھی بالآخر غائب ہو جائیں گے، یوں کہنا بہتر ہو گا کہ رفتہ رفتہ یہ بخارات میں بدل جاتے ہیں، اگر پروٹان کی زندگی کا دورانیہ  $10^{32}$  سال بھی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ زمین میں سے سالانہ ایک ٹریلیون پروٹان کم ہو رہے ہیں، اگر ہم

فرض کریں کہ زمین کسی اور طرح تباہ نہیں ہوتی تو پروٹان کی "تبخیر" سے اسے ختم ہونے میں <sup>33</sup> 10 سال لگتے ہیں۔ نیوٹران ستارے بھی اس عمل سے مامون نہیں ہیں، نیوٹران بھی کوارکوں سے مل کر بنے ہوئے ہیں اور جس اصول کے تحت پروٹان تباہ ہوتے ہیں اسی طرح نیوٹرانوں کی بھی "تبخیر" ہوتی ہے، نیوٹران اگر نیوکلیئس سے باہر ہوں تو غیر مستحکم ذرات ہوتے ہیں اور تقریباً 15 منٹ میں انحطاط سے دوچار ہوتے ہیں جو <sup>48</sup> 10  $\mu$ ن عام مادہ ہمیں نظر آتا ہے اسے یا تو بلیک ہولوں میں عائب ہوجانا ہے یا پھر نیوکلیئی انحطاط کا شکار ہو کر معدوم ہوجانا ہے۔

بلاشبہ جب نیوٹران اور پروٹان ٹوٹتے ہیں تو کچھ ذرات نکلتے ہیں، اس طرح یہ نہیں ہو سکتا کہ فضاء ہر قسم کے ذرات سے کامل خالی ہو جائے، کیونکہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ جب نیوٹران ٹوٹتا ہے تو پائیون اور پازیٹران پیدا ہوتے ہیں، غیر چارج شدہ پائیون (Pion) بہت غیر مستحکم ہے اور فوراً ہی دو فوٹون یا الیکٹران-پازیٹران جوڑے کی صورت ٹوٹ جاتا ہے، معاملہ جو بھی رہا ہو، پروٹان کے انحطاط کے نتیجے میں کائنات میں پازیٹران کی تعداد بڑھتی چلی جائے گی، طبیعت دانوں کا یقین ہے کہ کائنات میں ثابت چارج والے ذرات (تا حال زیادہ تر پروٹان) اور منفی چارج والے ذرات (زیادہ تر الیکٹران) کی تعداد برابر ہے، یوں دیکھا جائے تو پروٹان کے کامل انحطاط کے بعد کائنات میں پازیٹرانوں اور الیکٹرانوں کی تعداد برابر ہونا چاہیے، اب پازیٹران الیکٹران کا ضد ذرہ (Anti Particle) ہے، جوں ہی الیکٹران اور پازیٹران ملتے ہیں یہ ایک دوسرے کو عائب کر دیتے ہیں، اس عمل کا تجربہ گاہ میں مشاہدہ ہو چکا ہے، جب یہ ایک دوسرے کو ختم کرتے ہیں تو فوٹون کی شکل میں تو انائی کا اخراج ہوتا ہے۔

ریاضیاتی عمل سے حساب لگایا گیا ہے کہ جب مستقبل بعید میں کائنات میں صرف الیکٹران اور پروٹان رہ جائیں گے تو کیا وہ ایک دوسرے کی کل تعداد کو ختم کر دیں گے یا پھر کچھ نہ کچھ مقدار ہمیشہ باقی نچ جائے گی، الیکٹران-پازیٹران فنا (Annihilation) کا یہ عمل فوراً نہیں ہوتا، سب سے پہلے دونوں ذرات مل کر ایک چھوٹا سا ایٹم بناتے ہیں جس میں دونوں ذرات اپنے مشترکہ کمیت مرکز کے گرد باہمی برقی کشش کے باعث گردش کرتے ہیں، تاہم ان ذرات کا چھوٹے ہوتے ہوئے مرغولے نمارستے پر سفر کرتی دیر جاری رہتا ہے اس کا انحصار پوزیٹریونم ایٹم بنتے وقت الیکٹران اور پروٹان کی ابتدائی حالت پر ہے۔

ریاضیاتی حساب سے پتہ چلتا ہے کہ زیادہ تر الیکٹرانوں اور پازیٹرانوں کو ایک پازیٹریونم بنانے میں <sup>71</sup> 10 سال کا عرصہ لگے گا

اور ایسے زیادہ تر واقعات میں ان ایٹموں کا قطر کئی ٹریلین نوری سال ہو سکتا ہے، ذرات اتنی آہنگی سے حرکت کریں گے کہ انہیں ایک سینٹی میٹر کا فاصلہ طے کرنے میں کئی ملین سال لگیں گے، چنانچہ سارا عمل اتنی سست رفتاری سے ہو گا کہ انہیں اپنے مرغولہ نمارستے پر چل کر فنا ہونے میں<sup>116</sup> 10 سال لگیں گے، بہر صورت پازیٹرینم ایٹم کا انجام ان کے لمحے مستقبل کے ساتھ ہی متعین ہو جاتا ہے۔

دلچسب بات یہ ہے کہ سب الیکٹران اور پازیٹران فنا نہیں ہوں گے، جوں جوں ان کو اپنے ضد ذرات Anti Particle ملتے جائیں گے ان کی کثافت یعنی کہ تعداد فی اکائی جنم کم ہوتی چلی جائے گی، ایک وجہ تو ان کا فنا ہونا ہو گا اور دوسری وجہ کائنات کا پھیلاوہ، وقت گزرنے کے ساتھ نئے پازیٹران بننے کی شرح کم ہوتی جائے گی، چنانچہ مادے کی باقیات وقت گزرنے کے ساتھ کم سے کم ضرور ہوتی جائیں گی لیکن ایسا لمحہ نہیں آئے گا جب مادہ بالکل ناپید ہو جائے، ایک وقت آئے گا جب خلاء کی وسعتوں میں کوئی ایک الیکٹران یا پازیٹران موجود ہو گا۔

چنانچہ اب ہم کائنات کی ایک تصویر بناسکتے ہیں کہ ان ناقابلِ یقین حد تک سست دو عملوں کے بعد یہ کس طرح کی ہو گی، اول تو بگ بینگ کی باقیات موجود ہیں جیسے پس منظری شعاعیں جو تب بھی موجود ہوں گی، اس میں فوٹون، نیوٹرینو اور مکنہ طور پر ایسے مستحکم ذرات شامل ہوں گے جنہیں شاید ہم بھی نہیں جانتے، کائنات کے پھیلاوہ کے ساتھ ساتھ ان ذرات کی توانائی کم از کم ہوتی جائے گی حتیٰ کہ ان کی حیثیت صرف ناقابلِ ذکر پس منظر کی رہ جائے گی، کائنات کا عام مادہ، جسے ہم جانتے ہیں، غائب ہو چکا ہو گا، تمام بلیک ہولوں کی تباہ ہو چکی ہو گی، اگرچہ بلیک ہول زیادہ فوٹون کی صورت میں تباہ پائیں گے لیکن کچھ نیوٹرینو بھی ہوں گے، پھر بہت تھوڑا سا حصہ ان الیکٹرانوں، پروٹانوں، نیوٹرانوں اور دوسرے بھاری ذرات پر بھی مشتمل ہو گا جو ان ہولوں کے آخری مرتبہ پھٹنے پر نکلتے ہیں، بھاری ذرات کا جلدی اتحاط ہو جائے گا جبکہ نیوٹرانوں اور پروٹانوں کا اتحاط سست رفتار ہو گا جن کی پیداوار پھر الیکٹران اور پازیٹران ہوں گے جو ان الیکٹرانوں اور پازیٹرانوں میں شامل ہو جائیں گے جو ہمارے آج کے تمام مادے کی باقیات ہوں گی۔

چنانچہ مستقبل بعید کی کائنات فوٹون، نیوٹرونوں اور سست روی سے لڑھکتے الیکٹرانوں کے انتہائی لطیف آمزیے پر مشتمل ہو گی جو مستقبل طور پر ایک دوسرے سے دور سے دور ہٹتے چلے جا رہے ہوں گے، ہمارے اب تک کے علم کے مطابق اس کے بعد کوئی واقعہ رونما نہیں ہو گا، اس مرحلے کو ابدی موت کے نام سے موسوم کرنا زیادہ بہتر ہو گا۔

یہ ٹھنڈا، تاریک، بے چہرہ اور تقریباً "عدم" مستقبل بعید کی کائنات کا وہ خاکہ ہے جس کے حوالے سے جدید کامپووٹر یا کونیات انیسویں صدی کی "حرارتی موت" کے نظریے کے قریب آجاتی ہے، اس حالت کو پہنچنے میں جتنا وقت لگے گا وہ انسانی تصور سے بعید ہے، لیکن یہ وقت چاہے جتنا ہی طویل کیوں نہ ہو یہ دستیاب لامدد وقت کا صرف ایک اور چھوٹا سا حصہ ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا ہے کہ ہیشگی بہت لمبا وقت ہے۔

اگرچہ کائناتی اخاطط وقت کے انسانی پیگانے پر اتنا سست ہے کہ تقریباً بے معنویت کی حد تک کم ہے لیکن پھر بھی لوگ بے تابی سے پوچھتے ہیں کہ ہماری اگلی نسلوں کا کیا بنے گا؟ کیا ایک ایسی کائنات ناگزیر طور پر ان کا مقدر ہے جسے ست روی سے لیکن یقینی طور پر مرتضیٰ ہے، سائنس کے اب تک کے علم کے مطابق زندگی کے لیے حالات اتنے خوش کن نہیں اور ہر قسم کی زندگی کو آخر کار ختم ہونا ہے، لیکن یہ موت اتنی سادہ نہیں۔

## آہستہ حنر ام زندگی

1972 میں کلب آف روم (Club of Rome) نامی ایک تنظیم نے انسانیت کے مستقبل پر ایک پر ملال حزنيہ The Limits to Growth کے نام سے شائع کیا، جن بڑے بڑے حادثات کا انہوں نے دعویٰ کیا تھا ان میں سے ایک چیز دہائیوں میں معدنی تیل کے ذخائر کے خاتمے کی پیش گوئی بھی تھی، لوگ چونکے ہو گئے، تیل کی قیمتیں بڑھ گئیں اور توانائی پر تحقیق ایک رواج بن گیا، اب ہم 90 کی دہائی میں ہیں اور تیل کے زیر زمین ذخائر کے معدوم ہونے کے کوئی آثار نہیں، نتیجہ کے طور پر ایک بار پھر اس طرف سے بے فکری ہو گئی ہے، بد قسمتی سے سادہ حسابی طریقے بھی بتاتے ہیں کہ اگر محدود ذخائر کو مستقل طور پر کم ہوتی ہوئی شرح سے استعمال نہ کیا جائے تو وہ لا محدود عرصے تک نہیں چل سکتے، جلد یا بدیر توانائی کا بحران آنا ہے، اس طرح کا نتیجہ زمین کی آبادی کے بارے میں بھی اخذ کیا جاسکتا ہے کہ اس کی بڑھوٹی بھی لا محدود شرح پر جاری نہیں رہ سکتی۔

کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ختم ہوتی ہوئی توانائی اور کثرتِ آبادی کے بحران کے ہاتھوں نوعِ انسانی ہمیشہ کے لیے مٹ جائے گی، حالانکہ معدنی تیل کے خاتمے اور نسل انسانی کے معدوم ہونے کو باہم م Schroedt کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ بے پناہ توانائی کے ذخائر ہمارے ارد گرد موجود ہیں بشرطیکہ ہم انہیں قابو کرنے کی خواہش اور صلاحیت رکھتے ہوں، سب سے قبل ذکر شمسی توانائی ہے جس میں ہماری ضرورت سے بھی زیادہ توانائی موجود ہے، سب سے بڑا مسئلہ آبادی کے بہاؤ کو روکنا ہے اس سے پہلے کہ یہ کام کوئی بہت بڑا قحط ہمارے لیے انجام دے دے، اس مسئلے کا حل واقعی مشکل ہے، اس کے لیے سامنے سے زیادہ سماجی اور اقتصادی مہارتوں کو بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، تاہم اگر ہم معدنی تیل کے ختم ہونے سے پیدا ہونے والی مشکلات پر قابو پاسکیں، اگر ہم بغیر کسی خوفناک سانحے کے انسانی آبادی میں استحکام لا سکیں اور اگر ماحولیاتی

اور شہابی تصادم کے خطرات کو محدود کیا جاسکے تو مجھے یقین ہے کہ نوعِ انسانی کا مقدر معلوم ہونا نہیں، کوئی ایسا قانونِ نظرت نہیں ہے جو ہماری نسل کی طوالت پر حد لگاتا ہو۔

جیسا کہ پچھلے ابواب میں بیان ہوا ہے کہ کس طرح انتہائی لمبے عرصے میں کائنات کی بناءت میں تبدیلی آئے گی، اس تبدیلی کا عمومی رخ تخریبی ہو گا، لیکن ان کے ذمہ دار طبعی عوام کی رفتار بہت سست ہے، انسان تقریباً پانچ ملین سال سے موجود ہے (اس وقت کی طوالت کا انحصار ”انسان“ کی تعریف پر ہے) اور تہذیب محض چند ہزار سال سے، کہہ ارض مزید تین بلین سال تک قابلِ رہائش رہے گا بشرطیکہ آبادی مستحکم ہو جائے، یہ اتنا لمبا عرصہ ہے کہ انسانی تخلیل کے احاطے سے بھی باہر ہے، اتنے لمبے عرصے کو عملی طور پر لا محدود کہا جاسکتا ہے، لیکن ہم دیکھے چکے ہیں کہ فلکیاتی اور کائناتی تبدیلیوں کو زمانی پیانا پر دیکھا جائے تو ایک بلین سال صرف پلک جھپکنے کے متراوف ہے اور پھر ہو سکتا ہے کہ کہہ ارض جیسی رہائشیں ہماری کہکشاں میں بلین بلین سالوں سے موجود ہوں۔

ہم یقیناً اپنی آنے والی نسلوں کو چشمِ تخلیل سے دیکھ سکتے ہیں جن کے پاس خلائی تحقیق اور دوسری صنعت و حرفت کی ترقی کے لیے بہت لمبا عرصہ موجود ہے، سورج کے گھس کر ختم ہونے سے پہلے انہیں اس کہہ ارض کو چھوڑ جانے کی لمبی مہلت ملے گی، وہ ایک کے بعد دوسرا مناسب سیارہ تلاش کر سکتے ہیں، ایک بار خلاء میں نکل جانے کے بعد وہ اپنی آبادی بھی بڑھا سکتے ہیں، کیا یہ جاننا کسی حد تک تشفی بخش ہے کہ نوعِ انسانی کے استقرار کی بیسویں صدی میں کی گئی کوششیں رائیگاں نہیں گئیں؟

باب دوم میں برٹنینڈِ رسول کا ذکر کیا گیا تھا کہ کیسے اس نے حرکیات کے دوسرے قانون کے نتائج و عواقب سے جنم لینے والی ماہیوی کے نتیجہ میں سورج کے آخر کار ختم ہو جانے کے باعث انسانی وجود کے بے سود ہونے کو تلغیہ انداز سے بیان کیا تھا، رسول نے واضح طور پر محسوس کیا کہ نسل انسانی کے اس گھروندے یعنی کہہ ارض کے انہدام کے ناجائز ہونے نے حیاتِ انسانی کے ساتھ ایک بے مقصدیت بلکہ تفحیک وابستہ کر دی ہے، اس طرزِ فکر نے بھی اس کے مائل بہ دہرات ہونے میں حصہ لیا ہو گا، فرض کریں کہ رسول کو پتہ ہوتا کہ نظامِ شمسی کے تباہ ہونے کے بعد بھی بلیک ہول تجازی قوت سورج سے بھی زیادہ توانائی کئی ٹریلیون سال مہیا کر سکتی ہے تو کیا اس کے احساسات مختلف ہوتے؟ غالباً نہیں، اصل مسئلہ یہ نہیں کہ کتنے عرصے کے بعد بلکہ یہ ہے کہ جلد یا بدیر کائنات انسان کے لیے قابلِ رہائش نہیں رہے گی، یہی خیال کچھ لوگوں کو محسوس کرواتا ہے کہ انسانی زندگی بے مقصد ہے۔

ساتویں باب کے آخر میں کائنات کے مستقبل بعید کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ نسل انسانی کے لیے اس سے کم موافق اور زیادہ مختلف صورتِ حال کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، تاہم ہمیں قوطی یا متعصب ہونے کی ضرورت نہیں، بلکہ الیکٹرانوں اور پازیٹرانوں کی لطیف فضائے پر مشتمل کائنات میں زندہ رہنا نسل انسانی کے لیے آسان کام نہیں ہو گا، لیکن اہم مسئلہ یہ نہیں کہ نوع انسانی اپنی موجودہ شکل میں لافانی ہو بلکہ یہ ہے کہ آیا ہمارے جانشین اپنا وجود برقرار رکھ سکیں گے یا نہیں، اور ہمارے جانشینوں کے ہماری طرح کے انسان ہونے کے امکانات بہت کم ہیں۔

کرہ ارض پر نوع انسانی (Homo Sapiens) حیاتیاتی ارتقاء کا نتیجہ ہے، لیکن آج ارتقاء کے ذمہ دار عوامل ہماری اپنی سرگرمیوں کے باعث تیزی سے بدل رہے ہیں، ہم فطری انتخاب میں پہلے سے ہی مداخلت کر چکے ہیں، مطلوبہ جینیاتی یا وراثتی تبدیلیوں کی ٹیکنالوجی روز افزود ترقی کر رہی ہے، جلد ہی ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ جین کی سطح پر تبدیلیاں کر کے مطلوبہ خصوصیات، رویے اور جسمانی ہیئت کے انسان معرض وجود میں لا سکیں، تکنیکی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد صرف چند دہائیوں کے اندر اور یہ حیاتیاتی تکنیکیں سامنے آگئی ہیں، اسی سے اندازہ کریں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی ہزاروں بلکہ لاکھوں سال کی کامیابی کیا ہو گی، چند دہائیوں کے کام نے انسان کو کرہ ارض سے نکل کر فضاء میں مہم جوئی کے قابل بنایا ہے، ایک ہزار یا اس سے زیادہ سالوں میں ہمارے جانشین اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ کرہ ارض سے نکل کر نظام شمسی بلکہ کہکشاں میں موجود دوسرے سیاروں پر آبادیاں بنائیں، لوگوں کو پیشتر اوقات یہ غلط فہمی ہوتی ہے کہ اس قسم کے کام لامحدود وقت کے مقاضی ہیں، ایسا نہیں ہے، اس نو آبادیاتی عمل میں ایک کے بعد اس سے اگلے دوسرے سیارے پر چھلانگ لگائی جائے گی، نو آباد کار چند نوری سال کے فاصلے پر جا کر آباد ہونے کے لیے زمین سے روانہ ہوں گے اور اگر وہ روشنی کی رفتار سے قدرے کم پر سفر کر سکے تو انہیں اس عمل میں یہی چند سال لگیں گے، بہ فرضِ محال ہمارے جانشین روشنی کی رفتار کا صرف ایک فیصد بھی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، جو کوئی بہت نا ممکن الحصول منزل نہیں، تو اس سفر میں زیادہ سے زیادہ چند صدیاں لگیں گی، نئی آباد کاری مکمل ہونے میں کچھ زیادہ صدیاں لگ سکتی ہیں جس دوران اصل آباد کاروں کی اولادیں کسی اگلے سیارے کی تلاش میں خود اپنے ہر اول دستے بھینے کی تیاری کریں گی، اگلی کچھ صدیوں میں وہ نئے سیارے بھی آباد ہو جائیں گے اور یوں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اسی طریقے سے پولی نیشیا کے لوگوں نے بھر الکاہل کے جزاً آباد کیے تھے، کہکشاں عبور کرنے میں روشنی کو صرف ایک سو ہزار برس لگتے ہیں، اس رفتار کے ایک فیصد پر یہی عرصہ دس ملین سال کا ہو جاتا ہے، اگر راہ میں آنے والے ایک سو ہزار سیاروں پر نو آبادیاں بنائی جائیں اور ان میں سے ہر ایک مستحکم ہونے میں دو صدیاں لے تب بھی کہکشاں کو نو آبادی بنانے میں صرف تیس ملین سال لگتے ہیں، تیس ملین سال

کا عرصہ فلکیاتی بلکہ علم الارض کے وقت پیانے پر بہت قلیل عرصہ ہے، سورج کو کہکشاں میں اپنے مدار پر ایک چکر مکمل کرنے میں دو سو ملین سال لگتے ہیں، کہہ ارض پر زندگی کا وجود اس عرصے سے کم از کم سترہ گناہ زیادہ پرانا ہے، سورج کے بڑھاپے سے زمین کو ابھی دو تین بلین سال تک کوئی خطرہ لاحق نہیں، چنانچہ تیس بلین سال میں کوئی قبل ذکر تبدیلی رونما نہیں ہوگی، چنانچہ کہہ ارض پر زندگی کو وجود میں آنے کے بعد ایک تینیکی معاشرہ بننے میں جتنا وقت لگا اس کے بہت تھوڑے سے حصے میں انسان کہکشاں کو نو آبادی بنائے گا۔

ہمارے یہ جانشین نو آباد کار کس طرح کے ہوں گے؟ اگر ہم اپنے تخیل کے قید و بند ذرا ڈھیلے کر دیں تو ہم قیاس آرائی کر سکتے ہیں کہ ان نو آباد کاروں کو متوقع اور منتخب نئے سیارے کے حالات کے مطابق بہ آسانی ڈھلنے کے نقطہ نظر سے خصوصی طور پر ڈیزائن کیا جائے گا جس میں ظاہر ہے تو ارشی یعنی جنینک انجینیرنگ مدد دے گی، مثال کے لیے فرض کریں کہ ستارہ ایپسائٹن ایریڈینی ([Epsilon Eridani](#)) کے گرد ایک سیارہ دریافت ہوتا ہے، اگر یہ سفر کچھ صدیاں طویل بھی ہوں تو کچھ زیادہ بڑے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، کشتی نوح جیسے خلائی جہاز بنائے جا سکیں گے جن کا ماحول مکمل طور پر خود مکتنقی ہو گا یعنی کہ اس میں مطلوبہ ماحول کو برقرار رکھنے کا سارا انتظام موجود ہو گا، یہ اس قابل ہو گا کہ مسافروں کی کئی نسلیں اس میں زندگی گزار سکیں، نو آباد کاروں کو محمد کر کے بھی سفر پر روانہ کیا جاسکتا ہے، دانش مندی کا تقاضہ یہ ہو گا کہ جہاز میں مسافر کم از کم ہوں اور سامان میں بار آور انسانی اندھے محمد کر کے رکھ دیے جائیں، منزل پر پہنچنے کے بعد ان کی بڑھوٹی کروالی جائے، یوں ایک تو درکار آبادی فوراً دستیاب ہو جائے گی اور دوسرے بالغ انسانوں کی بڑی تعداد کو لمبے عرصے تک سفر میں رکھنے سے پیدا ہونے والے سماجی اور نقل و حمل کے مسائل سے بھی واسطہ نہیں پڑے گا۔

بہت زیادہ دستیاب وقت کو مد نظر رکھ کر ممکنات کا جائزہ لیا جائے تو پھر کیا لازم ہے کہ وہ آباد کار انسانوں کے سے نظر آئیں یا ویسی ذہنیت کے حامل ہوں، اگر مختلف ضروریات کے مطابق مخلوق تیار کی جاسکے تو پھر ہر نئی مہم کے لیے جو ہر اول دستے بھیجے جائیں ان کی جسمانی ساخت اور فعلیات متوقع مخصوص حالات کے مطابق وضع کی جائے گی۔

ضروری نہیں کہ آباد کار - لفظ کی مروجہ اصطلاح میں - جاندار اجسام ہی ہوں، انسانوں میں سلیکان چپ مائیکرو پروسیسر کی تنصیب ممکن ہو چکی ہے، اس ٹیکنالوجی کے ممکنہ نتائج میں سے ایک نتیجہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ نامیاتی اور الیکٹر انک اعضا پر مشتمل اجسام معرضِ وجود میں آجائیں، ہو سکتا ہے انسانی دماغ میں نصب کرنے کے لیے ایسے آلات وجود میں آجائیں جنہیں دماغ میں نصب کر کے یادداشت کو ضرورت کے مطابق وسعت دی جاسکے لیکن اس کے بر عکس بھی ہو سکتا ہے کہ حسابی عمل

کے لیے نامیاتی مادہ سالڈ سٹیٹ آلات سے زیادہ بہتر کارکردگی کا حامل ثابت ہو جائے، کمپیوٹر کے اجزاء حیاتیاتی طریقے سے "اگانا" ممکن ہو جائے گا، بہت امکان ہے کہ کئی کاموں کے لیے ڈیجیٹل کمپیوٹر کی جگہ عصبی جال (Neural Nets) کام کرنے لگیں، انسانی ذہانت کی نقل اور اقتصادی رویے کے پیش میں آج بھی ڈیجیٹل کمپیوٹر کی جگہ عصبی جال استعمال ہو رہے ہیں، اور عصبی جال کو نئے سرے سے ترتیب دینے سے بہتر ہو گا کہ انسانی ذہن کے بہت چھوٹے ٹکڑوں کی پروش سے حاصل کر لیے جائیں، نینو ٹیکنالوجی یعنی خوردگینی سطح کے پیداواری عمل کی ترقی کے ساتھ ساتھ جاندار اور غیر جاندار، فطری اور مصنوعی، کمپیوٹر اور دماغ کا فرق روز بروز غیر واضح اور کم ہوتا چلا جائے گا۔

آج ایسی پیش گوئیاں سائنسی ادب کا میدان عمل ہیں، ان کے سائنسی حقائق بننے کے کیا امکانات ہیں؟ کیونکہ کسی چیز کے تخلی میں آجائے کا لازمی مطلب یہ نہیں کہ عملی طور پر بھی ویسا ہی ہو جائے، تاہم ہم ٹیکنالوجی کے لائحہ عمل پر بھی اسی اصول کا اطلاق کریں جس کا فطری عمل کیا تھا تو صورت حال بدل جاتی ہے، مناسب اور مطلوبہ مہلت ملنے کی صورت میں جو چیز ہو سکتی ہے ہو جائے گی، اگر انسان اور اس کے جانشین مناسب دلچسپی لیتے رہے تو صرف طبیعت کے قوانین ہی ٹیکنالوجی کی ترقی کی حدود متعین کریں گے، انسانی جینوم (Genome) جیسے منصوبوں کی کامیابی میں صرف مدت حائل ہو گی، ہو سکتا ہے ایک نسل اس میں کامیاب حاصل نہ کر سکے، لیکن اگر سو ہزار یا ایک سو ملین نسلوں کو اس کام کی مہلت ملے تو مسئلہ بالکل سیدھا سادہ ہے۔

اگر ہم اپنی بقاء اور ٹیکنالوجی کی آخری حدود تک ترقی پر رجائیت پسند ہو جائیں تو کائنات کی دریافت پر اس کے مضرمات کیا ہوں گے؟ کام کی نوعیت کے مطابق ذی شعور اشیاء بنا شروع ہو جائیں تو امکانات کے نئے دروازے کھلیں گے، ان کارندوں کو کمل ناساز گار جگہوں پر بھی ایسے ایسے کاموں کے لیے بھیجا جاسکے گا جن کا آج تصور بھی نہیں کیا جاسکتا، اگرچہ ان کی تعمیر میں انسانی ساخت کے عنصر شامل ہوں گے لیکن وہ بہر حال انسان نہیں ہوں گے۔

اس مذکورہ بالا مخلوق کے انسان کی جگہ لے لینے کے خیال سے بہت سے لوگوں کو جذباتی دھپکا لگتا ہے، اگر بقاء کا تقاضہ ہو کہ نوع انسانی کی جگہ جینیاتی طور پر وضع کیا گیا نامیاتی کمپیوٹر لے تو ہم غالباً ناپید ہونے کا راستہ اختیار کریں گے، اور اگر نوع انسانی کے ناپید ہونے کا امکان ہمیں یا سیت سے دوچار کرتا ہے تو پھر ہمیں اس سوال پر سنجیدگی سے غور کرنا ہو گا کہ انسان میں کیا ہے جس کی حفاظت ہماری ترجیح ہے، جسمانی شکل و شباهت تو یقیناً نہیں، فرض کریں کہ ہمارے علم میں آتا ہے کہ مثلاً ایک ملین سال بعد ہمارے جانشین اپنے پاؤں کے انگوٹھے کھو چکے ہوں گے تو کیا ہم واقعی پریشان ہوں گے؟ اور کیا

ٹانگوں کے چھوٹے اور سر اور دماغ کے نسبتاً بڑے ہو جانے کے امکان پر بھی اسی طرح کے ردِ عمل کا اظہار کریں گے؟ پچھلی کچھ صدیوں میں بھی تو ہماری جسمانی شکل و شبہت میں کافی تبدیلیاں آتی رہی ہیں اور آج بھی اس حوالے سے مختلف نسل کے انسانوں کے ما بین کافی فرق پایا جاتا ہے۔

اگر ایسا وقت آجاتا ہے کہ ہمیں مستقبل میں محفوظ رکھنے کے لیے ترجیحی انتخاب کرنا پڑے تو میرا مفروضہ ہے ہم انسانی روح کو بچائیں گے یعنی انسانی ثقافت، اقدار اور اپنی ذہنیت کو جو کہ فنا رانہ، سائنسی اور فلکری کارناموں کی صورت میں اپنا اظہار پاتی ہیں، یقیناً یہی چیزیں محفوظ رکھنے کی ہیں اور تسلسل کی مستحق بھی، اگر ہم اپنی روح انسانیت کو اپنے جانشیوں تک منتقل کر سکیں، چاہے ان کی جسمانی وضع قطع کیسی ہی کیوں نہ ہو، تو ہم اہمیت کی حامل اشیاء کی بقاء میں کامیاب ہو جائیں گے۔

ایسی انسان نما مخلوق کی پیداوار کے کیا امکانات ہیں جو کائنات میں پھیل سکے؟ اس پر جو کچھ بھی کہا جائے گا مفروضوں پر منی ہو گا، معاملات سے قطع نظر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان میں اس طرح کے بڑے منصوبے کے لیے ضروری جذبہ ہی ختم ہو گا، یا زمین سے نکلنے کی کوئی سجدہ کوشش ہونے سے پہلے ہی انسان کسی اقتصادی، ماحولیاتی یا کسی بھی حادثے کا شکار ہو کر صفحہ ہستی سے ناپید ہو جائے، یہ بھی خارج از امکان نہیں کہ انسان کے علاوہ بھی اور زیادہ ترقی یافتہ مخلوق ہو جو پہلے سے ہی کائنات کے موزوں سیارے پر قابض ہو چکی ہو، لیکن یہ کام خواہ ہمارے جانشین کریں یا کسی اور سیارے پر موجود کوئی اجنبي مخلوق، بذریعہ ٹیکنالوجی کائنات میں پھیلنے کا خیال مسحور کریں ہے، لیکن یہاں ایک اور ناگزیر سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ یہ عظیم دوڑ کائناتی توڑ پھوڑ کے ساتھ کس طرح کی مطابقت رکھتی ہوگی، طبیعاتی اخاططاں کا وقفہ اتنا طویل ہے کہ ٹیکنالوجی کی موجودہ صورت حال کے میں نظر مستقبل میں اس پر کچھ قیاس کرنا لا حاصل ہے، ایسے معاشرے کی ٹیکنالوجی کا اندازہ کون کر سکتا ہے جس کی عمر ایک ٹریلیون برس ہو، لیکن ٹیکنالوجی خواہ کتنی بھی ترقی ہو سائنس کے بنیادی قوانین سے زاد نہیں ہو سکتی، مثلاً اگر نظریہ اضافیت درست ہے تو ٹیکنالوجی خواہ کتنی ہی ترقی کر جائے کسی مادی جسم کے لیے روشنی کی رفتار سے زیادہ یا اس کے برابر رفتار سے سفر کرنا ممکن نہیں، اور پھر ایک بنیادی قانون یہ ہے کہ کسی بھی طرح کی سرگرمی کے لیے توانائی لازم ہے، توانائی کم استعمال ہو سکتی ہے لیکن اس کی کو صفر پر نہیں لایا جاسکتا تو پھر ایک ایسی کائنات میں جہاں دستیاب توانائی روز بروز کم ہو رہی ہے مستقبل کے ٹیکنالوجیکل معاشرے کا کیا بنے گا۔

اگر ہم وسیع تر تعریف کی رو سے ذی شعور مخلوق کا تعین کریں اور پھر اس پر بنیادی سائنسی قوانین کا اطلاق کریں تو ہم تحقیق کر سکتے ہیں کہ آیا کائناتی زوال اس کی بقاء کی راہ میں کوئی بنیادی رکاوٹ بتتا ہے کہ نہیں؟ کسی وجود کے ذی شعور

ہونے کے لیے لازم ہے کہ وہ معلومات کو پروسیس کر سکتا ہو یعنی کہ اسے بدل سکے، بت سکے یا اس پر کسی اور رد عمل کا اظہار کر سکے، سوچنا اور محسوس کرنا دونوں معلومات کی عمل کاری یا پروسیس Process کرنے کی حدود میں شامل ہیں، اس عمل کا تسلسل کائنات میں کس حد تک تبدیلی کو برداشت کر سکتا ہے؟

تو انائی خرچ کرنا معلومات کی عمل کاری یا پروسینگ Information Processing کی امتیازی صفت یہ ہے کہ جب عامل کار یا پروسیر اپنے ماحول کے درجہ حرارت کے قریب ترین رہ کر کام کرتا ہے تو کم از کم تو انائی خرچ کر رہا ہوتا ہے، انسانی دماغ اور زیادہ تر کمپیوٹر بہت کم کار کر دگی پر کام کرتے ہیں، مثلاً پورے جسم کی خارج ہونے والی حرارت میں معتمد ہے حصہ دماغ کا ہوتا ہے، بہت سے کمپیوٹروں کو ٹھہنڈا کرنے والے خصوصی نظام کی ضرورت ہوتی ہے ورنہ وہ پچھل جائیں، انفارمیشن پروسینگ میں حرارت کے ضیاء کی جڑیں خود اس عمل کی منطق میں ہیں، اس عمل کے جاری رہنے کے لیے کچھ معلومات کو ٹھکانے لگانا ضروری ہوتا ہے، مثلاً جمع کے ایک عمل میں داخل معلومات یا ان پٹ انفارمیشن Input Information کی دو بٹ Bit کی جگہ ماحصل معلومات یا آؤٹ پٹ Output Information کی ایک بٹ Bit لے لیتی ہے، دراصل اپنی یادداشت کو بچانے کے لیے کمپیوٹر کے لیے پہلی دو انفارمیشن بٹ Bit کو ضائع کرنا بہتر ہے، موجودہ چیز کو کھرچ دینے کا عمل خود اپنی تعریف کی رو سے پٹایا نہیں جاسکتا چنانچہ اس میں ناکارگی کا اضافہ ملوث ہے، چنانچہ انہی بیانی و جوابات کی بناء پر انفارمیشن پروسینگ کے عمل میں دستیاب تو انائی میں کمی ناگزیر ہے چنانچہ یہ کائنات کی مجموعی ناکارگی میں اضافہ کا موجب ہے۔

فری میں ڈائی سن (Freeman Dyson) نے ایک ایسی ذی شعور مخلوق کا جائزہ لیا ہے جو حرارتی موت کی طرف تیزی سے بڑھتی کائنات میں رہتی ہے اور تو انائی کو ایک خاص شرح پر خرچ کرنے کی پابندی نے ان کے سوچنے پر بھی حدود عائد کی ہوئی ہیں، پہلی پابندی تو یہ ہے کہ ان کا درجہ حرارت لازماً گرد و پیش سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تاکہ فاضل حرارت ان میں سے باہر نکل جائے، دوسری پابندی یہ ہے کہ طبیعت کے قوانین تو انائی کے باہر کی طرف بہاؤ کی شرح کو بھی محدود کیے ہوئے ہیں، اگر ان میں حرارتی اخراج کی شرح حرارتی پیداوار کی شرح سے کم ہے تو وہ زیادہ دیر تک کام نہیں کر سکیں گے، ان تقاضوں کی بناء پر اس مخلوق کا تو انائی کا خرچ ایک خاص شرح سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اور پھر ایک ناگزیر تقاضہ دستیاب تو انائی کا ایسا منع ہے جہاں سے تو انائی سے خارج ہوتی تو انائی کی جگہ لینے کے لیے تو انائی متواتر بہتی ہے، ڈائی سن نے نتیجہ نکالا ہے کہ مستقبل بعید میں تو انائی کے ایسے ذخائر معلوم ہو جائیں گے اور آخر کار ذی شعور مخلوق کو تو انائی کے بحران کا

سامنا ہو گا۔

اب اس شور کو بڑھانے کے دو طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ جتنا طویل عرصہ تک ممکن ہو زندہ رہا جائے اور دوسرا یہ کہ سوچنے اور محسوس کرنے (Experience) کی شرح بڑھا دی جائے۔

ڈائی سن ایک خاصہ معقول مفروضہ قائم کرتا ہے، کسی ذی شور کے وقت گزرنے کے موضوعی یا ذاتی احساس کا انحصار اس امر پر ہے کہ اس کی معلومات کی پروسینگ کی شرح کیا ہے، کسی کی پروسینگ جتنی تیز ہوگی اس کی فی یونٹ وقت فکر اور محسوسات اتنے ہی زیادہ ہوں گے اور اس پر وقت اتنی ہی تیزی سے گزرے گا، رابرت فورورڈ (Robert L. Forward) نے اس مفروضے کو اپنے سائنس فشن ناول Dragon's Egg میں بڑے دلچسپ انداز میں بیان کیا ہے، کہانی کے مطابق ایک ذی شور مخلوق ایک نیوٹران ستارے کی سطح پر آباد ہے، اور اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے کیمیائی کی جگہ نیوکلیئی تعاملات استعمال کرتی ہے، چونکہ نیوکلیئی تعاملات کی رفتار کیمیائی سے ہزاروں گناہ تیز ہوتی ہے اس لیے وہ معلومات کو انتہائی تیزی سے پروسیس کرتی ہے، انسانی پیانے پر ایک سینڈ ان کے کئی سالوں کے مساوی ہے، جب ان کا انسانوں سے سامنا ہوا تو وہ ترقی کے ابتدائی مراحل پر تھے لیکن اسی تیزی کی بناء پر انسانی وقت کے منٹوں میں انہوں نے ترقی کی اور انسان سے آگے نکل گئے۔

بدقتی سے، مستقبل میں بقاء کے اس طریقے کی بھی اپنی ایک خامی ہے، انفارمیشن جتنی تیز ہوگی تو انہی کا خرچ اتنا ہی زیادہ ہو گا، اور اتنی ہی تیزی سے تو انہی کے دستیاب ذخائر کم ہوتے چلے جائیں گے، آپ خیال کریں گے کہ ہمارے جانشین خواہ کوئی بھی شکل اختیار کریں تباہی ان کا مقدر ہے، لیکن لازمی نہیں کہ ایسا ہی ہو، ڈائی سن نے ثابت کیا ہے کہ ایک درمیانی راستہ بھی ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ جوں جوں کائنات مرتبی جائے انسان اپنی سرگرمیاں سست کرتا جائے، اس مقصد کے لیے وہ طویل مدت تک تنویم میں جانے کا طریقہ اختیار کر سکتا ہے، اور نیند کا یہ وقفہ ہر بار طویل سے طویل تر ہوتا چلا جائے، خوابیدگی کے اس عرصے میں گزشتہ سرگرمی کے دور کی خرچ شدہ حرارت خارج ہو جائے اور آنے والے سرگرم دور کے لیے (بیداری کے دور کے لیے) جمع ہو جائے، اس طریقہ میں کسی شخص کا محسوساتی وقت گزرے ہوئے اصل وقت سے بہت کم ہو گا کیونکہ خوابیدگی کا دورانیہ بڑھتا چلا جائے گا، لیکن جیسا کہ میں کہتا آیا ہوں کہ ہیئتی دراصل ایک طویل عرصہ ہے اور ہمیں آخر کار حدود کا سامنا کرنا ہی ہو گا، یعنی کہ صفر ہوتے ہوئے ذرائع اور لامحدود ہوتا ہوا وقت، ڈائی سن نے ان حدود کا ایک سادہ سا جائزہ لے کر بتایا کہ اگر مجموعی ذرائع محدود بھی ہیں تو ٹکل محسوساتی وقت لامحدود ہو سکتا ہے، اس نے مندرجہ

ذیل حیران کن شماریات دی ہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہماری آج کی آبادی جتنی مخلوق محس  $6 \times 10^{30}$  جوں پر ابديت حاصل کر سکتی ہے اور یہ توانائی سورج سے صرف آٹھ گھنٹے میں خارج ہوتی ہے۔

لیکن حقیقی ابديت انفارمیشن کی لاحدود مقدار کی پروسینگ سے کچھ زیادہ کی مقاضی ہے، اگر کسی مخلوق کی دماغی حالتیں Brain States محدود ہیں تو وہ مختلف قسم کی محدود سوچیں ہی سوچ سکتی ہے، چنانچہ اگر ایسی مخلوق ابديت پا بھی لے تو ایک ہی طرح کے محسوسات دھراتی چلی جائے گی، اس مخلوق کے لیے، مقصدیت کے اعتبار سے، ابديت اور فناہ میں کوئی فرق نہیں، اس بندگی سے نکلنے کا ایک راستہ موجود ہے، یہ مخلوق یا اس نوع کی ایک سپرشے اپنی آبادی لاحدود طور پر بڑھاتی چلی جائے، لیکن اس میں بھی ایک مشکل کا سامنا ہے، مستقبل میں مادے کی تغیر کی رفتار اتنی ہو گی کہ دماغ سازی کے لیے مطلوبہ مقدار میں مادہ دستیاب نہیں ہو گا، ہو سکتا ہے کہ وہ مخلوق اپنی شعوری سرگرمی کی توسعہ کے لیے نیوٹرینو کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائے جو اپنی تمام تربے نشانی کے باوجود ہر جگہ موجود ہے۔

ڈائی سن سمیت مستقبل میں شعوری مخلوق کی بقاء پر جتنی قیاس آرائی ہوئی ہے اس میں ایک قدر مشترک یہ ہے کہ دماغ کے کام کرنے کا طریقہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیجیٹل ہوتا چلا جائے گا، کمپیوٹر بھی محدود حالتیں کی مشین ہے چنانچہ اس کا حاصل بھی محدود ہو گا، لیکن کمپیوٹر کی ایک اور قسم بھی ہے جسے اینالاگ Analog کمپیوٹر کہتے ہیں، اس کی سادہ مثال سلائیڈ رول (Slide rule) ہے، سلائیڈ رول پر حساب کتاب کے لیے رول کو متواتر نئی حالتیں دی جاتی ہیں اور مثالی صورت حال میں رول کو لاحدود حالتیں دی جاسکتی ہیں۔

چنانچہ اینالاگ کمپیوٹر کو ڈیجیٹل پر اس اعتبار سے برتری حاصل ہے کہ ڈیجیٹل کی انفارمیشن ذخیرہ کرنے کی صلاحیت محدود ہے، اگر انفارمیشن کو اینالاگ کمپیوٹر کی محدود طور پر، مثلاً مادی اشیاء کے زاویوں وغیرہ کے ذریعے، ذخیرہ کیا جائے تو اس کی گنجائش لاحدود ہو جاتی ہے، چنانچہ اگر سپر مخلوق اینالاگ کمپیوٹر کی طرز پر کام کر سکے تو ہو سکتا ہے کہ نہ صرف وہ لاحدود طور پر سوچ سکے بلکہ سوچوں کا تنوع بھی لاحدود ہو۔

بدقتی سے ہمارے علم میں نہیں آیا کہ کائنات مجموعی طور پر اینالاگ کمپیوٹر سے زیادہ نزدیک ہے یا ڈیجیٹل کمپیوٹر سے، قدری طبیعت کی رو سے کائنات کو قدری انداز پر متشکل ہونا چاہیے یعنی کہ یہ اس کی ساخت میں شامل ہے کہ بجائے مسلسل تبدیلوں کے اس کی خصوصیات غیر مسلسل انداز میں تبدیل ہوں یعنی کہ ایک ایک قیمت سے دوسری پر چھلانگ لگائیں اور

درمیان خالی چھوڑ دیں، لیکن یہ ابھی تک خالصتاً قیاس آرائی ہے، اور ہمیں ابھی دماغی اور ذہنی سرگرمیوں کے باہمی تعلق کی نوعیت کا بھی حقیقی علم نہیں، ہو سکتا ہے یہ تعلق اپنی ماہیت میں قدری نہ ہو۔

دماغ کی ماہیت کچھ بھی رہی ہو اسے تو انائی کے کائناتی بحران کا بہر حال سامنا کرنا پڑے گا، ڈائی سن کا خیال ہے کہ دماغی سرگرمیوں کا نامہربان اور لا تعلق اثر کائنات پر کم از کم ہوتا چلا جائے گا، ایک مقام آئے گا جب وہ ہزارہا سال کے لیے سو جایا کریں گے یعنی صرف ذخیرہ شدہ معلومات کو ذخیرہ رکھے اور اس میں کسی طرح کا اضافہ نہ کرے، لیکن اس طرح کے مناسب بندوبست سے وہ ایک لامحدود عرصے تک لامحدود حسی تجربے کر سکے۔

ہو سکتا ہے کہ صورت حال اتنی گمیہر نہ ہو جتنا ڈائی سن کا اندازہ ہے، ابھی تک ہمارا مفروضہ رہا ہے کہ اپنے پھیلاؤ اور ٹھنڈے ہونے کے دوران کائنات کی بقیہ صورت حال میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، لیکن ہو سکتا ہے کہ یہ درست نہ ہو، تجاذب کئی طرح کے عدم استحکام کو جنم دے سکتی ہے، مثلاً مختلف سمتیوں میں پھیلاؤ کی شرح میں جو فرق بہت تھوڑا ہے وہ مستقبل بعید میں بڑھ جائے، کائناتی وسعت پذیری میں دور ہوتے بلیک ہول تجاذب کے زیر اثر ایک دوسرے میں مدغم بھی ہو سکتے ہیں، اس صورت حال میں ایک عجیب مقابلے کا ماحول پیدا ہو جائے گا، یاد رہے کہ کوئی بلیک ہول جتنا چھوٹا ہوتا ہے، اتنا ہی زیادہ گرم ہوتا ہے، دو بلیک ہولوں کے ملنے سے بننے والا نیا بلیک ہول مجموعی طور پر زیادہ ٹھنڈا ہو گا اور شرح تیزیر کم ہو جائے گی، مستقبل بعید کے حوالے سے اہم سوال یہ ہے کہ آیا بلیک ہول اپنے ادغام کی شرح کو کائنات کے پھیلاؤ کی رفتار کے ساتھ ہم قدم رکھ پائیں گے، اگر ایسا ہو جاتا ہے تو اس مخلوق کے پاس بلیک ہول سے ہاگنگ اثر کے تحت نکلتی شعاعوں کی شکل میں تو انائی کا ذریعہ ہمیشہ موجود رہے گا، لیکن ایسا بھی امکان ہے کہ بلیک ہولوں کے ادغام کی شرح تیز ہو جائے اور مذکورہ بالا تو انائی میسر نہ آسکے۔

ڈائی سن کے تجزیے کی بنیاد اس مفروضے پر ہے کہ سوچنے کے عمل میں تو انائی خرچ ہوتی ہے، انسانی دماغ کے لیے یہ چیز ہے اور تا حال جتنے بھی انفارمیشن ذخیرہ یا پروسیس کرنے کے عمل معلوم ہیں ان سب میں کوئی حر حرکیاتی قیمت دینا پڑتی ہے، لیکن یہ آخر نہیں ہے، آئی بی ایم [IBM](#) کے کمپیوٹر سائنسدانوں چارلس بینٹ (Charles H. Bennett) اور رالف لانڈور (Rolf Landauer) نے مظاہرہ کیا ہے کہ اصولی طور پر رجعت پذیر یا پلٹایا جاسکنے والا حسابی عمل ممکن ہے، ہر چند کہ ابھی یہ مفروضے کی سطح پر ہے، لیکن اصولی طور پر بغیر تو انائی خرچ کیے حسابی عمل ممکن ہے، ممکن ہے ایسا نظام وضع ہو جائے جو تو انائی خرچ کیے بغیر لامحدود محسوساتی تجربوں سے گزر سکے، ابھی واضح نہیں ہو سکا کہ آیا یہ نظام انفارمیشن ذخیرہ

اور پروسیں بھی کر سکے گا یا نہیں، لیکن ایسی کوئی مخلوق جو تو انائی خرج نہ کرے اپنے ارد گرد کی دنیا کا ادراک نہیں کر سکے گی۔

ایک صدی سے زیادہ عرصے سے مرتبی کائنات کے تصور نے سامنہ دنوں کے ذہن پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ مفروضہ سائنسی ثقافت کا حصہ بن چکا ہے کہ ہم اخاطط پذیر کائنات میں رہ رہے ہیں، کیا تمام طبعی نظام بالآخر اخاطط کی طرف سفر کرتے ہیں؟ کیا حیاتیات میں بھی ایسا ہی ہے؟ یکچھ سے شروع ہونے والا سلسلہ حیات آج متنوع اور متفرق شکل میں زمین پر جاری نظر آتا ہے، حیاتیاتی ارتقاء کو بالعموم حیاتیاتی ترقی سے تعبیر کیا جاتا ہے اور یہ تقریباً مسلمہ حقیقت کے طور پر مانی جاتی ہے، لیکن اس ترقی کے سلسلے میں وہ کون سی چیز ہے جو اصل میں بڑھ رہی ہے، جہاں تک ہم جانتے ہیں کائنات کی ابتداء بے شکل شے کی صورت ہوئی، وقت کے ساتھ طبعی نظاموں میں تنوع آیا، چنانچہ کائنات کی تاریخ دراصل بڑھتی ہوئی پیچیدگی کی تاریخ ہے، بظاہر یہ ایک قضیہ Paradox نظر آتا ہے، کیونکہ ابتداء میں بتایا گیا تھا کہ کائنات تو انائی کی بڑھتی ہوئی عدم دستیابی یا ناکارگی کے ہاتھوں موت کی طرف جا رہی ہے۔

لیکن دراصل ایسا کوئی قضیہ موجود نہیں، کیونکہ منظم پیچیدگی Organized Complexity ناکارگی سے مختلف ہے، ناکارگی اصلاً انفارمیشن کی نفی ہے، آپ جتنی زیادہ انفارمیشن پروسیں کرتے ہیں یعنی کہ ترتیب بڑھاتے ہیں اتنی ہی قیمت ناکارگی کی صورت ادا کرتے ہیں، ایک جگہ پر ترتیب کسی دوسری جگہ پر بے ترتیبی بڑھا رہی ہوتی ہے، یہی حرحرکیات کا دوسرا قانون ہے یعنی کہ ناکارگی ہمیشہ فاتح رہتی ہے۔

میں نے اپنی کتاب The Cosmic Blueprint میں تجویز کیا تھا کہ کائنات میں حرحرکیات کے دوسرے قانون کے پہلو بہ پہلو "بڑھتی ہوئی پیچیدگی کا قانون" بھی کار فرم� ہے، دونوں میں کوئی عدم مطابقت نہیں، جب بھی منظم پیچیدگی بڑھتی ہے وہاں ناکارگی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، حتیٰ کہ ارتقائی عمل میں بھی بہت سی تباہی کے بعد ایک نیا اور پیچیدہ نظام وجود میں آتا ہے، برف کا ایک گلا بھی اس سے مستثنی نہیں، اس میں بھی حرارت خارج ہوتی ہے جو کائنات کی ناکارگی بڑھاتی ہے، لیکن یہ مساوی سودا نہیں کیونکہ تنظیم یا ناکارگی کا معکوس نہیں۔

کئی اور محققین بھی اسی نتیجے پر پہنچے ہیں اور پیچیدگی کا بھی "دوسرा قانون" "تشکیل دینے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، یہ قانون حرحرکیات کے دوسرے قانون سے مطابقت رکھنے کے باوجود کائناتی تبدیلی کو اور طرح بیان کرتا ہے۔

کائناتی خاتمے کے تناظر میں بڑھتی ہوئی پیچیدگی کا قانون اہمیت کا حامل ہے، اگر منظم پیچیدگی ناکارگی کا الٹ نہیں تو پھر کائنات میں منفی ناکارگی کے محدود ذخیرے سے پیچیدگی پر کوئی آخری حد متعین نہیں ہوتی، پیچیدگی بڑھانے کے لیے جو قیمت ناکارگی میں اضافے کی صورت میں دینا ہوگی وہ انفارمیشن پروسینگ یا سوچنے سے مختلف ہوگی، اگر یہ درست ہے تو پھر ہمارے جانشین توانائی کے معدوم ہوتے ذخیروں پر انحصار کیے بغیر زیادہ سے زیادہ منظم پیچیدہ حالتیں حاصل کر سکیں گے، اگرچہ جو انفارمیشن وہ پروسیس کر سکیں گے مقدار میں محدود ہوگی لیکن ذہنی اور جسمانی سرگرمیوں کے تنوع پر کوئی حد نہیں ہوگی۔

یہ مذکورہ بالا تمام بحث اس مفروضے پر مبنی ہے کہ کائنات ہمیشہ پھیلتی چلی جائے گی، لیکن کائنات کے مقدار کی بہت سی ممکنات میں سے یہ صرف ایک امکان ہے، لیکن اگر پھیلاوہ کی شرح کم ہوتے ہوتے صفر ہو جاتی ہے تو کائنات سکڑنا شروع ہو جائے گی اور ہمیں بگ کر Big Crunch کا سامنا ہو گا، پھر بقاء کی کیا صورت ہوگی؟

## شیز حرام زندگی

اگر "دام" موجود نہیں تو انسان یا کسی دوسرے سیارے پر آباد مخلوق کتنی بھی ہنر مندی دکھائے "دام" حاصل نہیں ہو گا، اگر کائنات ایک محدود عرصے تک موجود ہے تو اسے بالآخر "آخرت" کا سامنا کرنا ہو گا، میں نے چھٹے باب میں وضاحت کی تھی کہ کائنات کا مقدر کسی طرح اس کے گل وزن پر منحصر ہے، اگر کائنات کا وزن ایک خاص مقررہ وزن سے زیادہ ہے تو اسے بالآخر سکڑ کر مسمار ہونا ہے، بصورتِ دیگر یہ باہر کی جانب پھیلیت رہے گی، اس خاص وزن کو فاصلہ کمیت کہا جاتا ہے، اگر مستقبل بعید میں کائنات سکڑنا شروع ہو جاتی ہے تو ایک ذی شعور مخلوق کا مشاہدہ پچھلے باب کے بیان سے مختلف ہو گا۔

کائناتی سکڑاؤ کے اوپرین مراحل کچھ زیادہ دھمکی آمیز نہیں ہوں گے، جس طرح اوپر پھیلکا گیا گیند بلند ترین مقام پر رکتا ہے اور واپسی کا آغاز کرتا ہے، کائنات بھی اندرون کی طرف گرنے کا آغاز بڑی آہنگی سے کرے گی، فرض کریں کہ یہ لمحہ سو ملین سال بعد آتا ہے، ابھی بہت سے ستارے جل رہے ہوں گے اور ہمارے پیش رو اپنی دور بینوں سے کہکشاوں کی حرکت دیکھ سکیں گے، وہ دیکھیں گے کہ پہلے ان کے ہٹنے کی رفتار سست ہوتی گئی اور پھر انہوں نے ایک دوسرے کی طرف گرنا شروع کر دیا، جو کہکشاویں آج ہم دیکھتے ہیں کوئی چار گنا زیادہ دور ہوں گی، کائنات کے مسلسل پھیلاؤ کے باعث ماہرین فلکیات ہماری نسبت دس گنا زیادہ دور تک دیکھ سکیں گے اور ان کی حدِ نگاہ نسبتاً زیادہ کہکشاوں کا احاطہ کرے گی، کائنات عبور کرنے میں روشنی کوئی بلین سال لگ جاتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک سو بلین سال بعد کے ماہر فلکیات کو لمبے عرصے تک سکڑاؤ کا علم نہیں ہو سکے گا، وہ دیکھیں گے جو کہکشاویں نسبتاً قریب ہیں ان میں زیادہ تر پیچھے ہٹنے کی بجائے ان کی طرف بڑھ رہی ہیں، لیکن دور کی کہکشاوں سے آنے والی روشنی میں تب بھی سرخ تبدل Red Shift موجود ہو گی، دسیوں بلین سال کے بعد اندر کی طرف سکڑاؤ باقاعدہ ظاہر ہو گا، جو تبدیلی زیادہ آسانی سے شناخت ہو سکے گی وہ پس منظری شعاعوں کے

درجہ حرارت میں ہونے والی معمولی سی تبدیلی ہوگی، آپ کو یاد ہو گا کہ یہ پس منظری شعاعیں بگ بینگ کے وقت خارج ہوئی تھیں اور اس وقت ان کا درجہ حرارت مطلق صفر سے تین درجے بلند ہے، کائنات پھیلنے سے ان کا درجہ حرارت کم ہوتا ہے، سو بلین سال کے بعد یہ درجہ حرارت ایک ڈگری ہو چکا ہو گا، سکڑاؤ کے دوران جب کائنات کی کثافت آج کل جتنی ہو جائے تو درجہ حرارت دوبارہ مطلق صفر سے تین درجے بلند ہو جائے گا، اس میں پھر ایک سو ملین سال لگیں گے، کائنات کا عروج اور زوال وقت کے اعتبار سے مت Shankl Symmetric ہے۔

کائنات راتوں رات مسامن نہیں ہو جائے گی، سکڑاؤ شروع ہونے کے بعد بھی کئی بلین سال تک ہمارے پیش رو مناسب انداز میں زندگی گزاریں گے، لیکن اگر سکڑاؤ کا یہ عمل شروع ہونے میں ایک ٹریلیں سال لگ جائیں تو صورت حال اتنی خوشگوار نہیں ہو گی، عمل پھیلاؤ کے نقطہ عروج سے پہلے ہی کائنات کے ستارے جل کر بجھ چکے ہوں گے اور نجی جانے والے باشندوں کو ایسے ہی کئی مسئللوں کا سامنا ہو گا جو لا انتہاء طور پر پھیلتی کائنات میں درپیش ہو سکتے تھے۔

سکڑاؤ آج سے جتنے سال بعد شروع ہو گا اتنے مزید سال گزرنے کے بعد کائنات کا جسم پھر موجودہ حجم کے برابر ہو جائے گا، لیکن اس کا نقشہ مختلف ہو گا، اگر یہ سکڑاؤ سو بلین سال بعد شروع ہو تو موجودہ حجم تک آتے آتے بلیک ہوں بہت زیادہ ہو چکے ہوں گے اور ستارے بہت کم، قابل رہائش سیارے آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے۔

جب کائنات واپس اپنے موجودہ حجم پر پہنچے گی تو اس کی رفتار کافی بڑھ چکی ہو گی، اس وقت ساڑھے تین بلین سال میں اس کا حجم آدھا ہو رہا ہو گا اور یہ شرح سکڑاؤ بڑھتی جا رہی ہو گی، اس لمحے کے دس بلین سال کے بعد اصل مسئلے کا آغاز ہو گا جب پس منظری شعاعوں کا درجہ حرارت سنجیدہ صورت حال اختیار کر جائے گا، جب درجہ حرارت  $300k$  ہو گا تو زمین جیسے سیاروں کے لیے حرارت کے خلاف دفاع کرنا مشکل ہو جائے گا، پہلے برفانی چوٹیاں اور گلیشیر پکھلیں گا اور پھر سمندر بخارات بننے لگیں گے۔

چالیس ملین سال بعد پس منظری شعاعوں کا درجہ حرارت زمین کے اوست درجہ حرارت کے برابر ہو جائے گا، زمین جیسے سیارے قابل رہائش نہیں رہیں گے، سورج کے سرخ دیو Red Giant بننے کے باعث زمین اس سے بہت پہلے اس حالت کو پہنچ چکی ہو گی، یہاں کے باسیوں کو کوئی دوسرا قابل رہائش سیارہ بھی دستیاب نہیں ہو گا، کائنات حرارتی شعاعوں سے بھری ہو گی، خلاء کا درجہ حرارت  $300k$  ہو چکا ہو گا اور مزید بڑھ رہا ہو گا، اگر کسی ماہر فلکیات نے کوئی ایسا نظام وضع کر لیا کہ وہ

خود پکنے سے بچ گیا تو دیکھے گا کہ کائنات کے سکڑنے کی رفتار بہت زیادہ ہو گئی ہے، اس کا جنم ہر چند ملین سال کے بعد آدھا ہو رہا ہو گا، جو کہکشاںیں تب تک پہنچی ہوں گی ناقابل شناخت ہو چکی ہوں گی کیونکہ وہ باہم مدغم ہونا شروع ہو جائیں گی، تاہم ستاروں کا تصادم اس وقت بھی نایاب واقعہ ہو گا کیونکہ اب بھی خلاء کی وسعتیں اتنی تنگ نہیں ہوئی ہوں گی، جوں جوں کائنات اپنے آخری مرحلے کی طرف بڑھتی جائے گی اس کی حالت بگ پینگ کے فوراً بعد والی حالت کے زیادہ مماثل ہوتی چلی جائے گی، ایک ماہر فلکیات مارٹن ایس نے مہدم ہوتی کائنات کے موضوع پر خصوصی مطالعہ کیا ہے، طبیعت کے عمومی اصولوں کے اطلاق سے اس نے کائناتی انہدام کے آخری مراحل کی تصویر کشی کی ہے، پس منظری کائناتی شعاعیں اتنی گرم ہو جائیں گی کہ رات کو بھی آسمان پہکے سرخ رنگ کا نظر آئے گا، کائنات ایک بھٹی کی شکل اختیار کر جائے گی، اگر کہیں بھی زندگی کی کوئی صورت چھپی ہوئی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی، سیاروں سے ان کے کردہ ہوائی اڑ جائیں گے، آسمانوں کی سرخ رنگت بذریعہ پہلی اور پھر سفید ہو جائے گی، کائنات کو نہلاتی حرارتی شعاعیں اتنی گرم ہوں گی کہ خود ستاروں کے وجود کو خطرہ لاحق ہو جائے گا، ان کے اندر حرارت کی پیدائش کا عمل جاری ہے جو کہیں باہر خارج نہیں ہو سکتی اس لیے وہ پھٹ جائیں گے، فضاء گرم گیس پلازما سے بھری ہوگی جو ہر لمحہ مزید گرم ہوتی جائے گی۔

جیسے جیسے تبدیلی کی رفتار بڑھتی جائے گی حالات کی شدت میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا، کائنات میں قابل محسوس تبدیلیاں پہلے لاکھوں پھر ہزاروں اور پھر سینکڑوں سالوں میں ہونے لگیں گی، درجہ حرارت پہلے ملین اور پھر بلین درجے تک چلا جائے گا، آج کی نضائے بسیط میں بکھرا ہوا مادہ سکڑ کر چھوٹے جنم کے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، کہکشاوں کا مادہ سکڑ کر چند نوری سال کے علاقے میں سما جائے گا، آخری تین منٹ آچکے ہیں۔

درجہ حرارت بذریعہ اتنا بڑھ چکا ہو گا کہ ایسی نیو کلیئس بھی ٹوٹ چکے ہوں گے، مادہ بنیادی ذروں کے ایک آمیزے کی صورت اختیار کر گیا ہے، بگ بینگ اور ستاروں نے جو بھاری عناصر تشکیل دیے تھے وہ پھر ختم ہو چکے ہیں، اتنے طویل عرصے میں بننے والے عناصر اس سے بھی کم وقت میں ختم ہو گئے جتنا وقت آپ کو یہ صفحہ پڑھنے میں لگا ہے، ٹریلین ٹریلین سالوں تک مستحکم رہنے والے ایسی نیو کلیئس دوبارہ کبھی نہ جڑ سکنے کے لیے ٹوٹ گئے ہیں، سوائے بلیک ہول کے باقی ہر وجود معصوم ہو گیا ہے، کائنات ایک شاندار لیکن مہیب سادگی میں بدل چکی ہے۔

کائنات کا انہدام جوں جوں تیز ہوتا جا رہا ہے درجہ حرارت بھی ہر دم بڑھتی ہوئی شرح سے نامعلوم بلندیوں کو چھوتا جا رہا ہے، مادہ اتنا بچھ چکا ہے کہ پروٹان اور نیوٹران بھی باقی نہیں بچے، اب صرف کوارکوں Quarks کا ایک ملغوبہ باقی ہے،

انہدام بھی جاری ہے۔

کائناتی تباہی میں صرف چند مانگرو سینکڑ باقی ہیں، انتظامِ مکمل ہو چکا ہے، بلیک ہولوں نے باہم مدغم ہونا شروع کر دیا ہے، ان کے مرکزوں کی حالت باقی کائنات سے قدرے مختلف ہے، یہ اب محض زمان و مکان کے خطے ہیں جو کچھ پہلے انجام کو پنج گئے تھے اور اب یہ باقی کائنات کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں۔

آخری لمحات میں تجاذب ہی واحد غالب قوت ہے جو بڑی بے رحمی سے مادہ اور خلاء کو پیس رہی ہے، زمان و مکان کا ضم ہر لحظہ بڑھتا جا رہا ہے، مکان کے بڑے بڑے خطے چھوٹے چھوٹے علاقوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، مروجہ نظریے کے مطابق مادے کو اندر کی طرف گرانے والا یہ دھماکہ لا انتہاء طور پر طاقت ور ہے جس نے مادہ کو معدوم کر دیا ہے اور خود زمان و مکان کو بھی بھینچ کر اکائی میں بدل دیا ہے۔

یہ عظیم چر مراہٹ Big Crunch صرف مادے کا اختتام نہیں ہے بلکہ یہ ہر چیز کا خاتمه ہے، یہ وقت کا بھی خاتمه ہے، یہ پوچھنا کہ اس کے بعد کیا ہو گا اتنا ہی بے معنی ہے جتنا کہ بگ بینگ سے پہلے کیا تھا، کسی بھی "ہونے" کے لیے اب کوئی "آگے" نہیں ہے، حتیٰ کہ جمود کے لیے بھی زمان نہیں اور خلاء کے لیے بھی مکان نہیں، جو کائنات عدم سے بگ بینگ کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی اس بگ کرنچ کے نتیجے میں دوبارہ معدوم ہو گئی۔

کیا ہمیں ایسے امکانات سے مایوسی کا شکار ہونا چاہیے؟ بدتر کیا ہے؟ ایسی کائنات جو تباہ ہو رہی ہے یا ایسی جو ایک دھماکے سے اندر کی طرف گرے اور معدوم ہو جائے؟ اور پھر ایک ایسی کائنات میں ابديت کے کیا امکانات ہیں جس میں بالآخر وقت کو ہی ختم ہو جانا ہے۔

بگ کرنچ کی طرف بڑھتی ہوئی کائنات میں زندگی کے امکانات پھیلتی ہوئی کائنات سے بھی مایوس کن ہیں، یہاں مسئلہ توانائی کی کمی کا نہیں زیادتی کا ہے، تاہم اس آخری تباہی کے لیے تیار ہونے کو ہمارے پیش روؤں کے پاس کئی بلیں بلکہ ٹریلیوں سال موجود ہیں، اس دورانیے میں زندگی پوری کائنات میں پھیل سکتی ہے۔

منہدم ہوتی کائنات کے سادہ ترین خاکے کی رو سے مکان کا گل مجسم محدود ہے، وہ اس طرح کہ مکان خمیدہ ہے اور یہ ایک سہہ ابعادی کرے کی طرح کائنات میں اور اس کے گرد موجود ہے، چنانچہ یہ بعید از فہم نہیں کہ ہمارے ذی شعور جانشین ساری کائنات بھر دیں اور پھر ممکن ذریعے سے بگ کرنچ کا سامنا کریں۔

اول تو یہ سمجھنا ہی مشکل ہے کہ وہ یہ تکلیف کیوں کریں گے، جب یہ طے ہے کہ بگ کر نج کے بعد کسی بھی چیز کا موجود ہونا نا ممکن ہے تو پھر اپنی تکلیف کو قدرے لمبا کرنے سے کیا حاصل ہے، کئی ٹریلیں سال پرانی کائنات میں مکمل اور یقینی خاتمه سے ایک ملین یا دس ملین سال پہلے بھی فناہ آجائے تو کیا فرق پڑتا ہے، لیکن ہمیں بھولنا نہیں چاہیے کہ وقت اضافی ہے، ہمارے جانشینوں کے موضوعی وقت کا انحصار ان کے میٹابولزم (Metabolism) (یعنی کیمیائی مرکبات کے ٹوٹنے سے تو انائی کے اخراج کا عمل) کی اور پروسینگ کی شرح پر ہے، ان کے پاس چونکہ اپنی طبعی بیت تبدیل کرنے کے لیے کافی وقت ہو گا اس لیے ممکن ہے کہ وہ یونانیوں کے عالم اسفل (Hades) کی طرز پر ادبیت کے حصول پر توجہ دیں۔

بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کا مطلب ذرات کی تیز تر حرکت ہے جس کے نتیجے میں طبعی عمل زیادہ تیز رفتاری سے وقوع پذیر ہوں گے، زمین میں رہنے کے لیے ذی شعور مخلوق کی بنیادی خاصیت اس کی انفارمیشن پروسیس کرنے کی صلاحیت ہے، بڑھتے درجہ حرارت کی کائنات میں انفارمیشن پروسیس کرنے کی شرح بھی بڑھے گی، جو مخلوق ایک بلین ڈگری پر حرکیاتی عوامل کر رہی ہوگی اسے فوراً ہونے والی فناہ بھی سالوں دور لگے گی، اگر ان کے ذہنوں میں وقت کو لا محدود طور پر پھیلایا جاسکتا ہے تو پھر وقت کے ختم ہونے سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بگ کر نج کی طرف کائنات کی بڑھتی ہوئی رفتار کے مطابق مشاہدہ کرنے والوں کے احساس کو وقت کی اسی شرح سے پھیلایا جاسکتا ہے، اس پر اصولی طور پر کوئی پابندی نہیں، اگر مناسب وسائل میسر ہوں تو یہ مخلوق واقعاً وقت خرید سکتی ہے۔

ذہن میں ایک سوال اور بھی آسکتا ہے کہ کیا مسماں ہوتی کائنات کے آخری مراحل میں اس پر آباد ایک برتر مخلوق کے ذہن میں باقی ماندہ محدود وقت کے اندر لا محدود متنوع خیالات و احساسات آسکتے ہیں، اس سوال پر جان بیرو (John Barrow) اور فرینک تپلر (Frank Tipler) نے غور کیا ہے، ان کے خیال میں مذکورہ بالا سوال کے جواب کا نفی یا اثبات میں ہونے کا انحصار آخری مراحل کے طبعی حالات کی تفصیلات پر ہے، اگر تو کائنات حتیٰ کاٹی کی طرف بڑھتے ہوئے بڑی حد تک یکساں رہتی ہے تو پھر ایک مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، خیالات کی رفتار چاہے جتنی بھی ہو روشنی کی رفتار بہر حال تبدیل نہیں ہوتی اور یہ ایک سینڈ میں ایک نوری سینڈ کا فاصلہ ہی طے کرے گی، چونکہ کوئی بھی طبعی اثر روشنی کی رفتار سے زیادہ تیزی سے نہیں پھیل سکتا اس لیے کائنات کے آخری مراحل میں جو علاقے ایک دوسرے سے ایک نوری سینڈ سے زیادہ فاصلے پر ہیں باہم پیغام رسانی نہیں کر سکتے، یہ وقوعی افق Event Horizon کی ایک اور مثال ہے جو بلیک ہول سے کسی طرح کی اطلاع باہر نہیں جانے دیتا، خاتمه جوں جوں قریب ہوتا جاتا ہے ذرات اور باہمی ابلاغ کے علاقوں کا مجسم بھی صفر کے نزدیک ہوتا

چلا جاتا ہے، انفارمیشن پروسینگ کے لیے ضروری ہے کہ کسی نظام کے تمام حصے باہمی ابلاغ کر سکیں، اگر کوئی "داماغ" اس خاتمے کے نزدیکی مراحل میں موجود بھی ہے تو روشنی کی محدود رفتار اس کا جنم محدود کردیتی ہے اور اس سے دماغ کی باہم متشخص حالتوں یعنی سوچوں پر بھی حدود لاگو ہو جاتی ہیں۔

دماغی سرگرمیوں پر عائد ہونے والی یہ پابندیاں ہٹنے کی ایک ہی صورت ہے کہ جب کائنات اپنے آخری مراحل کی طرف بڑھ رہی ہو تو اس کے مختلف حصوں کی اندر کی طرف گرنے کی رفتار یکساں نہ رہے اور یہ بعید از امکان نہیں، تجاذبی انہدام کی تفصیلی ریاضیاتی تحقیقات سے پتہ چلتا ہے کہ تب اندر کی طرف گرنے کی رفتار مختلف سمتوں میں ایک جیسی نہیں ہوگی، یہ نہیں کہ ایک سمت میں اندر کی طرف گرنے کا عمل باقی سمتوں سے تیز ہے، بلکہ یہ سمت ایک خاص رفتار سے بدلتی رہتی ہے، کبھی ایک سمت کے انہدام میں تیرتی ہے اور کبھی دوسری سمت کے، اور سمت بدلنے کی یہ رفتار بڑھتی چلی جاتی ہے، ٹپلر اور بیرونے ریاضیاتی نتیجہ نکالا کہ مذکورہ بالا وقوعی افق تیزی سے سمتیں تبدیل کرتا ہے جب تباہی کی یہ رفتار اپنی سمتیں تبدیل کرے یعنی وقوعی افق ایک علاقے سے دوسرے علاقے کی طرف جارہا ہو تو اس ممکنہ عظیم دماغ کو بھی اپنے ابلاغ کی سمت ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں بدلتی چاہیے اور اس تبدیلی کی شرح کو بھی ہر لمحہ بدلتا چاہیے، اگر یہ برتر دماغ مذکورہ بالا کے بدلتے کی شرح کا ساتھ دے سکے تو اہتزازات Oscillation ہی اسے اپنے کام کے لیے مطلوبہ توانائی فراہم کر سکتی ہیں، سادہ ریاضیاتی خاکے بتاتے ہیں کہ خاتمے کی طرف بڑھتی کائنات کی محدود مدت میں ان اہتزازات کی تعداد لامحدود ہو سکتی ہے، اس سے انفارمیشن پروسینگ کی مقدار کے لامحدود ہونے کا امکان سامنے آتا ہے۔

چنانچہ مفروضہ جاتی طور پر اس برتر مخلوق کے لیے لامحدود موضوعی وقت کا تصور حاصل ہوتا ہے، چنانچہ اگر بگ کر چیز کے نتیجے میں کائنات کا وجود ختم بھی ہو جاتا ہے تو ذہنی دنیا کبھی ختم نہیں ہوگی۔

غیر محدود اہلیت کا دماغ کیا کچھ کر سکتا ہے؟ ٹپلر کے مطابق یہ نہ صرف اپنے وجود کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر سکے گا بلکہ لامحدود انفارمیشن پروسینگ کے باعث مجازی حقیقت (Virtual Reality) کی سطح پر تصوراتی دنیا عیں بناتا چلا جائے گا، ان تصوراتی دنیوؤں کی بھی کوئی تعداد متعین نہیں ہوگی، یوں آخری تین منٹ ایک ایسے دماغ کے لیے ابدیت کی سی لامحدودیت اختیار کر جائیں گے۔


بر قسمتی سے یہ تمام مفروضہ جات مخصوص طبیعاتی خاکوں پر مبنی ہیں جو مکمل طور پر بعید از حقیقت ثابت ہو سکتے ہیں، اور پھر

ان خاکوں میں قدری اثرات (Quantum Effects) کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جن کے تجاذبی انہدام کے آخری مراحل میں غالب آجائے کے قوی امکانات ہیں، یہ قدری اثرات انفارمیشن پروسینگ کی شرح کو محدود کر سکتے ہیں، ایسا ہونے کی صورت میں امید کی جانی چاہیے کہ کائناتی برتر مخلوق یا پر کمپیوٹر بقیہ وقت میں وجود کو اتنا ضرور سمجھ جائے گا کہ وہ خود اپنے نباء ہونے پر سمجھوتہ کر سکے۔

## اچانک موت اور نیا جسم

ابھی تک کے مطالعے میں ہمارا مفروضہ ہے کہ کائنات لامحدود طور پر دور مستقبل بعید میں دو طریقوں سے ختم ہو سکتی ہے۔ گ بگ کرنچ Big Crunch سے یا پھر مخدود ہو کر، اگر بگ کرنچ کے نتیجے میں کائنات منہدم ہو کر اپنے آپ پر گرتی ہے تو ہمارے جانشینوں کو آنے والے حادثے کی کئی بلین سال پہلے تنبیہ ہو جائے گی۔

لیکن ایک اور امکان بھی ہے جو زیادہ ہوش رہا ہو سکتا ہے، پہلے وضاحت کی گئی تھی کہ جب ماہرین فلکیات کائنات کی گھرائیوں میں جھانکتے ہیں تو وہ آج کی صورت حال نہیں دیکھ رہے ہوتے، کائنات کے دور دراز علاقوں سے چلنے والی روشنی ہم تک آنے میں وقت لیتی ہے، چنانچہ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ روشنی کے اس علاقے سے روانہ ہوتے وقت وہاں ہو رہا تھا، دور بین ایک "زمان بین" بھی ہے، کوئی جسم ہم سے جتنا دور ہو گا ہم اس کا اتنا ہی زیادہ پرانا عکس دیکھیں گے، جس کائنات کا ماہرین فلکیات مشاہدہ کرتے ہیں وہ دراصل اس کا ایک ٹکڑا ہے جسے ماضی کی طرف زمان و مکان کو کاٹ کر حاصل کیا گیا ہے، اس ٹکڑے کو ہم ماضی کی نوری مخروط Past Light Cone کہتے ہیں، اسے شکل 10.1 میں دکھایا گیا ہے۔



زمان و مکان میں نقطہ P اس لمحے اور اس مقام کو ظاہر کرتا ہے، یہاں موجود ماہر فلکیات خلاء میں دیکھے گا تو اسے ایسی کائنات نظر آئے گی جیسی وہ ماضی میں تھی نہ کہ جیسی اب ہے، نقطہ P تک آنے والی "اطلاعات" "ماضی کی نوری مخروط" کے ساتھ سفر کرتی ہوئی آتی ہیں، ماضی میں بہت دور کائنات کے دور دراز گوشوں سے جو اطلاعات روشنی کی صورت چلی تھی اس مخروط میں چلتی ہم تک آتی ہیں، چونکہ کوئی اطلاع روشنی کی رفتار سے تیز سفر نہیں کر سکتی اس لیے ہمیں صرف ان واقعات کا پتہ چل سکتا ہے جو اس سایہ دار حصے کے اندر ہوئے، اگر اس سے باہر کسی سانحے کے اثرات ہماری طرف بڑھ رہے ہیں تو ہم خوش قسمتی سے اس سے بے خبر ہیں۔

شکل 10.1

نظریہ اضافیت کی رو سے روشنی یا کوئی بھی طبیعی اثر رفتارِ نور سے زیادہ تیز سفر نہیں کر سکتا، چنانچہ ماضی کی مخروطی کون ہمارے کائنات کے اور اسی لمحے ہم پر اثر انداز ہو سکنے والے اثرات دونوں کے علم کی حدود متعین کرتی ہے، اس کی رو سے اگر ہم پر کوئی چیز یا اثر رفتارِ نور سے وارد ہونے کو ہے تو ہمیں انتباہ ہونے یعنی قبل از وقت پتہ چلنے کا کوئی امکان نہیں، اگر کوئی حادثہ ماضی کی نوری مخروط میں اوپر کو چلتا ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو کوئی تقیب اس سانحے کی منادی نہیں کر سکتا، ہمیں اس کا پہلی بار اس وقت پتہ چلے گا جب وہ ہم پر وارد ہو چکا ہو گا۔

ایک سادہ سی فرضی مثال یوں ہو گی کہ فرض کریں سورج پر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ہمیں اس کا علم سماڑھے آٹھ منٹ کے بعد ہو گا یعنی کہ وہ وقت جو روشنی وہاں سے ہم تک پہنچنے میں لگاتی ہے، کسی نزدیکی ستارے کا پھٹ کر سپر نو ابنا اسی طرح کا حادثہ ہے جو ہمارے کرہ ارض کو مہلک شعاعوں میں نہلا سکتا ہے، ایسے حادثے کی خبر کہکشاں میں ہر طرف رفتارِ نور سے پھیلے گی لیکن ہم اس حقیقت سے کئی سال تک بے خبر اور تباہی سے محفوظ بھی رہیں گے، چنانچہ اگر کائنات کسی وقت بالکل پر سکون بھی نظر آتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں لینا چاہیے کہ کوئی خوفناک واقعہ وقوع پذیر نہیں ہو چکا۔


کائنات میں جو حادثے اچانک ہوتے ہیں ان کے بعد میں ہونے والے برے اثرات ارد گرد کے علاقے تک محدود رہتے ہیں، کسی ستارے کی موت یا بلیک ہول میں مادے کے گرنے سے جو اثرات ہوں گے وہ ارد گرد کے علاقے میں چند نوری سال تک محدود رہیں گے، کہکشاوں کے وسط میں ہونے والے آنا فاناً دھماکے سب سے جiran کن اور غیر معمولی نظارہ پیش کرتے ہیں، جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے اس کے نتیجے میں مادے کے فوارے چھٹتے ہیں جن کی رفتار انتہائی زیادہ ہوتی ہے، طاقتور شعاعیں بھی بہت شدت سے خارج ہوتی ہیں، یہ کہکشاں کے پیمانے کی تخریب ہے۔

لیکن کیا ایسا بھی ممکن ہے کہ کوئی ایسا واقعہ ہو جو کائنات کو اس کی عمر کے درمیانی حصے میں ہی ختم کر دے؟ اور کیا یہ ممکن ہے کہ کائناتی سطح کا تباہ کن سانحہ نمودار ہو گیا ہو اور اب ماضی کی نوری مخروط میں اوپر کی طرف چلتا ہماری نازک آماجگاہ کی طرف بڑھ رہا ہو۔

1980 میں دو طبیعت دانوں سڈنی کولمین (Sidney Coleman) اور فرییک ڈی لوشیا (Frank De Luccia) نے "خلائی انحطاط اور اس پر تجاذبی اثرات Gravitation Effects on and of Vacuum Decay" کے عنوان سے ایک ہبیت انگیز مقالہ فیزیکل ریویو (Physical Review) میں شائع کروایا، اس میں انہوں نے جس خلاء کا ذکر کیا تھا خالی فضاء یا مکان نہ تھی بلکہ قدری طبیعت کی "حالت خلاء" تھی، تیرے باب میں وضاحت کی گئی تھی کہ جو فضاء بظاہر خالی معلوم ہوتی ہے اس میں در حقیقت ہمہ وقت قدری سرگرمی جاری رہتی ہے، غیر حقیقی ذرات کا بننا اور معدوم ہونا ہمہ وقت ایک غیر منظم انداز میں جاری رہتا ہے، آپ کو یہ بھی یاد ہو گا کہ یہ قدری حالت (Quantum State) بے مثال اور واحد نہیں ہوتی، ایک سے زیادہ قدری حالتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ان میں قدری سرگرمی (Quantum Activity) کا درجہ اور ان سے وابستہ توانائیاں مختلف ہوں گی۔

قدرتی طبیعت کا مسلسل اصول ہے کہ اوپنے درجے کی حالتوں میں انحطاط پذیر ہو کر نچلے درجوں کی طرف منتقل ہونے کا رجحان پایا جاتا ہے، مثلاً ایک ایم کئی برائیختہ حالتوں (Excited States) پر موجود ہو سکتا ہے جو سب غیر مستحکم ہیں، ایم میں بذریعہ انحطاط یعنی توانائی کا اخراج کرنے کی کم ترین توانائی کی حالت پر آنے کا رجحان موجود ہوتا ہے جو مستحکم حالت ہے، بالکل اسی طرح برائیختہ خلاء کو شش کرے گا کہ بذریعہ انحطاط توانائی کے کم ترین درجہ یا حالت پر چلا آئے جو کہ "حقیقی" خلاء ہے، کائناتی پھلاو کے نظریے کی بنیاد اسی نظریے پر ہے کہ ابتداءً کائنات میں "باطل" یا برائیختہ خلاء موجود تھا جس نے کائنات کو انتہائی شدت سے پھلایا، لیکن بہت ہی قلیل وقت میں یہ "باطل" خلاء "حقیقی" خلاء کے درجہ پر چلا آیا اور پھلاو کا مرحلہ ختم ہو گیا۔

عمومی مفروضہ یہی ہے کہ آج کی کائنات حقیقی خلاء سے مطابقت رکھتی ہے، یعنی کہ ہمارے دور کی کائنات میں موجود خلاء کم ترین توانائی کے درجے پر ہے، مگر کیا ہمیں اس مفروضے کو مان لینا چاہیے؟ لیکن کو لمین اور ڈی لوشا نے مفروضہ پیش کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ موجودہ خلاء بھی حقیقی نہ ہو بلکہ لمبے عرصے تک موجود رہنے والے نزد قائم حالت استحکام (Metastable) کی حامل ہو اور ہمارا احساسِ تحفظ صرف اس کے کئی ملین سال تک اس حالت میں موجود رہنے کی وجہ سے ہو، ہم یوریٹیم ایم کی سی کئی قدری حالتوں سے واقف ہیں جن کی نصف زندگی کئی بلین سال کی ہوتی ہے، فرض کریں کہ ہمارا موجود خلاء بھی اسی گروہ میں شامل ہو، اگر موجودہ حالت کسی وقت ٹوٹتی اور کائنات کم تر توانائی کی حالت پر چلی جاتی ہے تو اس سانحے کے نتائج ہم سب کے لیے بہت خوفناک ہوں گے، کو لمین کے مفروضے میں ایک مظہر قدری سرگن (Quantum Tunneling) کو بنیادی اہمیت حاصل ہے، اس مظہر کو سمجھنے کے لیے ایک ایسے قدری ذرے پر غور کریں جسے قوتِ رکاوٹ (Force Barrier) نے پھنسا لیا ہے، فرض کریں کہ ذرہ ایک وادی میں ہے جس کے اطراف کو پہاڑیوں نے گھیرا ہوا ہے (شکل 10.2) یہاں پہاڑیوں سے مراد اصلی پہاڑیاں نہیں بلکہ بر قی یا نیو کلیائی میدانوں سے مقابله قوتیں ہو سکتی ہیں۔




سرنگ اثر، اگر ایک ذرہ دو پہاڑیوں کے درمیان وادی میں پھنس جاتا ہے تو بہت کم امکان ہے کہ تو انائی ادھار دے کر انہیں پھلانگ کر باہر نکل سکے، جب کہ مشاہدہ کے مطابق یہ پہاڑی میں سے "سرنگ" لگا کر نکل جاتا ہے، اس طرح کا زیادہ عام مظہر الفا ذرے کی تابکاری ہے، اس میں الفا ذرہ مرکزے کی حد بندی میں سے "سرنگ" کے ذریعے فرار ہوتا ہے، اس مثال میں پہاڑی نیوکلیئی اور برتنی قوت کی علامت ہے، دی گئی شکل علمتی ہے۔

شکل 10.2

اگر ذرے کے پاس پہاڑیوں پر چڑھنے (یعنی کہ ان قوتوں پر حاوی ہونے کے) کے لیے درکار تو انائی نہیں تو بظاہر یہ ذرہ ہمیشہ کے لیے وہاں پھنس جاتا ہے، لیکن ذہن میں رہے کہ تمام قدری ذرات پر ہیزن برگ کے اصول عدم تیقین کا اطلاق ہوتا ہے اور وہ قلیل عرصے کے لیے تو انائی ادھار دے سکتے ہیں، یہ حقیقت ایک ممکنہ دروازے کا راستہ دکھاتی ہے، اگر ذرے کو اتنی تو انائی ادھار مل جاتی ہے کہ وہ اسے واپس کرنے کی طے شدہ مدت سے پہلے پہلے پہاڑی چڑھ کر دوسری جانب اتر جاتا ہے تو وہ آزاد ہو جاتا ہے، لیکن در حقیقت یہ سارا عمل پہاڑی میں سے سرنگ بنایا کر نکل بھاگنے کے مترادف ہو گا، اس لیے اسے ٹنلنگ Tunneling کہتے ہیں، اس طرح کے کنویں میں سے ایک قدری ذرے کے بذریعہ سرنگ نکل بھاگنے کے امکان کا انحصار کنوئیں کی گہرائی اور اس کی دیواروں کی چوڑائی پر ہے، رکاوٹ جتنی بلند ہو گی (یعنی کنوں جتنا گہرا ہو گا) ذرے کو اتنی ہی زیادہ تو انائی ادھار لینا پڑے گی، چنانچہ دیواروں کے اوچا ہونے کی صورت میں بذریعہ سرنگ فرار صرف اس وقت ممکن ہے اگر ان کی موٹائی زیادہ نہیں، اسی صورت میں ذرہ ان میں سے اتنی تیزی سے گزر سکے گا کہ وہ اپنا ادھار وقت پر

واپس کر سکے، یہی وجہ ہے کہ "سرنگ اثر" عملی طور پر غیر موثر ہو جاتا ہے، یہ اصولی طور پر ممکن ہے کہ انسان اینٹوں کی بنی ایک دیوار میں سے گزر جائے لیکن اس قدری سرنگ کا امکان انہائی کم ہے، لیکن ایٹھی پیانا نے پر "سرنگ اثر Tunneling Effect" روز مرہ کی بات ہے، الفا ذرات کی تابکاری اسی طریقے سے ہوتی ہے، اس اثر کو یہی کہنڈ کڑ ایکٹر ک آلات بنانے میں استعمال کیا جاتا تھا، اس کی ایک مثال سکنینگ ٹنلنگ خور دیبن (Scanning tunneling microscope) ہے۔

جہاں تک موجودہ خلاء کے ممکنہ اخاطط کے مسئلے کا تعلق ہے تو کوئی مفروضہ قائم کرتے ہیں کہ یہ خلاء جن قدری میدانوں پر مشتمل ہے انہیں شکل نمبر 10.3 کی مدد سے سمجھایا جاسکتا ہے، موجودہ خلائی حالت کو وادی A کے پیندے سے مماثلت دی جاسکتی ہے، جبکہ حقیقی خلاء وادی B کے پیندے سے مماثل ہے جو کہ A سے نیچا ہے، خلاء میں اوپری تووانائی کی حالت A سے پنجی تووانائی کی حالت B پر جانے کا رجحان پایا جاتا ہے لیکن دونوں وادیوں کو علیحدہ کرنے والی پہاڑی یا قوت کا میدان اس عمل کی راہ میں رکاوٹ ہے، اگرچہ یہ پہاڑی اس اخاطط کی راہ میں رکاوٹ ہے لیکن اس عمل کی ممانعت نہیں کرتی، اس کی وجہ "سرنگ اثر" ہے، پورا نظام حالت A سے عمل سرنگ (Tunneling) کے ذریعے حالت B میں چلا جاتا ہے، اگر یہ نظریہ درست ہے تو پوری کائنات ادھار کی زندگی گزار رہی ہے، یہ وادی A میں لٹک رہی ہے اور کسی بھی لمحے یہ بذریعہ "سرنگ اثر" وادی B میں گر سکتی ہے۔



خلاء کی باطل اور حقیقی حالتیں، ہو سکتا ہے کہ موجود خلاء کی قدری حالت A تو انائی کی کم ترین حالت نہ ہو، لیکن ایک بلند وادی کی طرح موجود خلاء کا یہ استحکام عارضی اور مصنوعی ہو سکتا ہے، اس کا امکان موجود ہے کہ سرنگ اثر کے ذریعے خلاء باطل حالت سے حقیقی خلاء کی حالت پر آجائے، یہ تبدیلی ایک بلبلہ بننے کے واسطے سے ہو گی اور نتیجہ کے طور پر تو انائی کی بہت بڑی مقدار خارج ہو گی۔

شکل 10.3

کولمین اور ڈی لوشا نے اس خلائی انجھاط کا ریاضیاتی خاکہ مرتب کیا ہے، اس میں انہوں نے اس مظہر کے خدوخال واضح کیے ہیں، ان کے مطابق اس کا آغاز خلاء میں کسی بھی جگہ سے ہو سکتا ہے، وہاں حقیقی خلاء کا ایک چھوٹا سا بلبلہ بننے گا جو غیر مستحکم اور باطل یا غیر حقیقی خلاء میں گھرا ہوا ہو گا، جب یہ بلبلہ پہلیا شروع ہو گا تو اس کی ہر لمحہ بڑھتی ہوئی رفتار جلد ہی روشنی کی رفتار کے برابر ہو جائے گی، یہ ساری باطل خلاء کو نگل کر حقیقی خلاء میں بدل دے گی، دونوں حالتوں کی تو انائی کے فرق کے برابر تو انائی اس نئھے سے بلبلے میں مرکز ہو گی، بلبلہ پھینے سے یہ تو انائی بھی ہر طرف پھیلے گی اور راہ میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کرتی چلی جائے گی، اس تو انائی کی مقدار کا اندازہ باب سوم میں بیان ہو چکا ہے۔

ہمیں حقیقی خلاء کے اس بلبلے کی موجودگی کا پتہ ہی اس وقت چلے گا جب اس کی دیوار ہم تک آپنچے گی اور ہماری دنیا کا قدری ڈھانچہ اچانک تبدیلی سے دوچار ہو چکا ہو گا، ہمیں تین منٹ پہلے کی باخبری کی سہولت بھی نہیں ملے گی، تمام تحت ایسی Sub-Atomic ذرات کی خصوصیات اور ان کے باہمی تعاملات بدل جائیں گے، مثلاً ہو سکتا ہے کہ تمام پروٹانوں کا ایک لمحہ میں انحطاط ہو جائے اور تمام اجسام کی توانائی میں تغیر ہو جائے، جو کچھ باقی رکھے گا وہ حقیقی خلاء کے بلبلے میں ہو گا اور معاملات اس کے لیے اب بہت مختلف ہوں گے، اہم ترین فرق کا تعلق تجاذب سے ہے، حقیقی خلاء کی توانائی اور دباؤ اتنے شدید تجاذبی میدان کو جنم دے گا کہ اس بلبلے کے اندر کے علاقے سینڈ کے لاکھوں حصے میں منہدم ہو جائیں گے، حالانکہ یہ بلبلہ پھیل رہا ہو گا، درجہ بدرجہ بگ کر رنج کی طرف بڑھنے کی بجائے ہر چیز اچانک فنا ہو جائے گی کیونکہ اس بلبلے کے اندر وہ میں اندر کی طرف دھماکے سے زمان و مکان کی وحدت پیدا ہو گی، اس کا مطلب محض الفاظ میں لحاظی کرنچ ہے، مصنفین اسے "دل شکن" قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں:

"اس امکان پر غور کرنا کبھی خوش کن نہیں رہا کہ ہم ایک باطل خلاء میں زندہ ہیں، خلائی انحطاط حتیٰ ماحولیاتی تباہی ہے، اس کے بعد نہ صرف یہ کہ ہماری شناساً زندگی ناممکن ہے بلکہ کیمیاء بھی تبدیل ہو جائے گی، تاہم ہماری تسلیم کو یہ خیال شاید کافی ہو کہ وقت کے ساتھ ساتھ حقیقی خلاء مستقل ہو جائے گا، ہر چند زندگی کی جس شکل سے ہم واقف ہیں وہ اس میں موجود نہیں ہو گی لیکن یہ امکان کہ ہم اس نظام کا عالم حاصل کرنے کی لذت اٹھ سکیں گے صفر کے برابر ہے۔"


اس مضمون کی اشاعت کے بعد طبیعت دانوں اور فلکیات دانوں کے مابین خلائی انحطاط کے مابعد اثرات پر زور دار بحث شروع ہوئی، رسالے نیچر (Nature) میں چھپنے والے ایک مضمون میں ماہر کائنات مائل ٹرنر (Michael Turner) اور طبیعت دان فرینک ولیزک (Frank Wilczek) نے اپنے اخذ کردہ ان نتائج کا اعلان کیا، خورد طبیعت (Microphysic) کی رو سے ہماری خلاء کا نزد مسحجم (Metastable) ہونا عین قرین قیاس ہے، کائنات میں کسی بھی جگہ حقیقی خلاء کا ایک چھوٹا سا بلبلہ شروع ہو گا اور پھر رفتار نور سے باہر کی جانب پھیلتا ہمیں آ لے گا.

ٹرنر اور ویلزیک کے مضمون کی اشاعت کے کچھ دیر بعد مارٹن ریس (Martin Rees) اور پیٹ ہٹ (Piet Hut) نے بھی نیچر میں ایک مضمون لکھا اور ایک خوفناک امکان کی طرف اشارہ کیا کہ ہو سکتا ہے حقیقی خلاء کے ابتداء کی ذمہ داری نیادی ذرات پر تجربات کرنے والے طبیعت دان خود بنیں، نظری اعتبار سے جب اونچی توانائی کے تحت اسی ذرات باہم ٹکراتے ہیں تو ہمارے موجودہ خلاء میں حقیقی خلاء کا بلبلہ پیدا ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے، اور جب ایک بار ایسا بلبلہ پیدا ہو گیا تو پھر اسے پوری کائنات کا احاطہ کرنے سے روکنے کی کوئی صورت نہ ہو گی، تو کیا ہمیں اسراع گروں (Particle accelerators) کی تعمیر پر پابندی لگا دینی چاہیے، لیکن ایسی کوئی بھی صورت بے سود ہو گی، کیونکہ کائناتی شعاعوں میں موجود ذرات ہمارے اسراع گروں کی پیداوار سے کہیں زیادہ طاقتور ہوتے ہیں اور یہ کئی بلین سال سے زمین کے کرہ ہوائی کو نشانہ بنائے ہوئے ہیں، اور پھر حقیقی خلاء کا بلبلہ تو کائنات میں کسی بھی جگہ جنم لے سکتا ہے، ہٹ اور ریس کے حساب کے مطابق اگر کائناتی شعاعوں کے ذرات براہ راست متصادم ہوں تو خارج ہونے والی توانائی ہمارے موجودہ اسراع گروں کی پیداوار کی نسبت کئی بلین گنا زیادہ ہو گی، چنانچہ کسی قسم کی انضباطی کارروائی غیر ضروری اور بے معنی ہے۔

مگر اس خلائی بلبلے کی تشکیل کے ساتھ ایک قضیہ ہے، ہماری تباہی کے اس مکنہ ذریعے کو تھوڑے سے مختلف پس منظر میں دیکھا جائے تو یہی ہماری نجات کا واحد قابل عمل ذریعہ ہے، کائناتی موت میں سے زندہ نجف نکلنے کا ایک ہی یقینی راستہ ہے کہ نئی کائنات بنانے کا اس میں منتقل ہوا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک عجیب مفروضہ لے لیکن حالیہ سالوں میں "کائناتی اطفال" (Baby Universes) پر کافی بحث ہوئی ہے اور بہت سے دلائل اس کے حق میں جاتے ہیں، مسئلے کے اس پہلو کو سب سے پہلے 1981 میں جاپانی طبیعت دانوں کے ایک گروہ نے اجاتگر کیا، انہوں نے اپنے کام کا آغاز حقیقی خلاء میں گھرے باطل خلاء کے بلبلے کے ریاضیاتی خاکے سے کیا تھا، یہ مطالعاتی خاکہ اوپر زیر بحث خاکے کے الٹ ہے، باب سوم میں باطل خلاء کے حوالے سے بیان کیا گیا تھا کہ گب بینگ کے عمل میں یہ پھیلتی کائنات کے ساتھ پھیلتا جائے گا، پہلی نظر میں لگتا ہے کہ باطل خلائی بلبلے کا پھلاو بلبلے کی دیواروں کو حقیقی خلاء کی قیمت پر پھیلائے گا، لیکن یہ عمل اس توقع کے عین بر عکس ہے کہ کم توانائی کے حقیقی خلاء کو بلند توانائی کے باطل خلاء کی جگہ لینا ہے نہ کہ اس کے بر عکس۔

عجیب بات یہ ہے کہ اگر حقیقی خلاء میں سے دیکھا جائے تو باطل خلاء کے بلبلے کا مقبوضہ حصہ پھولتا نظر نہیں آتا، در حقیقت یہ ایک بلیک ہول سے مشاہدہ رکھتا ہے، اس باطل بلبلے کے اندر بیٹھے ایک فرضی شخص کو کائنات بے حد و بے حساب پھیلتی ہوئی نظر آئے گی، لیکن اگر باہر سے دیکھا جائے تو یہ بلبلہ بھنچا رہے گا، اس صورتِ حال کو سمجھنے میں رہٹ کی ایک شیٹ کی

مثال دی جاسکتی ہے جو کسی ایک نقطے سے پھول کر غبارے کی شکل اختیار کر گئی ہو، (شکل 10.4) اس شکل میں غبارہ بچ کائنات سے مشابہت رکھتا ہے جو مادر کائنات سے ایک ننگ سوراخ کے ذریعے ملا ہوا ہے، اگر مادر کائنات کے اندر سے دیکھا جائے تو اس سوراخ کا منہ ایک بلیک ہول کی صورت نظر آتا ہے، لیکن یہ انتظام غیر مستحکم ہے، بلیک ہول ہانگ اثر کے تحت فوراً بخارات میں بدل جاتا ہے اور مادر کائنات میں مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے، نتیجہ کے طور پر مادر اور بچہ کائنات کو ملانے والا سوراخ بند ہو جاتا ہے اور بچہ مادر کائنات سے جدا ہو کر اپنے طور پر ایک نئی اور آزاد کائنات بن جاتی ہے، ایک مادر کائنات سے کونپل کی شکل میں پھوٹ کر بچہ کائنات کا بعد ازاں ایک آزاد کائنات بن جانا ہماری اپنی کائنات کے پیدائشی عمل سے مماثلت رکھتا ہے، اس میں بھی بچلاو کا ایک مختصر عرصہ آیا تھا، جس کے بعد اس کے پھیلنے کی شرح کم ہو گئی تھی، اس خاکے کے مضرات میں سے ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ہماری کائنات اسی طریقے سے وجود میں آئی ہو یعنی کہ کسی اور کائنات کی اولاد ہو۔



مادر کائنات میں سے ایک بچہ کائنات پھولتے ہوئے غبارے کی صورت نمودار ہوتی ہے، بچہ کائنات اور مادر کائنات سے ایک نافی ورم ہول (Umbilical Wormhole) کے ذریعے متصل ہے، مادر کائنات میں سے دیکھا جائے تو اس سوراخ کا منہ بلیک ہول کی خصوصیت کا حامل ہے، اس بلیک ہول کی تبدیل کے بعد مادر کائنات بچہ کائنات سے جدا ہو جاتی ہے، اور یوں ایک نئی کائنات وجود میں آتی ہے۔

شکل 10.4

پھلاوہ کے نظریے کے بانی الین گٹھ (Alan Guth) اور اس کے ساتھیوں نے تحقیقات کی ہیں کہ آیا مندرجہ بالا منظرنامہ کسی تجربہ گاہ میں ایک نئی کائنات کی پیدائش کے امکان کی اجازت دیتا ہے، باطل خلاء کے انحطاط اور اس سے حقیقی خلاء کے ایک بلیلے بنے والے خاکے کے برعکس باطل خلاء کے گرد ایک حقیقی خلاء والا خاکہ کائنات کے انهدام کی پیش گوئی نہیں کرتا، اس کی بنیاد پر جو تجربہ کیا جائے گا، وہ بلیک ہول کے اندر ہو گا، جس کی فوراً ہی تغیر ہو جائے گی، نئی کائنات اپنا مکان خود پیدا کرے گی نہ کہ ہمارے مکان کو ہڑپ کر جائے گی۔

اگرچہ یہ سارا نظریہ قیاسی ہے لیکن بہر حال ریاضیاتی خاکوں پر مبنی ہے، کچھ مقالوں سے نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر تو انائی کی بہت بڑی مقدار احتیاط سے وضع کیے گئے طریقوں سے اکٹھی کر دی جائے تو نئی کائنات کی تخلیق کا امکان ہے، مستقبل بعید میں جب ہماری کائنات ناقابلِ رہائش ہو کر بگ کر نج کی سمت بڑھ رہی ہو گی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے جانشین فیصلہ کریں کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیں، وہ نئی کائنات کی گلی بننے پر اسے پرانی کائنات سے ملانے والے سوراخ کے بند ہونے سے پہلے اس میں سے گزر کر نئی کائنات میں داخل ہو جائیں، بلاشبہ ابھی تک کہا نہیں جاسکتا کہ یہ سارا کرتب کیسے کیا جائے گا، کم از کم مادر اور بچہ کائنات کو ملانے والے سوراخ میں سے گزرنा انتہائی مشکل ہو گا، اور اگر بلیک ہول بڑی جسامت کا نہیں تو خاصہ تکلیف دہ بھی نہیں ہو گا، ان امور کو نظر انداز کر دیا جائے تو بچہ کائناتوں کا امکان ہی پسی ابدیت کے دروازے کھول دیتا ہے، یہ ابدیت نہ صرف ہمارے جانشینوں کے لیے ہو گی بلکہ کائنات کے لیے بھی!

اس صورت میں ہمیں کائنات کی موت و حیات پر سوچنے کی بجائے کائناتوں کے ایک ایسے خاندان کو زیر غور لانا چاہیے جو لا انتہاء طور پر اپنی نسلوں کو آگے سے آگے بڑھاتا چلا جا رہا ہے، اس کائناتی اجتماع کا نہ کوئی آغاز ہے اور نہ کوئی انجام، کائناتیں انفرادی سطح پر پچھلے ابواب میں بیان کیے گئے طریقوں کے مطابق پیدا ہو کر عمل ارتقاء سے گزریں گی اور آخر کار معدوم ہو جائیں گی لیکن بحیثیت مجموعی ان کا اجتماع ابدیت کا حامل ہو گا، مندرجہ بالا منظرنامہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ آیا ہماری اپنی کائنات فطری طور پر پیدا ہوئی تھی یا ایک سوچ سمجھے منصوبے کے تحت یعنی ٹیسٹ ٹیوب بے بی کی طرح پیدا کی گئی تھی، ہم ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کو چشم تصور سے دیکھ سکتے ہیں جو ایک مادر کائنات میں موجود تھی، اور اس نے بچہ کائنات بنانے کا فیصلہ کیا تاکہ اگر کبھی ان کی اپنی کائنات تباہی سے دوچار ہو تو زندگی کا تسلسل برقرار رہ سکے۔


یہ واضح نہیں ہو سکا کہ بچہ کائنات کس حد تک مادر کائنات کے موروثی خصائص کی حامل ہو گی، طبیعت داں ابھی تک سمجھ نہیں سکے کہ فطرت کی مختلف قوتیں اور مادے کے ذرات وہ خصوصیات کیوں رکھتے ہیں جن کا وہ اظہار کرتے ہیں، ایک

طرف یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ خصوصیات قوانین فطرت کا حصہ ہوں اور ہر کائنات میں ایک سی ہوں، دوسری طرف یہ امکان بھی موجود ہے کہ کچھ خصوصیات صرف ارتقائی حادثات کا نتیجہ ہوں، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ کئی حقیقی خلائی حالتیں ہوں جو سب ایک سی ہوں اور تقریباً ایک جسمی قوانین کی حامل ہوں اور جب پہلاً دور کے آخر پر غیر حقیقی خلاء کا انحطاط ہوا ہو تو اس نے ان بہت سی ممکن خلائی حالتوں میں سے کسی ایک کا بغیر کسی ترجیحی وجہ کے انتخاب کر لیا ہو، خلائی حالت کا یہ انتخاب بنیادی ذرات کی بہت سی خصوصیات اور ان کے درمیان کارفرما قوتوں کے یقین میں بہت اہم ہے، بلکہ یہ فضائی سموں کی تعداد بھی متعین کرتا ہے، چنانچہ ہو سکتا ہے کہ بچہ کائنات مادر کائنات سے مختلف خصوصیات کی حامل ہو، اور زندگی ان بچہ کائناتوں میں سے بہت کم پر ممکن ہو، یعنی صرف ان کائناتوں پر جہاں طبیعتی قوانین ہماری موجودہ کائنات سے مشابہت رکھتے ہوں، یہ بھی امکان ہے کہ وراثتی اصولوں کی کوئی تقسیم متعین ہو جس کی رو سے بچہ کائناتیں تھوڑی بہت تبدیلی کے ساتھ بالکل مادر کائناتوں کی سی ہوں، ماہر طبیعت لی سمولن (Lee Smolin) کی تجویز ہے کہ کائناتوں کی نسل کشی میں بھی ڈارون کا سا کوئی اصول کارفرما ہو سکتا ہے جو بالواسطہ طور پر زندگی اور شعور کے ظہور کی حوصلہ افزائی کرتا ہو، زیادہ دلچسپ امکان یہ ہے کہ مادر کائنات میں موجود کسی ذہانت نے بچہ کائناتیں بنائی ہوں، اور اسے بلا ارادہ زندگی اور شعور کے لیے موافق خصوصیات دی ہوں۔

ان تمام نظریات میں سے کوئی بھی قیاسی پروازوں سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا، لیکن کائنات کی سائنس فی الحال ابتدائی مراحل میں ہے، یہ نظریات اس امکان کا بہر حال اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہمارے جانشینوں کو آخری تین منٹ کا سامنا کرنا بھی پڑتا ہے تو باشعور مخلوق کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی صورت میں بہر حال موجود رہے گی۔

## ان گنت دنیا میں

پچھلے باب میں جو انوکھے نظریات زیر بحث لائے گئے وہ کائناتی اختتام سے نجف نکلنے کے تنازعہ امکانات کے خاکوں پر مشتمل تھے، لیکن ان خاکوں کی فہرست کافی طویل ہے، میں جب بھی کائنات کے اختتام پر یقیناً پر کوئی نہ کوئی دوری خاکے Cycle Model پر سوال کر دیتا ہے، یہ نظریہ کچھ اس طرح سے ہے، کائنات ایک خاص زیادہ سے زیادہ حد تک پھیلنے کے بعد سکڑتی ہے، بگ کرچھ Big Crunch کا شکار ہوتی ہے لیکن بجائے ہمیشہ کے لیے ختم ہونے کے دوبارہ ابھرتی ہے اور پھلاو اور سکڑاؤ کے اگلے دور کے لیے پھیلنا شروع کر دیتی ہے (شکل 11.1) یہ عمل ہمیشہ جاری رہتا ہے، بجائے خود اس عمل کا کوئی آغاز ہے نہ اختتام، لیکن انفرادی دور کا بلاشبہ آغاز اور اختتام ہوتا ہے، اس نظریے نے خصوصاً ان لوگوں سے مماثلت حاصل کی ہے جنہوں نے بدھ مت اور ہندو مت کے دوری حیات و موت اور تعمیر و تخریب کی اساطیر ([Mythologies](#)) سے اثر قبول کیا ہے۔



دوری کائنات کا خاکہ۔ کائنات بہت ہی کثیف اور پھولتی میعادی حالتوں کے درمیان نبضتی ہے۔ ہر دور ایک بگ بینگ سے شروع ہوتا ہے اور ایک بگ کرنچ پر ختم ہوتا ہے، جبکہ وقت میں یہ تقریباً متناسب ہے۔

شکل 11.1

میں نے اختتام کائنات پر دو منظر نامے تحریر کیے ہیں جو سائنسی اصولوں پر مبنی ہیں، ہر دو اپنے اپلے طور پر پریشان کن ہیں، بگ کرنچ خواہ کتنی دور ہو، خود کائنات کے ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جانے کا امکان خاصہ بھیانک لگتا ہے، دوسری طرف شاندار سرگرمیوں کے ایک محدود عرصے کے بعد کائنات کا ہمیشہ کے لیے ایک تاریک خالی پن میں بدل جانا بھی گہری یاسیت پیدا کرتا ہے۔

ہر دو خاکے (Model) ایک ایسی سپر مخلوق کے امکان پر متفق ہیں جو لا محدود رفتار سے انفارمیشن پروسینگ (Information Processing) پر قادر ہوگی، لیکن ہم گرم خون والوں کے لیے یہ امید کچھ زیادہ گرم جوشی کی حامل نہیں۔

دوری خاکے (Cycle Model) کا روشن پہلو یہ ہے کہ یہ مکمل اور ابدی اخاطاط اور رفتار کی نقیب نہیں لیکن اس میں بھی ختم نہ ہونے والی ایک لا حاصل تکرار ہے، اس سے بچاؤ کی ایک صورت یہ ہے کہ ہر دور کسی قدر مختلف ہو، اس نظریے کی ایک مقبول صورت کے مطابق ہر نئے دور کی کائنات تقوس (Phoenix) کی طرح جل بجھنے والی اپنی پیشوں سے مختلف ہوگی، پرانی کائنات کی باقیات سے جنم لینے والی کائنات اپنی ساخت اور نظام کی تشکیل کرے گی اور خود اپنے عجائب و نوادر تخلیق کرے گی حتیٰ کہ ایک بار پھر اگلا بگ کرنچ اس ساری تحریر کو صاف کر دے گا۔

اگرچہ نظریہ خاصہ پر کشش ہے لیکن اس کی اپنی طبیعی مشکلات ہیں، پہلی مشکل تو اس کے کارگر لائجہ عمل کی نشان دہی ہے جس کے تحت سکڑتی کائنات کثافت کے ایک انتہائی درجے پر پہنچ کر بجائے بگ کرنچ میں فنا ہونے کے واپس ابھرے، کسی طاقتور ضد تجاذبی Anti-Gravitational قوت کا ہونا ضروری ہے جو سکڑاوے کے آخری مراحل پر اتنی طاقتور ہو جائے کہ

دھاکے سے اندر کی طرف گرتی کائنات کے مومنینم کا بھی مقابلہ کرے اور تجاذب کی تباہ کن قوت کو بھی برابر کر کے بے عمل کر دے، ابھی کوئی ایسی قوت ہمارے علم میں نہیں، اگر ایسی قوت ہے تو بھی اس کی خصوصیات عجیب و غریب ہوں گی۔

قاری کو یاد ہو گا کہ بگ بینگ کے دوران کے مرحلے پر ایسی ہی ایک مفروضہ قوت پھیلاؤ کے مرحلے میں بروئے کار آئی تھی، لیکن یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے کہ وہ پھیلاؤ خلاء کی ایجنتہ حالت کی وجہ سے پیدا ہوا تھا جو بہت غیر مستحکم ہے اور اس کا بہت جلد اختطاط ہو جاتا ہے، چھوٹی، سادہ اور جنم لیتی ہوئی کائنات کا اتنی غیر مستحکم حالت میں ہونا خارج از قیاس نہیں، لیکن بڑے پیانے کی ایک پیچیدہ کائنات کے عمل میں ہے، ہر جگہ باطل خلاء کا انتظام کر لینا بالکل دوسرا بات ہے، یہ صورت حال کسی پینسل کو اس کی نوک پر متوازن کرنے کے متادف، پینسل فوراً الٹ جائے کہ یہی زیادہ آسان ہے، لیکن پینسل کو دوبارہ اس کی نوک پر کھڑا کرنا مشکل کام ہو گا۔

اگرچہ مندرجہ بالا مسئلے سے کسی طرح نہ سمجھی لیا جائے تو اور بھی مشکل مراحل موجود ہیں، ان میں سے ایک باب دوم میں زیر بحث آیا تھا، جو نظام ایک محدود رفتار پر واپس نہ پہنچائے جانے والے انداز یعنی غیر رجعت پذیر انداز میں واقع ہوتے ہیں وہ ایک محدود مدت میں اپنی حتمی حالت کو پہنچ جاتے ہیں، یہی وہ اصول تھا جس کی روشنی میں حرارتی موت کا نظریہ انیسویں صدی میں سامنے آیا تھا، دوری کائنات کا خاکہ اس مشکل کا حل نہیں دیتا، کائنات کا ایسے کلاک سے تقابل کیا جاسکتا ہے جس کی چابی رفتہ رفتہ ختم ہو رہی ہے، دو باہ چابی نہ دیے جانے پر اسے بہر حال کبھی بند ہونا ہے، لیکن چونکہ کائنات خود غیر رجعت پذیر تبدیلی کے عمل میں ہے اس لیے یہ خود کو "چابی" نہیں دے سکتی۔

پہلی نظر میں یہی لگتا ہے کہ کائنات کے مسامار ہونے کا مرحلہ دراصل اس مرحلے کا الٹ ہے جس میں یہ پہلی تھی، کیونکہ باہر کو پھیلتی کہکشاںیں واپس کھنچنا شروع ہو گئیں، ٹھنڈی ہوتی پس منظری شعاعیں (Background Radiation) گرم ہونے لگیں اور پیچیدہ کیمیائی عناصر دوبارہ سادہ اور بنیادی ابتدائی ذریں میں ٹوٹنے لگے، بگ کرنچ سے ذرا پہلے کی حالت بگ کرنچ سے ذرا بعد کی حالت سے ملتی جلتی ہے، لیکن مطابقت کا یہ سب تاثر صرف سطحی ہے، جو بھی فلکیات دان موجود ہو گا اسے سکڑا اور شروع کرنے کے بعد بھی کئی بلین سال تک کہکشاںیں دور ہتھی نظر آئیں گی، اگرچہ کائنات سکڑنے لگی ہے لیکن اسے اب بھی پھیلتی نظر آئے گی، اس فریب نظری کی وجہ روشنی کی محدود رفتار سے پیدا ہونے والا پیچھے رہ جانے کا عمل یا پچھاڑ (Lag) ہے۔

1930 میں رچڈ ٹولمین (Richard Tolman) نے ثابت کیا کہ پچھاڑ یا پیچھے رہ جانے کا عمل کس طرح دوری کائنات کی ظاہری مطابقت (Symmetry) کا پردہ چاک کرتا ہے، بہت سادہ دلیل ہے، کائنات نے اپنے آغاز کے لمحات میں بہت سی حرارت شعاعوں کی شکل میں خارج کی، بعد ازاں ستاروں نے بھی حرارت خارج کی، کئی بلین سال کے بعد ستاروں سے بھری خلاء میں ان کی خارج کردہ حرارت بگ بینگ کی خارده کردہ حرارت کے برابر ہو گئی، چنانچہ جب کائنات سکڑاؤ سے گزر کر بگ کر پنج تک آئے گی تو حرارت کی مقدار بگ بینگ سے کافی زیادہ ہو گئی، اس وجہ سے کئی بلین سال بعد جب کائنات سکڑنا شروع ہو گی اور آج کی کثافت پر آئے گی تو اس کا اوسط درجہ حرارت آج سے بہت زیادہ ہو گا۔

یہ زائد توانائی کیلئے مادہ آئن سٹائن کے معروف کلیے  $E=mc^2$  کے تحت فراہم کرتا ہے، حرارت خارج کرنے والے ستاروں میں ہائیڈروجن جیسے ہلکے عناصر کئی نیوکلیائی تعاملات کے بعد لو ہے جیسے بھاری عناصر میں بدلتے ہیں، لو ہے کے نیوکلیئس یا مرکزے میں چھیس 26 پروٹان اور تیس نیوٹران ہوتے ہیں، لیکن اس مرکزے کا وزن چھیس پروٹانوں اور تیس نیوٹرانوں کے برابر نہیں ہوتا بلکہ اس سے ایک فیصد کم ہوتا ہے، "گم شدہ" مادہ کہاں گیا؟ یہ مادہ طاقتور نیوکلیائی توقوں کی پیدا کردہ توانائی کی صورت میں خارج ہو گیا، یہی اخراج نیوکلیئس کے استحکام کا ذمہ دار ہے اور ستاروں سے نکلنے والی توانائی کا منع بھی۔

مادے کا اس طرح توانائی میں بدل جانا ہی کائناتی سکڑاؤ کو پھیلاو سے مختلف کرتا ہے، توانائی کی تجاذبی قوت اس کے برابر مادے کی تجاذبی قوت سے مختلف ہے، ٹولمین نے ثابت کیا کہ سکڑاؤ کے مرحلے پر یہ زائد توانائی انہدام کی رفتار کو تیز تر کرتی ہے، اگر کسی طرح سے کائنات بگ کر پنج سے ذرا پہلے واپس اچھل سکے تو اس کا پھیلاو سکڑاؤ سے زیادہ رفتار پر ہو گا، دوسرے الفاظ میں ہر بگ کر پنج پچھلے سے بڑا ہو گا، نتیجہ کے طور پر ہر دور میں کائنات زیادہ دور تک اور زیادہ لمبے عرصے کے لیے پھیلے گی۔

کائناتی دور کے ناقابل پلٹ یا غیر رجعت پذیر ہونے میں کچھ بھی ناقابل فہم نہیں، یہ حر حرکیات کے ناگزیر مضمرات میں سے ایک ہے، توانائی کا ذخیرہ ہونا دراصل توانائی کی عدم دستیابی کا بڑھنا ہے، جو تجاذبی طور پر اپنا اظہار بڑے ہوتے ہوئے ادوار میں کرتی ہے، اس صورت میں مثالی دوریت و قوع پذیر نہیں ہو سکتی، کائناتی ارتقاء وقت کے ایک خاص وقفہ میں ہوتا ہے، اگر اسی خاکے کو لے کر ہم ماضی کی طرف جائیں تو ان کائناتی ادوار کا اختصار اور تیز شرح پیچیدگی پیدا کرتی ہے اور مستقبل میں کائناتی دور اتنے طویل ہو جاتے ہیں کہ انہیں ہمیشہ پھیلتی کائنات میں مضم حرارتی موت کی حالت سے متین نہیں کیا جاسکتا۔

ٹولمین کے بعد دوسرے طبیعت دانوں نے بھی کئی اور طبیعی عوامل کی نشاندہی کی ہے جو ایک کائناتی دور کے پھیلنے اور سکڑنے کے مراحل میں مطابقت کی نفی کرتے ہیں، بگ بینگ کا جو تصور عام طور پر قبول کیا جاتا ہے اس کی رو سے کائنات کے آغاز میں بلیک ہول موجود نہیں تھے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تاروں کے متہدم ہونے اور دوسرے طبیعی عوامل کے نتیجے میں بلیک ہول وجود میں آئے، جب کہ کشاورزیں وجود میں آئیں تو بلیک ہولوں کی تعداد بڑھنے لگی، سکڑاؤ اور انہدام کے آخری مراحل میں دباو کے باعث مزید بلیک ہول وجود میں آئیں گے، ہو سکتا ہے کچھ بلیک ہول مدغم ہو کر بڑے بلیک ہول بنائیں، چنانچہ جب کائنات بگ کر کچھ کے دہانے پر ہو گی تو تجاذبی صورت حال بگ بینگ کے ابتدائی مراحل کی نسبت خاصی پیچیدہ ہو گی، اگر کائنات کو اچھل کر اگلے دور کے لیے واپس ہونا ہے تو اس کے آغاز میں کافی بلیک ہول موجود ہوں گے۔

چنانچہ اگر تو ایسا ہونا ہے تو ہر آنے والے کائناتی دور میں پچھلے دور کے طبیعی نظام اور ساختیں شامل ہوں گی تو پھر حرکیات کے دوسرے قانون کے اختلطی اثرات سے فرار کی کوئی صورت نہیں، اس سے بچاؤ کی صورت یہ مفروضہ ہے کہ ہر نئے کائناتی دور کے آغاز کے لیے کائنات جب بھی واپس اچھلے گی زیادہ قوت سے اچھلے گی، پچھلے دور کے تمام اجسام اور آثار تباہ ہو جائیں گے۔

یہ سمجھنا مشکل ہے کہ اس خاکے میں کیا چیز زیادہ دلکش ہے، اگر ہر دور دوسرے سے طبیعی طور پر کٹا ہوا ہے تو پھر اس کا کیا مطلب ہے کہ ادوار ایک دوسرے سے منسلک ہیں یا ایک ہی کائنات ہے جو تسلسل میں ہے، ادوار بجائے خود علیحدہ اور متشخص ہیں اور ان کو متوازی طور پر موجود کائناتیں یا ایک تو اتر میں موجود کائناتیں کہنا ایک جیسے معنی رکھتا ہے، یہ صورت حال دوسرا جنم لینے والی روایت کی باقیات ہے جہاں دوسرا جنم لینے والے کے پاس پہلے جنم کی کوئی یادداشت نہیں ہوتی، کس طرح کہا جائے کہ ایک ہی شخص نے دوسرا جنم لیا ہے؟

ایک دوسرا امکان یہ بھی ہے کہ حرکیات کے دوسرے قانون کی تھوڑی سی خلاف ورزی ہو جائے یعنی کہ کائنات اچھل کر واپس آتے ہوئے کلاک کو چاپی دے دے، دوسرے قانون کے تحت ہونے والے نقصان کی بحالی کا کیا مطلب ہو گا؟

اس دوسرے قانون کے بروئے کار آنے کی ایک سادہ سی مثال پرفیوم کا بوتل سے تبخیر ہو کر اڑنا ہے، پرفیوم کے مالی کیوں کو کمرے میں سے دھکیل کر دوبارہ بوتل میں ڈالنا واقعی جوئے شیر لانے کے مترادف ہے، فلم کو الٹا چلانے والی بات ہے، دراصل یہ حرکیات کا دوسرا قانون ہے جو ماضی اور مستقبل کی تمیز دیتا ہے، اسے وقت کا تیر کہتے ہیں، چنانچہ اس

قانون کو توڑنے کا عمل وقت کو الٹا چلانے کے مترادف ہے۔

سماں کی دہائی میں ایک فلکی طبیعت دان تھامس گولڈ (Thomas Gold) نے تجویز پیش کی کہ ایک دوبارہ سکڑتی کائنات کے سکڑاؤ کے مرحلے میں وقت کا پیچھے کو بہاؤ ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ اس وقت موجود مخلوق کا ذہن بھی اس اللئے عمل میں شامل ہو گا، اس وجہ سے وہ ان کے لیے وقت کو موضوعی یا احساساتی سطح پر الٹا دے گا، اس لیے سکڑاؤ کے مرحلے میں موجود باشدے چیزوں کو واپس دوڑتے نہیں دیکھیں گے بلکہ ان کے لیے واقعات آگے کو ہی بڑھیں گے جیسے ہمارے لیے بڑھتے ہیں، مثال کے طور پر انہیں کائنات سکڑتی نہیں بلکہ پھیلتی نظر آئے گی، ہمارے مرحلہ کائنات میں پھیلاوہ ہو رہا ہے اور ذہنی عمل کا رخ آگے کو ہے، لیکن ان کی نظروں میں ہماری کائنات سکڑتی ہوئی اور ذہنی عمل پیچھے کو جاتا محسوس ہو گا۔

اسی (1980) کی دہائی میں سٹیفن ہاکنگ نے بھی کچھ عرصہ اللئے وقت کی کائنات پر غور و فکر کیا لیکن بعد ازاں اسے اپنی سب سے بڑی غلطی قرار دے کر ترک کر دیا، پہلے پہل ہاکنگ کا خیال تھا کہ دوری کائنات پر قدری میکانیات (Quantum Mechanics) کے اطلاق کے لیے تفصیلی وقت مطابقت (Symmetry) کی ضرورت ہے، بعد ازاں ثابت ہوا کہ قدری میکانیات کی مروجہ معیاری شکل میں اس کی گنجائش نہیں، حال ہی میں دو طبیعت دانوں مرے گل میں (Murray Gell-Mann) اور جیمز ہارٹل (James Hartle) نے قدری طبیعت کے قوانین میں ایسی ترمیم پر بحث کی ہے جس کے مطابق وقت کی مطابقت کو باہر سے لا گو کر کے دیکھا جائے کہ آیا کوئی ایسے نتائج برآمد ہوتے ہیں جن کا ہمارے اس کائناتی دور میں مشاہدہ کیا جاسکتا ہے، تا حال کہا نہیں جاسکتا کہ کیا نتائج برآمد ہوں، ایک رو سی طبیعت دان آندرے لند (Andrei Linde) نے کائناتی تباہی سے نکلنے کے امکانات پر بالکل علیحدہ انداز میں کام کیا ہے، اس نے اپنے کے کام کا آغاز پھیلاوہ (باب سوم) کی توضیح و توجیہ سے ہی شروع کیا ہے، اصل نظریے میں فرض کیا گیا تھا کہ ابتدائی کائنات کی کوئی حالت برائیگختہ خلاء سے مماثلت رکھتی ہے جو عارضی طور پر کائنات کو مختصر عرصے کے لیے لیکن انتہائی تیزی سے باہر کو پھیلاتی ہے، 1983 میں آندرے نے تجویز کیا کہ ابتدائی کائنات میں کوئی حالت ہر جگہ یکساں نہیں تھی، یہ جگہ جگہ مختلف تھی اور کی بیشی بالکل بے قاعدہ تھی، ایک جگہ زیادہ برائیگختہ تھی، دوسری جگہ انتہائی زیادہ تو تیسری جگہ بہت کم، اس کے نتائج کے مطابق جو علاقے زیادہ برائیگختہ تھے وہاں پھلاوہ تیز تھا اور اس کے بعد ازاں کم ہونے کی رفتار تھوڑی، چنانچہ پھلاوہ کا عمل زیادہ برائیگختہ علاقوں میں زیادہ ہوا، لہذا جو علاقہ اتفاقاً زیادہ برائیگختہ تھا وہ زیادہ رفتار سے اور زیادہ دیر تک پھیلا چنانچہ اس نے کائنات کے حجم میں زیادہ حصہ پر قبضہ کر لیا، آندرے اس صورتِ حال کو ڈارون کے ارتقاء یا اقتصادیات سے تشبیہ دیتا ہے، اگرچہ

ایک اونچے درجے کی ایگزینٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ توانائی ادھار لی جائے لیکن اس کا اجر بھی اس علاقے کے حجم میں ہونے والے بہت زیادہ اضافے کی صورت میں مل جاتا ہے، چنانچہ جو علاقے جتنی زیادہ توانائی ادھار لیتا ہے وہ بنتی ہوئی کائنات کے اتنے ہی زیادہ حجم پر غالب آ جاتا ہے۔

اب چونکہ پھولنے کا یہ عمل ہر قسم کے ضابطے سے آزاد ہوتا ہے اس لیے کائنات چھوٹی کائناتوں کے جمیگھوٹوں میں بٹ جاتی ہے، ان میں کچھ بہت تیزی سے پھول رہے ہوتے ہیں اور کچھ بالکل نہیں، جن علاقوں کی برائیگزینٹ توانائی زیادہ ہوتی ہے، ان کے پھولنے کی رفتار اصل نظریے میں بنائی گئی رفتار سے کہیں زیادہ ہوتی ہے، اب چونکہ کائنات کا زیادہ تر حصہ انہی تیزی سے پھولتے علاقوں کے قبضے میں ہوتا ہے، اس لیے پھولنے کے مرحلے کے بعد کی کائنات میں کوئی ایک نقطہ انکل پیچو طور پر بھی منتخب کیا جائے تو وہ انہی علاقوں کے اندر ہو گا، چنانچہ عین ممکن ہے کہ کائنات میں ہمارا محل و قوع بھی ان زیادہ پھولے ہوئے علاقوں میں سے کسی ایک میں ہو، لندے کے حساب کتاب سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑے بلبلے چھوٹوں کی نسبت 10 گنا زیادہ تیزی سے پھیلیں گے۔

چنانچہ عین ممکن ہے کہ جسے ہم گل کائنات سمجھ رہے ہوں وہ دراصل آغاز میں بنے بلبلوں میں سے کوئی بڑا بلبلہ ہو اور اس سے باہر کئی ایسے بلبلے ہوں جو ابھی پھول رہے ہوں، درحقیقت اس کے خاکے میں پھولنے کا یہ عمل لازوال ہے جب کچھ بلبلے اپنی زندگی کے دور پورے کر چکے ہوتے ہیں اور مر رہے ہوتے ہیں تو کچھ بلبلے ایسے بھی ہوتے ہیں جو ابھی پھولنے کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، چنانچہ یہ خاکہ بھی پچھلے باب میں بیان کئے گئے بچہ کائناتوں کے نظریے کی طرح ابدی کائنات کا خاکہ ہے، اس خاکے میں زندگی، امید، اور کائنات میں ابدی ہیں، بلبلوں کے پھولنے سے بننے والی کائناتوں کی کوئی حد نہیں ہوتی اور شاید نہ کوئی آغاز۔

کیا دوسرے کائناتی بلبلوں کی موجودگی میں ہمارے جانشیوں کے وجود کے برقرار رہنے کا کوئی امکان ہے؟ کیا یہ بلبلے کائناتی خاتمے سے محفوظ رہ سکتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں کیا ہمارے جانشین ایک مرتبے ہوئے بلبلے سے کسی نوجوان بلبلہ پر منتقل ہو سکتے ہیں؟ لندے نے 1989 میں فرکس لیٹرز ([Physics Letters](#)) میں چھپنے والے ایک جرات مندانہ مضمون Life After Inflation میں اسی سوال کا جواب دیا ہے، وہ لکھتا ہے:

”ان نتائج کی روشنی میں کہا جاسکتا ہے کہ ایک چھوٹی ہوئی کائنات میں زندگی کبھی معصوم نہیں ہوگی، بد قسمتی سے اس نتیجے کا خود کار طور پر یہ مطلب نہیں نکلتا کہ نسل انسانی کے مستقبل کے بارے میں کچھ زیادہ امیدیں وابستہ کی جاسکیں۔“

لندے لکھتا ہے کہ چونکہ ایک خاص بلبلہ آہستہ ناقابل رہائش ہو گا اس لیے بقاء کی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ہم پرانے علاقوں سے نئے کی طرف ہجرت کر جائیں۔

نظریہ پھیلاؤ کا جو روپ لندے دیتا ہے اس میں جو چیز مایوس کن ہے وہ بلبلے کا بے پناہ جنم ہے، اس کے حساب کے مطابق ہمارے بلبلے سے باہر نزدیک ترین دوسرا بلبلہ اتنے فاصلے پر ہے کہ اسے نوری سالوں میں ظاہر کرنے کے لیے ایک کے بعد کئی ملین صفر لگانے پڑیں گے، اور اگر روشنی کی رفتار پر بھی سفر کیا جائے اور ہم خوش قسمتی سے اپنے بلبلے کے کنارے پر ہی آباد ہوں تو بھی دوسرے بلبلے تک پہنچنے میں ہمیں اتنا ہی وقت لگے گا، اور یہ خوش کن و قوعہ بھی اسی وقت ہو سکتا ہے اگر ہماری کائنات کا پھیلاؤ لگائے گئے حساب کے عین مطابق ہو، کئی پہلوؤں سے لندے کا نظریہ کائنات کے متوازن حالت نظریہ ([Steady State Theory](#)) کی باقیات پر مشتمل ہے، یہ نظریہ پچاس کی دہائی اور ساٹھ کی دہائی کے اوائل میں مقبول تھا، یہ غیر مختتم کائنات کے نظریات میں سے سادہ اور مقبول ترین ہے، اسے اصلی شکل میں ہر میں بانڈی (

[Thomas Gold](#)) اور تھامس گولڈ ([Hermann Bondi](#)) نے متعارف کروایا تھا، اس کی رو سے وقت کے بڑے پیمانے پر کائنات غیر متغیر ہے، چنانچہ اس کا انجام اور آغاز نہیں ہے، جوں جوں کائنات پھیلتی ہے، نیا مادہ پیدا ہو کر خالی جگہ بھرتا چلا جاتا ہے اور یوں اس کی اوسط کثافت مستقل رہتی ہے، لیکن کسی ایک کہکشاں کا مقدار وہی ہے جو پچھلے ابواب میں بیان ہو چکا ہے، یعنی پیدائش، ارتقاء اور موت، لیکن نئے پیدا ہونے والے مادے سے ہر وقت نئی کہکشاں بنتی رہتی ہیں اور نئے مادے کی فراہمی نہ ختم ہونے والی ہے، چنانچہ مجموعی طور پر کائنات کا نظارہ مختلف ادوار میں یکساں رہتا ہے، کسی ایک علاقے میں کہکشاوں کی کُل مقدار مستقل رہتی ہے، ان کہکشاوں کی عمریں مختلف ہوتی ہیں۔

مسٹکم / متوازن کائنات کے اس نظریے کو مان لینے سے اس سوال کا جواب دینے کی ضرورت نہیں رہتی کہ کائناتی مادہ کہاں سے وجود میں آیا، علاوہ ازیں یہ نظریہ کائناتی ارتقاء کے باعث کائناتی ابدیت کو بھی متنوع کر دیتا ہے، اس نظریے کی رو سے کائنات کی جوانی ابدیت کی حامل ہے کیونکہ کہکشاوں کی انفرادی موت کے باوجود نئی کہکشاوں کی پیدائش کائنات کو ہمیشہ جوان

رکھتی ہے، ہمارے جانشینوں کو تو انائی کے ذخائر کے لیے ادھر ادھر پھرنے کی ضرورت نہیں ہوگی، نئے مادے کی پیدائش انہیں تازہ بہ تازہ منع مہیا کرتی رہے گی، انہیں صرف اتنا کرنا ہو گا کہ جب ایک کہکشاں سے تو انائی کے ذخائر ختم ہونے لگیں تو وہ نکل کر کسی نسبتاً نوجوان کہکشاں میں چلے جائیں، اور وہ ہمیشہ کے لیے ایک سی تو انائی، حوصلہ مندی اور سرگرمی سے زندہ رہ سکیں گے۔

لیکن اس نظریے کے کارگر ہونے کے لیے کچھ طبیعتی تقاضوں کا پورا ہونا ضروری ہے، پھیلاوہ کی وجہ سے کائنات ہر چند ملین سال بعد اپنا جنم دو گنا کر رہی ہے، اگر کائناتی کثافت کو برقرار رکھنا ہے تو اس عرصے میں 10 ٹن مزید مادہ پیدا کرنا ہو گا، بظاہر یہ مقدار بہت بڑی نظر آتی ہے لیکن حساب لگنے سے پہلے چلتا ہے کہ اس کے لیے ایک صدی میں ہوائی جہاز کے ہینگر جتنے جنم میں محض ایک نئے ایٹم کی پیدائش کافی ہو گی، اس سے بھی سنجیدہ مسئلہ اس طبعی عمل کو سمجھنا ہے جو نئے مادے کی پیدائش میں کارفرما ہے، پھر تو انائی کا ختم نہ ہونے والا ذخیرہ کون سا ہے جہاں سے یہ نکل کر مادے کی شکل اختیار کرتی چلی جاتی ہے، فریڈ ہائل (Fred Hoyle) اور جیانت نارلیکار (Jayant Narlikar) نے اس مسئلہ کو سمجھانے کی کوشش کی اور متوازن کائنات کے نظریے کی تفصیلات طے کیں، انہوں نے تو انائی کی فراہمی کا مسئلہ حل کرنے کے لیے ایک "تخیقی میدان" کا تصور پیش کیا، اس میدان کی اپنی تو انائی منفی ہے، جب بھی کیت "m" کا کوئی ذرہ وجود میں آتا ہے تو "mc" کے برابر تو انائی میدان کو فراہم کرنا ہوتی ہے۔

اس تخلیقی میدان نے مسئلہ تخلیقی حل تو فراہم کر دیا لیکن اور بہت سے حل طلب مسائل پیدا ہو گئے، اور پھر نہ صرف یہ میدان ایک عارضی حل ثابت ہوا بلکہ اس کے وجود کی کوئی فطری یا عملی شہادت کسی اور طرف دستیاب نہ ہوئی، جب ساٹھ کی دہائی میں پس منظری شعاعیں دریافت ہوئیں تو انہیں اس متوازن کائنات کے خلاف سب سے بڑی شہادت خیال کیا گیا، مستقبل بعید میں جب کائنات کا مادہ اور شعاعیں انتہائی لطیف صورت اختیار کر جائیں گی تو معمولی سا طبیعی اثر بھی اس کے پھلنے کے طریقے پر اثر انداز ہو گا، مثال کے طور پر ہو سکتا ہے کہ بگ بینگ کے ابتدائی مرحلے کے پھیلاوہ کی کمزور پڑتی باقیات اب بھی موجود ہوں، اور اس وقت مادے کی باہمی تجاذبی کشش نے اس کے اثرات کو چھپا رکھا ہو، لیکن بالآخر وہ اپنا آپ محسوس کروائیں، اس صورت میں ایک لمبے عرصے کے بعد کائنات دوبارہ پھولنے لگے گی، اگرچہ اس کی رفتار بگ بینگ کی سی نہیں ہوگی، لیکن یہ سست پھیلاوہ ہمیشہ جاری رہے گا، چاہے یہ کائناتی پھیلاوہ کتنی ہی کم شرح سے ہو، اس کا ہونا ہی بہت سے فیصلہ کن نتائج و عواقب کا حامل ہے، بلبلے کے اندر ایک وقوعی افق (Event Horizon) کا ظہور ان میں سے ایک ہے

جس کے اثرات بلیک ہول کے سے ہوں گے، کوئی بھی زندہ مخلوق جو بلبلے سے نکل کر بھاگنے کے لیے بڑھے گی کنارہ اس سے زیادہ تیزی سے دور ہو گا، اس کی وجہ از سر نو پھلاڑ ہے، انڈے کے نتائج بہت خیال آفرین ہیں اور ان سے پتہ چلتا ہے کہ کائنات اور انسانی جانشینوں کا مستقبل طبیعی اثرات کی اتنی چھوٹی مقداروں سے متاثر ہو سکتا ہے کہ آخری مراحل کے آنے سے پہلے ان پر حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جاسکتا، پس منظری شعاعوں کی توضیح بگ پینگ نظریے میں فوراً ہو جاتی ہے جب کہ متوازن کائنات کا نظریہ اس کی کوئی وضاحت نہیں دیتا، پھر جب آسمانوں میں دور تک دیکھا جانا ممکن ہوا تو یہ واضح ہو گیا کہ کائنات بہت تیزی سے ارتقاء پذیر ہے، اس طرح کی کھلی شہادتوں کے بعد ہائل اور اس کے ساتھیوں نے اپنا نظریہ ترک کر دیا، مگر اس نظریے کے روز روز پیچیدہ ہوتے روپ کبھی کھار بعد میں بھی سامنے آتے رہے۔

طبیعی اور مشاہداتی کے علاوہ کچھ فلسفیانہ مسائل بھی تھے جن کے تسلی بخش جواب "متوازن کائنات" کا نظریہ نہ دے سکا، مثلاً اگر ہمارے جانشینوں کے پاس لامحدود وقت اور وسائل ہوں تو ان کی تکنیکی ترقی بھی لامحدود ہونی چاہیے، انہیں پوری کائنات میں پھیل جانا چاہیے اور ان کے زیر اثر آجانا چاہیے یا اس کی صنایع ہو چکی ہونا چاہیے، چنانچہ مستقبل بعید میں کائنات کے بیشتر حصے کو ٹیکنالوجی کے زیر اثر آ جانا چاہیے کیا اس کی صنایع ہو چکی ہونا چاہیے، لیکن مفروضہ کی رو سے کائنات بحیثیتِ مجموعی یعنی کہ بڑے پیمانے پر غیر متغیر ہے چنانچہ متوازن حالت کائنات سے استخراج ہوتا ہے کہ ہماری آج کی کائنات کی پہلے سے ہی صنایع ہو چکی ہے، اور چونکہ اس نظریے کی رو سے تمام کائنات بحیثیتِ مجموعی تمام ادوار میں ایک سی رہتی ہے اس لیے ہر دور میں ذہین مخلوق پیدا ہونی چاہیے، اور چونکہ یہ صورتِ حال ابد سے ہے اس لیے کائنات میں لازماً ایسی بستیاں ابد سے ہونا چاہیں جو ارد گرد کے علاقے کی صنایع کرتی رہیں اور ان کے سمیت ہمارے علاقے کے اب تک کی کائنات کے بیشتر علاقوں میں پھیل جانا چاہیے، یہ مفروضہ اس نتیجے سے نہیں بچا سکتا کہ ذہین مخلوق میں پھیلنے کی خواہش نہیں ہوتی، ایک بھی باشعور مخلوق لامحدود عرصے تک زندہ رہے تو اپر اخذ کیا گیا نتیجہ درست ہو سکتا ہے، یہ طرزِ استدلال کہ لامحدود کائنات میں کوئی بھی واقعہ خواہ اس کا امکان کتنا بھی کم ہے لازماً وقوع پذیر ہو گا اور غیر محدود مرتبہ ہو گا، اس منطق کی رو سے کائنات میں ہونے والے عمل اس کے باشدوں کی تکنیکی سرگرمیوں سے مماشلت رکھتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ جسے ہم فطرت کہتے ہیں وہ ایک برتر مخلوق یا ان کی کسی آبادی کی سرگرمی ہے، یہ نتیجہ افلاطون کے تصورِ صانع یا خالق ہی کا ایک اور روپ گلتا ہے یعنی کہ ایک ایسا خدا جو پہلے سے طے کردہ طبیعی قوانین کے اندر رہ کر کام کرتا ہے، دلچسب بات یہ ہے کہ ہوئل اپنے بعد کے کوئی نظریات میں واضح طور پر ایسی برتر مخلوق کی حمایت کرتا نظر آتا ہے۔

کائنات پر کسی بحث کے خاتمے پر ہمیں مقصدیت کے سوال کا سامنا بھی کرنا ہو گا، پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ مرتبی کائنات نے برٹرینڈ رسل کو کائنات کی لاحاصیت کا قائل کر دیا تھا، اس احساس کی بازگشت حالیہ سالوں میں سیوں وائے برگ کے ہاں بھی ملتی ہے جو "پہلے تین منٹ" میں اس نتیجے پر پہنچا ہے کہ جوں جوں کائنات کی تفہیم بڑھ رہی ہے یہ احساس بھی بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ بے مقصد ہے، پہلے بیان ہو چکا ہے کہ سست روحرارتی موت کی خوفناکی مبالغہ آمیز ہو سکتی ہے لیکن بگ کرنچ کے ذریعہ اچانک موت کے امکانات زیادہ ہیں، میں نے ایسی برتر تخلوق کا مفروضہ بھی دیا ہے جو مشکلات کے خلاف مجرمانہ طبعی اور دانشورانہ کامیابی حاصل کر سکتی ہے، اس امکان کا بھی مختصر جائزہ لیا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ کائنات کا اختتام ہو لیکن فکر لا محدود ہو.

لیکن کیا یہ تمام تبادل منظر نامے ہماری بے چینی میں کسی کمی کا سبب بنتے ہیں؟ میرے ایک دوست نے ایک بار تبصرہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس طرح کی جنت کا بتایا جاتا ہے اس کی کوئی خواہش اسے نہیں، اگر ابدیت ایک ہی طرح کی وارداتوں اور احساسات کا تسلسل ہے تو وہ بے معنی ہے، تاہم اگر ابدیت کے ساتھ ترقی بھی وابستہ کر لیں تو ہم نئی سے نئی چیزیں سیکھتے اور کرتے ہوئے مسلسل نئے پن کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ کس لیے؟ انسان جب کسی مقصد کے لیے کوئی کام شروع کرتا ہے تو ایک متعینہ منزل اس کے سامنے ہوتی ہے، اگر منزل یا مراد حاصل نہ ہو سکے تو منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے (تاہم اس دوران حاصل ہونے والے تجربے کو بے وقت نہیں کہا جاسکتا) دوسری طرف اگر منصوبہ کامیاب ہو جاتا ہے تو منزل کے حاصل ہونے سے سرگرمی رک جاتی ہے، کیا کسی منصوبے میں کوئی ایسا مقصد بھی ہو سکتا ہے کہ منصوبہ کبھی مکمل نہ ہو، اگر کسی ناقابل حصول مقصد کو منزل بنالیا جائے تو کیا وجود با معنی ہو سکتا ہے؟

اگر کائنات کا کوئی مقصد ہے اور یہ مقصد حاصل ہو جاتا ہے تو پھر کائنات کو ختم ہو جانا چاہیے، کیونکہ حصول مقصد کے بعد اس کا وجود بے معنی ہے، اگر معلومی انداز میں دیکھا جائے تو ایک کائنات جو لا محدود طور پر موجود رہ سکتی ہے اس کا کوئی مقصد ہو ہی نہیں سکتا، چنانچہ کائناتی موت حصول مقصد کی قیمت بھی ہو سکتی ہے جو کائنات کو دینا پڑتی ہو، جو سب سے بڑی امید ہم کر سکتے ہیں شاید یہی ہے کہ ممکن ہے آخری تین منٹ سے پہلے ہمارے جانشیوں کو کائنات کے مقصد کا علم ہو جائے۔

## ختم شدہ

# تاریخ بر قی اشاعت

27 مارچ 2012ء

از طرف: محمد علی مکی

مزید علمی کتب ڈاؤنلوڈ کریں:

